

160

[-830.9

476

中国彩民的第一本彩票大奖号码实用预测宝典



彩票赢家只买最可能出现的中奖号码!

周易 与彩票选号

梁红思 著

MASTER



预测学巨著《易经》与数理分析融会贯通

数十种成功预测彩票大奖号码的实战招法

令你的中奖机会提高100倍



LOTTERY

中国商业出版社

目 录

总 论	1
一 彩票业的状况	1
二 认识彩票中奖号码出没的规律性和对其进行预测的 可行性之辩证	2
第一章 彩票中奖号码预测的理论基础概述	
第一节 易理与数理	7
第二节 阴阳学说	9
第三节 五行学说	11
第四节 普通全息学	14
第五节 概率学与统计分析学	15
第六节 唯物认识论与方法论在彩票中奖号码预测中的反映	19
第二章 彩票中奖号码预测的基本知识	
第一节 历法的基本知识	22
第二节 干支的基本知识	28
第三节 十二地支(生肖)与号码数字的关系的基本知识	37
第三章 彩票中奖号码的结构	
第一节 主题与副码	41

第二节 主题类型·····	47
第三节 数型与配伍·····	50
第四节 位置号码的五行属性和总体五行状态·····	57
第五节 奇偶性和总和数值·····	60

第四章 彩票中奖号码的系统

第一节 干支数字信息载体总系统的建立与组成·····	63
第二节 干支系统：天干系统、地支系统·····	69
第三节 农历系统和同尾数农历系统·····	71
第四节 新历系统和同尾数新历系统·····	72
第五节 纳音系统和同名纳音系统·····	74
第六节 主题系统（农历主题系统、新历主题系统）和 主题结构演变系统·····	75
第七节 农历——号码主题对应演变系统、 新历——号码主题对应演变系统以及 上期号码——号码主题对应演变系统·····	79
第八节 天干——号码主题对应演变系统、 地支——号码主题对应演变系统和 纳音——号码主题对应演变系统·····	83
第九节 数型演变系统和配伍演变系统·····	85
第十节 主题类型演变系统·····	87
第十一节 位置号码五行属性演变系统、总体五行状态 演变系统和五行结构演变系统·····	89
第十二节 奇偶性演变系统·····	93
第十三节 生肖码演变系统·····	94

第十四节 等距离排列系统和号码等距离环环相比系统97

第五章 每一个位置号码的预测推算原则与方法

第一节 预测推算前的准备工作	102
第二节 “事应过三”验证法则和“事不过三”预测法则	105
第三节 标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测法	107
第四节 标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法.....	183
第五节 号码——位置号码生克轨迹对应预测法.....	197
第六节 号码——位置号码主题轨迹对应预测法	207
第七节 九宫星——位置号码生克轨迹对应预测法	211
第八节 九宫星——位置号码主题轨迹对应预测法	218
第九节 数字——位置号码加法轨迹对应预测法	221
第十节 数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法	244
第十一节 十二地支(生肖)预测推算中奖号码的原则与方法····	253
第十二节 同数字母——子轨迹对应预测法.....	269
第十三节 位置号码的预测推算方法之总结.....	274

第六章 中奖号码的总体结构之一：

主题与主题类型的预测推算原则与方法

第一节 系统——主题预测法	283
第二节 标准参照系——主题平行对应预测法	291
第三节 位置号码——主题斜线对应预测法	303
第四节 副码——主题对应预测法	309
第五节 同缩写主题母——子轨迹对应预测法	313
第六节 主题类型的预测推算原则与方法	317

第七章 中奖号码的总体结构之二：

数型与配伍的预测推算原则与方法

第一节 数型与虚数型预测法326

第二节 配伍预测法 341

第八章 中奖号码的总体结构之三：

总体五行状态的预测原则与方法

第一节 系统——总体五行状态预测法 355

第二节 虚五行预测法 359

第三节 中奖号码的总体结构的预测推算方法之总结369

第九章 彩票中奖号码预测的术语、符号、名词

之归纳与解释 378

第十章 关于提高中奖号码预测准确率的应用

策略之分析

第一节 关于提高和确保中奖号码预测准确率之分析 387

第二节 中奖号码预测推算在实践中的应用策略392

第十一章 关于“彩德和运气C”对彩票中奖 的影响作用之分析

第一节 彩德399

第二节 运气..... 401

第十二章 关于在预测实践过程中若干个技巧

问题之建议

第一节 科学地制表和记录以便观察和使用	406
第二节 预测推算工作“流水作业”化以提高效率	407
第三节 合理安排时间和调节好精神状态去预测	411
第四节 彻底认识和掌握和预测方法的思维逻辑及其关	412
第五节 群策群力：集体智慧化和合买彩票	415
附录一：广东体彩 36 选 7，2000 年至 2002 年 2 月的五行 结构演变系统	417
附录二：广东体彩 36 选 7，2000 年至 2002 年 2 月的主题 结构演变系统	424
附录三：深圳风采 7/35 电脑型福利彩票中奖号码之 主题结构缩写系统和主题类型演变系统	431
附录四：广东体彩四花选 4 之生肖码演变系统和 总体五行状态演变系统	435
附录五：南粤风采 7/36 福利彩票之数型与配伍演变 系统和主题结构缩写系统	437

总 论

一、彩票业的状况

目前,彩票业已经明显地带有全球性,全世界至今已有 150 多个国家和地区发行不同类型的彩票。世界彩票的销售额令人惊叹:1981 年彩票销售额为 150 亿美元,1987 年达到 380 亿美元,到 1990 年世界彩票销售额已逾 650 亿美元,这使彩票发行部门获得 200 多亿美元的资金,当然也令彩票购买者分享了 300 多亿美元的奖金。近年来,彩票销售额不断上升,1998 年和 1999 年彩票销售额分别为 1268 亿美元和 1286 亿美元。自 20 世纪 80 年代以来,世界彩票销售额以每年 9%—10% 的速度稳步增长,世界彩票业一枝独秀,已成为世界第六大产业。

彩票正日益显示出其强大的社会集资功能,令其他慈善和公益性质的捐助难以望其项背。

当前,世界各国彩票奖金有高额化、多元化的趋势。当然,公彩得以飞快发展的前提条件,是利用普通百姓追求刺激以及花小钱搏大钱的心态。

可以说,彩票已不可避免地成为全球百姓生活上一项不可缺少的内容。

随着我国经济发展,彩票已不仅仅是一项游戏活动。据经济学家分析,我国在 21 世纪将成为世界彩票大国。综观其发展,在 21 世纪的前 10 年,我国彩票将在 5 个方面进行过渡,逐步走向完善。

其一,在体制上:从计划经济运作向市场经济运作过渡;

其二,从粗放型向法治化过渡;

其三,在定位上:向长期稳定的产业化过渡;

其四,在销售方式上:从集中经营向网点经营过渡;

其五,玩法种类上:单一品种向多样化过渡。

二、认识彩票中奖号码出没的规律性和对其进行预测的可行性之辩证

电脑彩票中奖号码,每次开奖号码之间是否具有连续性和必然性,预测彩票中奖号码是否有规律性可循,预测彩票中奖号码有没有一套科学的、实用的、可操作的而准确率高的运作程序与预测方法?对此不同的人有不同的看法,概括起来有两种观点,既有规律和无规律。

持第一种观点的人认为:彩票中奖号码的出没,完全是一种随机事件,中奖号码能否抓住,全靠运气,哪有什么规律?笔者认为:持这种观点的人,可能并没有认真研究过彩票中奖号码,并不真正了解中奖号码出没变化的客观规律。

概率也叫机会,概率论就是研究大量随机事件发生的机会的科学。概率均衡理论告诉我们,彩票中奖号码的出没,对于任何一组号码,其中奖概率都是均等的。但是,摇奖号码真的随机吗?机械式摇奖机搅动“乒乓球”或旋风式摇奖机吹出“乒乓球”而产生的中奖号码究竟有多少随机?事实胜于雄辩,其实号码球的出没并不像所谓概率学家想像的那样随机。

《纽约时代》的科学专栏曾经刊登过这么一篇文章:“长期的实践表明,真正随机数的产生,是极端困难的。不管是用计算机还是机械装置。即使最精心设计的机械式的产生随机数的装置,如轮盘赌中的转盘和彩票使用的各式摇奖机,在仔细审查之后也都能发现它们是有瑕疵的。”一般来说,搅动或混匀某些东西是否能确保随机的问题比大多数专家想像的要复杂。

大部分彩民之所以会认为中奖号码球出现机会是一致的,只

是根据摇奖之前对摇奖机的检查,对各个号码球大小、重量、表面光滑程度的一致性的公证,还有就是基于对摇奖机和整个摇奖过程的充分之信任。实际上,虽然摇奖机能够保证各个号码球摇出的可能性基本一致,但是不容否认,每个号码球虽然表面看起来一致,但是其结构、受合力情况或多或少会有一些微妙的差别,正是这些不为人知道的“差异”或多或少影响了它们被摇出的机会,甚至决定它们被摇出的前后顺序、次数。因此,可以把“摇奖机”摇出彩票中奖号码的过程称为:不完全的随机过程。

对于几百万组甚至千万注排列组合的彩票号码,为什么在这一时间仅摇出这一组中奖号码?为什么在另一时间又摇出另一组中奖号码?这一组中奖号码与另一组中奖号码有没有某种不为人认识但又客观存在的必然联系?

站在预测目的角度而言,我们并不需要知道究竟是什么“差异”导致这一时间摇出这组中奖号码,只需要知道,如何从摇奖“历史”过程中找出这种由于“差异”所造成的一些特殊的、特别的、明显的现象,并通过对这些明显的变化现象之归纳分析,得出某些规律性的结论,从而充分利用这些规律性的结论去预测中奖号码。其实,只要把彩票的中奖号码按时间顺序,由左到右,由小到大依次排列起来,在纵或横方面观察,就会得到一些表面上的特别现象:上下连号;上下有相同码;位置号码重复对称或者根本不相同,大码、小码出现的范围有时相对稳定……诚然,仅通过这些表面上就能得到的一些特别变化现象是完全不能满足预测中奖号码需要定性定量的特殊要求,还必须通过科学的、合理的、全方位的、系统的、大量的分类归纳处理,才能把更多的、隐蔽的各种特殊、明显的变化现象一一显示出来,这样我们才能认识它和掌握它,才能有充足的“数据”和“理由”去预测中奖号码。即是说,根据已知的、大量的中奖号码所反映出来的各种明显的、特别的

变化现象与趋势、特点，通过对这些容易被人们所认识和掌握的趋势与特点之分析研究，得出一些彩票中奖号码出没规律性的结论。当然其前提是必须要对大量的中奖号码进行系统的分类、整理，就必须要对中奖号码进行微观“解剖”结构。所以，彩票中奖号码系统体系和结构体系的建立为充分地把握中奖号码出没的规律性创造必要的条件！这是预测彩票中奖号码的一条重要途径和必需的手段。

过去，人们不能全面地对彩票中奖号码进行准确的预测的最大障碍在于未能找到一个“以不变应万变，以变应变”的相对标准体系来衡量对比千变万化。“反复无常”的中奖号码之出没，没有“标准”，就无法去辨别它，去掌握它。所以，找出和建立一个相对标准参照系以满足预测彩票中奖的各种需要是不可避免的，也是预测中奖号码的最大前提条件！

只有“相对标准参照系”才能把看似无序、偶然、随机的中奖号码出没的种种变化现象进行分类定性，只有在这个基础上才能全面地、全方位地对这些已分类定性的中奖号码进行排除式的定量！

能当之无愧地成为预测彩票中奖号码的相对标准参照系者，其最大功能当然就是“以不变应万变，以变应变”。所谓“不变”系指这个标准体系必须相对固定，其自身的变化规律必须是被人们“看得见，摸得着”；“应万变”系指这个标准体系必须能充分地、完全地反映出千变万化的中奖号码的出没个性；“以变应变”则系指通过本身的、已被人们认识的和掌握的变化规律真实地折射出变化万千的中奖号码的特征与特点，通过归纳分析这些特征与特点，得出可以达到预测目的之规律性结论。

彩票中奖号码出没的规律性，的确不易被人们全部准确地掌握。但我们完全可以从一些特殊的、明显的变化趋势着手，因为这些明显的、特殊的变化现象是容易被人们认识和掌握的，通过它

的量变和质变可以达到准确地预测中奖号码的目的。

要把握中奖号码的量变与质变，就必须找出一些科学的相对固定的，又已被人们所掌握的数字信息载体，这些载体能够真实地、准确地、全面地把中奖号码的各种变化趋势和特点反映出来，我们通过还原数字信息载体所表现出来的特殊的、明显的变化临界点，就可以根据变化临界点前后的不一样性而达到预测目的。这些数字信息载体就在相对标准体系中！比如开奖日的天干、地支、纳音、农历日子、新历日子等等，当然已知的、大量的中奖号码也理所当然地成为未知的中奖号码的数字信息载体。

预测中奖号码的实践十分清楚地告诉我们，仅凭已知的、大量的中奖号码作为未知的中奖号码的数字信息载体是很不够的！为了达到准确地、极小范围内预测中奖号码的目的，还必须借助于一个相对标准体系，还必须借助于一些额外的数字信息载体！

有了相对标准体系，有了足够的数字信息载体，有了全面的中奖号码的系统和结构体系，这就为全方位地、准确地预测中奖号码提供了必要的保障，这也是惟一的、正确的选择！

在预测彩票中奖号码的过程中，采取的方法离不开“命名——制定标准——准确识别变化的临界点——准确的预测结论”之中心轴。

所谓预测中奖号码的命名，其目的是便于认识和把握某种变化现象或预测方法。命名，当然要切合实际，恰如其分，命名的原则必须是既便于使用和预测，又要适当反映出其自身的功能。

制定标准，是彩票中奖号码进行准确的预测的一项最重要的内容之一，是预测过程中的中心工作。只有衡量、对比各种变化现象的“标准”制定了，而且必须是准确无误地确定了“标准”才能为准确辨别和判断千变万化的临界点提供依据。制定标准，就是为

准确地识别变化的临界点提供“标准”！

只有各种变化的临界点被准确地识别，我们才能根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。这是彩票中奖号码进行准确的预测的第二项最重要之内容，是预测过程中的重点工作。

准确的预测结论，是彩票中奖号码进行全面的预测过程后所追求的惟一目标，所有的预测理论、预测技术和预测方法均是为得出“准确的预测结论”而服务！针对预测彩票中奖号码的目的，预测结论必须涵盖两大指标：一是预测范围，二是准确性。预测范围即是指预测的精确度，是合理，还是偏大？准确性当然是指“全中”或几乎“全中”而言，最低的准确性起码能够中奖。所以，预测彩票中奖号码，不是寻找出现可能性最大或很大的号码组合，而是排除几乎不可能出现的号码排列组合。如果你能把中奖号码范围缩得越小，则你中大奖的机会就越高！

彩票中奖号码的出没，是存在着不以人的意志为转移的客观规律，没有认识它和掌握它，就不能主观地或仅凭“传统经验”作出“科学”论断：彩票的最大规律就是无规律。可以说，长期的彩票中奖号码预测实践十分清晰地告诉大众：

中奖号码的出没，是随机中带有必然，无序中藏着有序！

预测彩票的中奖号码之出没，不能搞绝对化，如果搞绝对化就没法认识事物和总结规律，也就不能达到相应的预测目的。

能否认识和掌握彩票中奖号码出没的客观规律以达到预测目的，完全是一个认识论和方法论的问题。

第一章 彩票中奖号码预测的理论基础概述

第一节 易理与数理

[重要说明]

我们研习彩票中奖号码的预测,不必拘泥于阴阳、五行属性,五行数字,天干、地支、纳音、九宫星的来源,只要知道和掌握其特性而加以运用于预测中奖号码的过程中即可!

汉朝董仲舒为代表的大儒们曾经综述:“天地之气各有五,五行之次,一曰水,天数也;二曰火,地数也;三曰木,天数也;四曰金,地数也;五曰土,天数也。”此即赋予数学五行之性,并与天地发生关系,天数为奇,地数为偶,与《易经》的思想是一致的。

“一六为水,二七为火,三八为木,四九为金,五十为土。一与六共宗;二与七为朋;三与八成友;四与九同道;五与十共守。”此是由洛书的数字与五行、方位相配合。“共宗”即北,“为朋”即南,“成友”为东,“同道”为西,“共守”为中。

“五居其腹,六八为度,二四为肩,左三右七,载九履一。”以及“北居天一生水,地六成之;南居地二生火,天七成之;东居天三生木,地八成之;西居天五生土,地十成之;中居地四生金,天九成之。”这是河图、洛书中关于五行、方位与数字的关系。

把上述数理与易理的五行对应整理记录如下:

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 6 \end{matrix} \right. = \text{水}, \quad \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 7 \end{matrix} \right. = \text{火}, \quad \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 8 \end{matrix} \right. = \text{木}, \quad \left\{ \begin{matrix} 4 \\ 9 \end{matrix} \right. = \text{金}, \quad \left\{ \begin{matrix} 5 \\ 0 \end{matrix} \right. = \text{土}$$

其中 1、3、5、7、9 为奇数(即单数);0、2、4、6、8 为偶数(即双数)。彩票中奖号码预测的最基本内容,就是号码数字与易理五行

的金木水火土对应挂钩！必须熟练掌握。

同尾数法则：在彩票中奖号码的预测过程中，当号码或数字具有相同的个位数即尾数时，我们把这些具有相同尾数的号码或数字均视作为同一类；在预测推算时，只要推算位置号码的尾数即可；任何号码或数字的五行属性，仅看它的尾数，不看它的整数，即五行属性由尾数决定。

1,11,21,31,41,51……均为同一类，记作[1]，属水；

2,12,22,32,42,52……均为同一类，记作[2]，属火；

3,13,23,33,43,53……均为同一类，记作[3]，属木；

4,14,24,34,44,54……均为同一类，记作[4]，属金；

5,15,25,35,45,55……均为同一类，记作[5]，属土；

6,16,26,36,46,56……均为同一类，记作[6]，属水；

7,17,27,37,47,57……均为同一类，记作[7]，属火；

8,18,28,38,48,58……均为同一类，记作[8]，属木；

9,19,29,39,49,59……均为同一类，记作[9]，属金；

0,10,20,30,40,50……均为同一类，记作[0]，属土。


在彩票中奖号码的预测过程中，知道了某一位置号码的五行属性，等于就知道了具体数字号码；知道了具体数字号码，也就知道了五行属性。即每一个彩票号码，其不外乎是五行属性之一的号码：金[4,9]，木[3,8]，水[1,6]，火[2,7]，土[0,5]。所以，预测的要求就是千方百计地排除每一个位置号码其中不可能出现的尾数或五行属性！剩下者就是预测结论的范围。

[顺注]

1. 传说《河图》系龙马自黄河涌馱而出，伏羲据此绘卦。这当然是一个神话，意在增强卦图的神秘感和权威性。

2. 河图所体现的设计思想是：以象涵数，以数示象。它由 1 至 10 的十个自然数构成，模拟天体星象。象分四方：左东右西，上南

下北。数以点计：白点为奇数，或称天数，代表阳；黑点为偶数，或称地数，代表阴。点数由下而上，由左、右、中，从 1 到 10 按内外二层顺序排列。每一方位的天地数之差皆为 5，而天数之总和为 30，地数之总和为 25，其差亦为 5。



1. 传说《洛书》系神龟于洛水背负以献，夏禹据此拟定《九畴》。它与《河图》一起，共同构成美丽的神话。(见图 1)

2. 《洛书》由 1 到 9 的 9 个自然数组成，浑若一幅大地方位图。其中奇数列于四方及中央，偶数则列于四角。全图相对二侧之数，加起来均等于 10，合中数则成 15。它们所代表的方位、季节等理念皆与《河图》相同，只是更为细分。(见图 2)

第二节 阴阳学说

阴阳学说是中国传统文化中一个最基本的哲学概念，也是一个科学的概念。

阴阳是一抽象而又通俗的名称，它不是用来表示某一种特点的具体事物，而是表示宇宙中万事万物共有的性能或状态。也就是说，万事万物皆有阴和阳，阴阳的相互作用成为事物变化和运动的根源所在。

正如《黄帝内经》对阴阳所作精辟的论述：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也”。

阴阳是普遍的，绝对的，它存在于事物的一切过程之中，又贯穿于一切过程的始终。

阴阳的基本特征是阴中有阳和阳中有阴。阴阳的这种相互包容，在事物的变化和运动过程中起着和谐、平衡、协调以及互相渗透、互补的作用，从而有利于保持平衡，使事物健康、稳定地向前发展。

阴阳是相互对立、相互依存，相互融合的。阴阳的双方不是处于静止不变的状态，而是处于“阴消阳长”或是“阳消阴长”的运动变化之中。

在一定条件下，阴阳可以互相转化。也就是说，阴可以转化为阳，阳也可以转化为阴。如果把阴阳消长看成是一个量变过程，那么阴阳转化便是一个质变的过程。

对于彩票中奖号码的出没而言，必须明白，中奖号码间内部的阴和阳两种势力相互作用，相互平衡，相互转化，在一定的时空，在特定的“环境”构成了彩票中奖号码体系的变化与运动的根源所在。

在彩票中奖号码体系中，每一个位置号码数字不是处于静止不变的状态，而是处于“阴消阳长”或“阳消阴长”的运动变化之中，也即是处于一个量变到质变，质变到量变的过程！

在预测彩票中奖号码的整个过程中，头脑自始至终必须树立起一个清晰的概念：

1. 在建立起的干支数字信息载体总系统中，任何一个信息载体包括已知的任何一个位置号码，其与未知的位置号码均有直接或间接的关系，两者间相互依存，相互对立，相互融合，两者间的关系可以通过五行属性的相生相克规律来体现。

2. 无论是局部的位置号码还是总体结构,中奖号码出没的千变万化之现象,全部处于一个量变到质变,质变到量变的过程,所以,准确地识别变化的临界点是预测中奖号码的重点工作!依据临界点变化前后的不一样性就可以达到预测目的。

第三节 五行学说

中国先哲在生活上发现:在人的日常生活中有五种物质元素是不可缺省的,即金木水火土,这五种元素构成了整个世界。换句话说,世界上的万事万物都可以归结到这五种元素中的任何一个元素里。而这五种元素都是先于人类而存在的自然物,非人类所能加工制造的。先哲乃称之为五行。

经过长期的实践,古先哲先贤们概括出这五种物质元素的属性,这种抽象的目的在于以此来说明整个世界。即把种种所接触到和观察到的经验,扩充到不能接触和观察到的对象之上。继而对宇宙和生命,社会和个人,理想与现实,混乱与程序,偶然与必然,变与不变等得出理论的、数学的理解和把握。五行理论就是在这样的动机和努力而产生的。

五行是指金、木、水、火、土这五种物质属性,万事万物皆可分成五种不同性能或状态的物质。五行的相生相克关系作为宇宙万物基础的唯物概念。

万事万物就是在相生相克中达到动态平衡,“生”到极点和“克”到极点均会令事物向相反的方向转化;也正是这五种不同性能或状态的事物之间的相生相克,构成了事物发展、运动、变化的规律。

五行属性相生相克是普遍的,绝对的,它存于事物的一切过程之中,同时又贯穿于一切过程的始终。即是说,没有五行的生

克,就没有事物的发生、发展、变化,更谈不上事物的运动规律了。

五行相生规律,相生就是相互孳生,促进,发展的意思,因为有相生关系,五行才绵绵不绝运动、升华。即——

水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。循环不断,生生不息。

五行相生关系中,任何一行都有“生我”这两方面的关系,生我的是“母”,我生的是“子”这叫“母子关系”。

五行相克关系中,任何一行都有“我克”和“克我”这两方面的关系,我克者为我“所胜”,克我者为我“所不胜”,这叫“所胜”和“所不胜”的关系。五行相克规律:相克就是相互克制、制约、克服的意思。即——

木克土、土克水、水克火,火克金,金克木。

还有“相乘”和“相侮”的关系。相乘,是指过度的相克;相侮,也称“反克”,是指本来自己是可以克及的一方,却反被克胜,和相克正相反。

运用五行的各种特性,以金木水火土为中心,把自然界以及其他的各种现象、特征、形态、功能、表现等诸方面,其和五行中某一行的特性相类似,就把它归纳于那一行中,分成五大类:经过分门别类的系统归纳,就可以将各种纷繁复杂的现象理出头绪,从而就可以清楚说明各类之间的关系。

如下图表就是从自然界、人体两方面的五行分类:

五行	自然界									其他				人体				
	五方	五数	五季	五气	五色	五形	五味	五音	五植	五施	五常	五首	五类	五腑	五脏	五官	五体	五志
木	东	3,8	春	风	青	直	酸	角	穗	元	仁	麟	毛	肝	胆	目	筋	怒
火	南	2,7	夏	暑	赤	锐	苦	徵	角	亨	礼	凤	羽	心	小肠	舌	脉	喜
土	中	5,0	长夏	湿	黄	方	甘	宫	根	立	信	皇	裸	脾	胃	口	肉	思
金	西	4,9	秋	燥	白	圆	辛	商	蔓	利	义	龟	甲	肺	大肠	鼻	皮毛	悲
水	北	1,6	冬	寒	黑	曲	咸	羽	悬	贞	智	龙	鳞	肾	膀胱	耳	骨	恐

中国先哲认为:由五行构成的万物,一定具备五行的本质,也就符合五行的相生相克规律,五行理论通过数的规定来组织整理从而解释宇宙万物。

中国先哲是把五行理论作为一种方法来加以应用。比如令世人惊奇和羡慕的中医学、武术、气功、养生等等,都是以五行理论作为理论基础的。

鉴于此,以五行理论作为方法论去分析研究和预测彩票中奖号码是再恰当不过了!彩票中奖号码是有“记忆功能”的,它的出没,它的千变万化的现象,并不在于“概率均衡规律”的控制,而是在于其内部客观存在的不以人的意志为转移的号码间、整体结构间的五行相生相克规律的作用!

任何期次,任何位置号码,任何中奖号码的结构包括局部结构与总体结构,其并不是简单的、偶然的、随机的“独立事件”,而是“个体与个体间,个体与总体间,总体与总体间,已知的和未知的”千丝万缕的必然的相生相克关系。

所以,要准确地预测彩票中奖号码,就必须从中奖号码出没所形成的各种明显的变化现象中着手并以五行的相生相克规律来阐述之,捕捉其变化的明显临界点。

在这里再强调一点,在彩票中奖号码的预测过程中,五行数字及其相生相克规律的运用是预测的主要技术与手段,因而,广大彩民必须熟练地掌握本章节所介绍的内容。

彩票中奖号码的相生相克,与阴阳一样,是事物不可分割的两个方面,没有生,就没有事物的发生和成长;没有克,就不能维持事物在发生过程中和变化中的平衡平稳协调。即是说,没有相生,就没有相克;没有相克,就没有相生。这种号码数字间的生中有克,克中有生,相辅相成,互相为用的关系,推动和维持中奖号码的正常出没、运动、变化与发展。

[记住] 号码的五行属性由其尾数决定。

水[1,6] $\xrightarrow{\text{生}}$ 木[3,8] $\xrightarrow{\text{生}}$ 火[2,7] $\xrightarrow{\text{生}}$ 土[0,5] $\xrightarrow{\text{生}}$ 金[4,9] $\xrightarrow{\text{生}}$ 水[1,6]

水[1,6] $\xrightarrow{\text{克}}$ 火[2,7] $\xrightarrow{\text{克}}$ 金[4,9] $\xrightarrow{\text{克}}$ 木[3,8] $\xrightarrow{\text{克}}$ 土[0,5] $\xrightarrow{\text{克}}$ 水[1,6]

第四节 普通全息学

全息概念就是把宇宙万事万物看成一体，互相紧密联系，部分包含着整体的信息。

所谓全息，初指全息照相术，是种光景照像的新方法。在显示形象方面有其独特优点。它和照相术不同，全息照片“像”不是物体的“形象”而是物体的光波，即使物体已经不存在了，但只要照明这个记录，就会使原始物体“再现”。全息图贮备了大量的信息，可以一一显现。

《易经》的朴素全息思维是现代普通全息学的理论基石。普通全息学主要包含如下三方面：

(一) 部分能映射整体。即部分可以通过子系统的全息元，映射整体的特征。因此，只要把系统的特征分别加以考察，区别全息元的层次反映性，即可据此推测出不同级别整体的特征。

(二) 时段可以映射发展过程。可以通过时段的特征分析，区别那些具有反映发展过程的全息元，据此即可重建历史发生，乃至预测未来。可以通过收集同种过程的不同时段的“历时性”产物，加以顺序排列，按演化结构的历时关系，就可以溯因重建发展过程的具体情景。

上述的第一点关系说明部分与整体，系统内外之间存在着彼

此映射的同构；第二点结论说明在流变过程中，不同时段存在着同构。把这两点结合起来，说明在发生上存在着整体与部分的同构。

(三)四维时空域或多维抽象“域”要映射统一形成过程。即是说，在彩票的中奖号码中，每一部分都包含整体。每一个中奖号码都是一个全息元。所以在建立的干支数字信息载体总系统中，根据其中的任何一部分，任何一结构，任何一项“元素”的五行状态或属性，任何一个位置号码都可以映射出未知的、需要预测的位置号码或总体结构。

大量地、科学地建立干支数字信息总系统的各个分体系就是要充分发挥每个全息元对于预测中奖号码的有价值的作用。

第五节 概率学与统计分析学

概率也叫机会，概率论就是研究大量随事件发生的机会的科学。它告诉人们某些随机事件发生的可能性是多大，是指导人们处理随机事件的一门科学。

在同样一组条件大量重复之下，某一随机事件出现的次数往往有某种非常明确的规律性，即事件出现的百分率与某个常数很接近，这就是所谓的概率均衡论。

概率均衡理论对于“伪随机”的彩票中奖号码而言，在理论上，从十分长远、巨大的开奖期数来统计，每一个号码的出没，每一组号码的排列组合，其出现的机会都是均等的。

几率，系指在已经发生的随机事件中，某一种随机事件在整个随机事件中所占的比例。

概率是由相当巨大的数据统计后得出的结论，描述的是一种大的整体的趋势，而几率是较少数据统计的结果，是着重反映和

描述一种(当前)具体的趋势和规律,是阶段性的趋势和规律。例如:某地方彩票的1至5共五个特别号码,根据10年的开奖数据统计,1—5的号码出现的总体次数大致相同(几乎都是192次),但是,最近二个月的开奖数据统计显示(一周开奖两次),在16次的开奖过程中,特别号码“5”出现了6次!号码“2”出现了4次,号码“3”出现4次,号码“4”仅出现了1次,号码“1”仅出现1次。

概率和几率的关系,是整体和具体的关系。几率随着随机事件的次数的增加,会趋向于概率。因此,在处理具体的随机事件时,用概率作总体性的指导,以几率作为分析当前的趋势和特点之依据。

所以,决定当前期次的中奖号码的出没决不在于概率均衡规律的作用。中奖号码的出没规律性的内因是号码间的阴阳两种势力的互相调和,互相平衡,通过相生相克规律来调节,改变其质变与转化过程;外因则是摇奖机的结构,摇奖机的各种软硬件,球的形状、重量、重心、表面光滑程度、气流对球的作用力以及开奖的环境、时间等等。中奖号码出没规律性的内因是变化的依据,外因是变化的条件,外因通过内因起作用。换句话说,因为“概率”不是号码的时空信息载体,预测彩票中奖号码的出没,决不能仅凭开奖号码整体的出没的概率、“冷热次数”去决定当前期次的中奖号码!

过去,不少彩民运用概率均衡论去预测中奖号码,费了不少时间,但收效甚微。这就是在预测方法上陷入了误区的具体反映,难免事倍功半。

我们提倡的统计,不仅仅是统计号码出现的总次数,而是要通过统计某种变化的明显的现象之几率“次数”,以识别这种变化的临界点!

统计分析是用统计方式所获得的大量定性定量化的信息资

料,按照一定的目的和要求进行分析、判断、整理,得出一些新的结论,生成出一些新的信息。

统计分析具有四个基本特征:

第一,它是用数字来回答问题,而不是纯理论的推导。

第二,是以大量的已知的统计资料为基础的,统计分析强调事物运动的整体性,反对运用个别数据、个别事例来分析问题,而是要运用全面性资料来说明事物运动的整个情况或某一方面的情况。统计资料越丰富、全面,统计分析的结论才越科学。

第三,统计分析的结论是真实可靠的。因为它是一种数量关系的分析,不同于加入了人的主观因素的定性分析,比较客观。同时,它又是运用大量的数据为基础,在分析过程中又进行了加工、比较、筛选,选用最确切又能反映事物运动变化本质的数据化信息,因而统计分析的结论可靠、真实。

第四,统计分析要利用包括电子计算机和数学方法等在内的现代运算手段和方法。在加工处理大量数据时,就离不开数学方法,把数学方法作为一种工具,用来分析大量而复杂的事物现象和变化,因而用数学方法作为工具的统计分析具有科学性的特征。

以唯物的哲学概念作指导,掌握大量的、已知的、依开奖时间顺序排列组合的中奖号码的“数据库”,运用数学方法,运用五行理论,对中奖号码出没过程中的变化现象进行定性乃至定量的统计,这种综合过程才是彩票中奖号码预测的统计分析!只有这样,有了真实可靠的统计分析,才能制定出切合时宜的“标准”——识别各种变化的明显临界点的“标准”。

为什么在我们的统计分析后必须要制定识别各种变化的明显临界点的“标准”?

1. 中奖号码的出没是千变万化,而且是偶然,伪随机,要完全

掌握中奖号码的隐蔽的出没规律性不容易，所以必须也只能够从中奖号码出没过程中出现的各种特殊的、特别的、明显的临界点着手，只有如此，我们才能够准确地识别它，掌握它，才能够保证预测结论的准确性。

2. 质变是从量变开始，通过量变完成，但也要注意量变的时候就包含着质变。这种状态在彩票中奖号码的出没过程中是最常见的，也是因为其突变的原因，这种变化的临界点较难识别和掌握，为了确保所有预测结论均能达到 99% 以上准确率的预测水平，只能够采取“明显者用之，不明显者弃之”的策略和方法。

3. 这是彩票中奖号码出没的特殊性之必然要求。站在预测角度而言，我们不需要也无必要去知道某地方某摇奖机产生的中奖号码有多“随机”，只需要知道和充分利用这些彩票的中奖号码在大量的出没历史过程中所呈现出各种变化的明显临界点而又能被人们准确地识别即可！

把预测中奖范围压缩到一个最小的范围，从而大大提高中奖率，这就是知识博彩的价值和作用！

没有绝对的可预测性，也没有绝对的不可预测性！

[记住]彩票中奖号码在某一时空是否出没，不是由“概率”决定，而是由其变化的几率之内因和外因共同作用决定。

如下是一些彩票各游戏规则下中头奖的理论概率：

规则	中头奖(即全中)的理论概率
37 选 7	1/10295472
36 选 7	1/8347680
35 选 7	1/6724520
34 选 7	1/5379616
33 选 7	1/4272048
32 选 7	1/3365856

31 选 7	1/2629575
30 选 7	1/2035800
29 选 7	1/1560780
四花选 4	1/28561
50 选 5	1/2118760
48 选 5	1/1712304
49 选 6	1/13983816
47 选 6	1/10737573

第六节 唯物认识论与方法论在彩票

中奖号码预测中的反映

万事万物变化现象都是质变和量变的辩证统一，一定的质规定一定的量，一定的量表现一定的质。事物变化发展过程是不断地从量变转化为质变，又由质变转化为新的量变的过程，如此循环往复以至无穷。这是唯物辩证法的认识论。

对于预测彩票中奖号码，不能简单地就数论数，必须以唯物的哲学概念作为指导，认识中奖号码出没的规律性的内因和外因，掌握中奖号码在出没过程中所形成的各种变化的明显临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到准确的预测目的。

预测是对不确定的或不知道的事件作出叙述。可靠的预测既是科学，也是艺术。进行预测不仅是利用历史数据和计算公式去估计未来的情况，作出有准确实用价值的预测的关键是把明智的判断和本能的直觉与科学的预测方法相结合，使得所探索的未来事物的不确定性尽量减少。

鉴于彩票中奖号码出没过程的“偶然随机”，变化万千，要准

确地预测中奖号码，就必须找出和建立一个相对标准体系，找出一些固定的数字信息载体，把中奖号码与相对标准体系或数字信息载体进行挂钩对应，目的就是能认识和把握中奖号码出没过程中所产生的各种变化现象的性质与特征，在此基础上，对这些已定性的各种变化现象进行统计分析，制定出能识别变化的明显临界点之“标准”，然后利用“标准”并且具体问题具体分析地去识别判断某种变化发展的转折点，最后才综合各方面的预测初步结果得出准确的定量的预测结论。

上述几点论述就是彩票中奖号码预测学的唯物认识论。

有了科学的认识论，还必须相应有科学的方法论去指导实践，去解决实际问题。

彩票中奖号码预测学，从总体原则上来说，预测方法大体上有三大类：

1. 外推法。利用过去的资料数据来预测未来状态的方法。过去和未来当然存在着偶然或必然的联系，这种联系是外推法赖以建立的客观基础。这种方法的最大优点是简单易行，只要有关于过去开奖号码的可靠数据就可对未来作出预测。缺点是撇开了从因果关系上去分析过去与未来之间的联系，只“凭数据说话”，因此长期预测的可靠性不高，但在短期和近期的预测上往往用得较多，效果奇佳。

2. 因果法。这种方法强调去找出事物变化的原因，找出原因与结果之间的联系方式，并据此预测未来。这也是彩票中奖号码预测学中常用的方法。

3. 直观法。主要靠人的经验和综合分析能力来预测。这种方法虽然自古有之，但如何做到尽量尊重客观实际，符合客观实际，而不陷于主观武断，仍大有讲究，我们提倡的预测中奖号码的“直观法”，就是对中奖号码出没的趋势与特点有充分的感性认识后

的升华。大胆假设,小心求证。在预测过程中,有时在某一项内容的预测上往往采取“直观法”也能得到正确结论。

无论采取外推法,或者因果法,还是应用直观法,前提是要千方百计地确保预测结果是准确的,所以,为了取长补短,为了尽量避免意外,在彩票中奖号码的预测过程中,自始至终必须坚持“事应过三”的验证法则!

“事应过三”验证法则:鉴于开奖号码的“偶然伪随机”的变化状态之特点,有时某一环节或某一项变化状态超出所制定的“标准”,令你意想不到以致产生失误。所以,为了防止这种意外,避免失误,确保预测结果的准确性,在彩票中奖号码的整个预测过程中,凡是作出任何一个预测结果,必须至少还有三种以上其他不同方式、不同渠道的一致预测结果来进一步证实。

长期的实践证明,某种变化的状态,可以意外地突破一种预测方式的“关卡”,但它不会同时突破三种以上不同方式或不同渠道所设下的“关卡”。凡是达不到“事应过三”验证法则所要求的预测结论,只能弃之!

1057215

第二章 彩票中奖号码预测的基础知识

第一节 历法的基本知识

一、历法

所谓“历法”是指推算年、月、日的长度和它们相互之间的关系,制定时间顺序的法则。

太阳、地球、月亮自身及相互间的运动,形成了人对日、月、年的概念,人们根据地球自转,产生昼夜交替的现象,形成了“日”的概念;根据月亮绕地球公转,产生朔望,形成“月”的概念;又根据地球绕太阳公转产生四季交替的现象而形成了“年”的概念。三个概念所依据的物质运动是互相独立的。据精确测定,地球绕太阳公转一周的时间约为 365.2422 平太阳日,这叫一个回归年,从一次新月到发生一次新月时间间隔为 29.530 平太阳日,这叫一个朔望月。以回归年为单位,在一年中安排多少个整月,在一月中又安排多少个整数天的方法和怎样选取一年的起算点的方法,就叫“历法”。

由于回归年和朔望月这两个周期太零碎,它们与“日”之间的关系,并不完全吻合,而且,它们彼此之间也不能通约。这就形成了历法问题的复杂性。它总是顾此失彼,难以同时协调两个周期。也由于这种原因,历法一般分太阴历、太阳历和阴阳历三类。侧重协调朔望月和历月关系的叫太阳历,简称阴历;侧重协调回归年和历年关系的叫太阳历,简称阳历;兼顾朔望月和回归年、历月和历年的叫阴阳历。

无论哪种方法,都有一个协调历日周期与天文周期关系的问题。其原则是:历月应力求等于朔望月,历年应力求等于回归年,

但因朔望月和回归年都不是整日数。所以历月就有大月和小月之分,历年就有平年和闰年之别。通过大月和小月,平年和闰年的适当配搭和安排,使平均历月等于朔望月,或平均历年等于回归年,这就是历法的主要内容。

“历书”就是排列年、月、日、节气等供查考的工具书。历书是人类创造的重要文化成果之一。

二、农历

我国自古沿用农历。“农历”之称,可能来源于我国以农立国,制订历法必须以服务农业为本所故。我国的农历,并不是完全的阴历,也不是完全用阳历,而是阴阳两历并用的历法。

农历虽然也把朔望月的时间作为历月的平均时间,但农历运用了设置闰月和二十四节气的办法,使历年的平均长度等于回归年。这就使它又具有阳历的成分。所以它较之纯粹的阴历要好。

根据我国历史记载,从黄帝到清末,我国人民使用过百余种历法,但基本上都是阴阳历的性质。经过漫长时间的不断观察、研究、修正,我国人民早在三四千年前就将纯粹的阴历和阳历很好地调和起来,这确是我们祖先的一大发明。

农历的历月是以朔望月为依据的。朔望月的时间是 29 日 12 小时 44 分 3 秒(即 29.5366),因此农历也是大月 30 天,小月 29 日,但它和纯粹的阴历并不完全一样,因为纯粹的阴历是大小月交替编排,而农历的大小月是经过推算决定的。农历每一个月初一都正好是“朔”(即月亮在太阳地球中间,而且以黑暗的半面对对着地球的时候)。有时可能出现两个大月,或连续两个小月。由于朔望月稍大于 29 天半,所以农历每 100 个历月里,约有 53 个大月和 47 个小月。

农历是基本上以 12 个月作为一年的。但 12 朔望月的时间是 354.3667 日,较回归年要相差 11 天左右。这样每隔 3 年就要多出

33天,即多出一个月。为了把多余的日数消除,每隔3年就要加一个月,这就是农历的闰月。有闰月的这一年就叫闰年。所以农历的闰年就有13个月了。究竟闰哪个月,是由节气来决定的。

三、阳历(即新历)

“阳历”又名“太阳历”,系以地球绕行太阳一周为一年,为西方各国所通用,故又名“西历”。我国自民国元年采用阳历,为与我国旧有之历相对称,故又名曰“新历”。

年有三种:地球绕日一周。历三百六十五日六小时九分九秒,谓之“恒星年”;太阳过近地点循黄道东行一周,复过近地点,历三百六十五日六小时十三分四十八秒,谓之“近点年”,太阳过春分四十六秒,谓之“回归年”,亦称“岁实”,因二分点(春分点秋分点)每年沿黄道向西逆行约五十秒,故回归年较恒星年之时间短,相差二十分二十三秒,谓之“岁差”。

此三种年时时间不同,欲使每年之节气寒暑不变,故取回归年为制历之年。自一月一日至次年一月一日谓之一年,年长本应与岁实相等,然一年之日数,必须是整数,不便将奇零之时数计入,故以三百六十五日一年,每年余五时四十八分四十六秒。积至四年约满一日,故每四年增加一日,为闰日,该年因为有“闰日”,故谓之“闰年”,其无闰日之年,谓之“平年”,平年三百六十五日,闰年三百六十六日。

但四年之闰余,仅二十三时十五分四秒,今闰一日,未免过多,超过之四十四分五十六秒,积至二十五闰,为十七时五十八分二十四秒,约合一日之四分之三,故每满百年废一闰,至第四百年又不废。如是每四年置一闰,每四百年减三闰,计超时二小时五十三分二十秒,须八个四百年后,即三千二百年后,始补足此一日之差。

置闰之法:为便利起见,按公元计算,凡公元年数能以四除

尽者(例如一九七二年、一九七六年)皆为闰年,惟世纪年(例如一八〇〇年,一九〇〇年)则不闰,世纪年之世纪数可以四除尽者(例如一六〇〇年、二〇〇〇年)则仍为闰年,若以百除之得整数,再以四除之而除不尽者,皆不置闰,其能除尽者则仍为闰年。

地球之轨道为椭圆形,故距日有远近,一月一日,其距离最近,谓之“近日点”。七月二日距离最远,谓之“远日点”。一年的开始,谓之“岁道”,亦称“年始”,阳历以近日点为岁首,为元月一日。

四、阳历月大月小

阳历每年分十二月,每月的日数不规则,月大三十一天,月小三十天,平年二月二十八天,闰年二月二十九天。阳历一个月,与月球的运行无关,不过是一年分为十二段,失去月的意义。除二月份有平年闰年之分外,每年各月的天数均有一定,七月以前,单月是三十一天,双月三十天,八月以后,双月是三十一天,单月三十天。

五、干支纪年、月、日、时

我国农历记时方法的一种,把十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)与十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)顺序两两配组,共配成60干支组,叫做一个“甲子”。干支最先用来纪日、纪年,后来也用来纪月、纪时。

1. 干支纪年:每一年以一个干支组来记录,因为只有60对干支组,所以60年后,干支纪年又循环开始,干支纪年的界线划分是以农历中的二十四节气中的立春作为标准,立春前均视作去年,立春(包括立春日)后,视作今年。至于每年的立春节气,查阅农历即可知道。

2. 干支纪月:有其具体规定。首先把十二个月配以地支。十一月为子、十二月为丑、一月为寅、二月为卯、三月为辰、四月为巳、五月为午、六月为未、七月为申、八月为酉、九月为戌、十月为亥。

3. 干支纪日：每天用一组干支来代表，60 天一个循环。这种纪日的方法在甲骨文之中已有大量记载。用以连续不断的纪日，最迟是从春秋时期鲁隐公三年（相当公元前 722 年）二月己巳日起至今！即已有近 2700 多年之久。

4. 干支纪时：一天的十二时辰表是（即地支纪时）

子：下午十一时至夜一时 午：上午十一时至下午一时

丑：夜一时至三时 未：下午一时至三时

寅：夜三时至晨五时 申：下午三时至五时

卯：晨五时至七时 酉：下午五时至七时

辰：上午七时至九时 戌：下午七时至九时

巳：上午九时至十一时 亥：下午九时至十一时

由上可知，传统的十二时辰是以夜十一时为起算，十一时以前为一日，夜十一时以后为次日，与西方零时即十二时起算差了一小时。

[重要说明]

1. 上述花了不少笔墨介绍历法的基本知识，广大彩民仅需要明白：原来历法的编排（包括农历和新历、干支）是如此历史悠久，科学精准！

2. 农历日子与新历日子，干支日子是非常科学和有规律的记时的体系！

3. 鉴于农历的日子、新历日子、干支日子的功能具有“以不变应万变，以变应变”的特点而且其有现成的“尾数”或五行属性，所以把它们作为标准参照系而与千变万化的彩票中奖号码进行挂钩对应是十分恰当的！两者对应挂钩的时间就是以开奖日为准。换句话说：开奖日的开奖号码与当日的农历尾数、新历尾数及干支有着直接或间接的数字信息和五行属性的对应关系。

4. 在彩票中奖号码的预测过程中，我们不需要掌握农历日

子，新历日子、干支是如何产生和形成的，只需要知道通过查阅“日历”而获得开奖日的相关资料与数据即可。

5. 农历日子中，根据“同尾数法则”其中：

初一、十一、二十一，为同一类，看作[1]，属水。

初二、十二、二十二，为同一类，看作[2]，属火。

初三、十三、二十三，为同一类，看作[3]，属木。

初四、十四、二十四，为同一类，看作[4]，属金。

初五、十五、二十五，为同一类，看作[5]，属土。

初六、十六、二十六，为同一类，看作[6]，属水。

初七、十七、二十七，为同一类，看作[7]，属火。

初八、十八、二十八，为同一类，看作[8]，属木。

初九、十九、二十九，为同一类，看作[9]，属金。

初十、二十、三十，为同一类，看作[0]，属土。

6. 新历日子中，根据“同尾数法则”，

其中：

(1)、(11)、(21)、(31)，为同一类，看作[1]，属水。

(2)、(12)、(22)，为同一类，看作[2]，属火。

(3)、(13)、(23)，为同一类，看作[3]，属木。

(4)、(14)、(24)，为同一类，看作[4]，属金。

(5)、(15)、(25)，为同一类，看作[5]，属土。

(6)、(16)、(26)，为同一类，看作[6]，属水。

(7)、(17)、(27)，为同一类，看作[7]，属火。

(8)、(18)、(28)，为同一类，看作[8]，属木。

(9)、(19)、(29)，为同一类，看作[9]，属金。

(10)、(20)、(30)，为同一类，看作[0]，属土。

7. 即是说，开奖日的农历尾数、新历尾数的五行属性与中奖号码尾数之五行属性是相对应的，相通的，也是对等，即两者间可

以自由地进行五行属性的相生相克关系的对应！这是彩票中奖号码预测的重点内容。

第二节 干支的基本知识

一、干支的起源

干支是由天干与地支构成，包括十个天干与十二个地支。如下介绍十二地支的由来。

1. “子”——就是“孳”，表示万物繁茂的意思。
2. “丑”——就是“纽”，是用绳子捆住的意思。
3. “寅”——就是“演”或“蜃”，指万物开始伸长的意思。
4. “卯”——就是“茂”，为万物茂盛的意思。
5. “辰”——就是“伸”或“震”或“振”，也就是万物震动伸长的意思。
6. “巳”——就是“已”，指万物已成的意思。
7. “午”——就是“忤”，指万物已过极盛之时，又是阴阳相交的时候。
8. “未”——就是“味”，是万物已成有滋味。
9. “申”——就是“身”，是万物粗具形体的意思。
10. “酉”——就是“老”或“鲍”或“西”字，指万物十分成熟的意思。
11. “戌”——就是“灭”，指万物消灭归土的意思。
12. “亥”——就是“核”，指万物成“种子”的意思。

如下介绍十天干的由来：

1. “甲”——就是“铠甲”，指万物冲破其“甲”而突出的意思。
2. “乙”——就是“轧”，指万物伸长的意思。
3. “丙”——就是“炳”字，指万物茂盛的意思。

4. “丁”——为“壮”，指到达“壮丁”的时候。
5. “戊”——为“茂”字，也是万物繁茂的意思。
6. “己”——为“起”字，指万物奋然而起。
7. “庚”——为“更”字，指万物更新的意思。
8. “辛”——就是“新”字，为万物一新的意思。
9. “壬”——为“任”或“妊”字，为万物被养育的意思。
10. “癸”——为“揆”字，万物萌芽的意思。

二、天干的基本知识

天干地支简称——干支。如今，人们普遍认为干支的作用只是用来纪时，纪历法，而对于干支在其他方面的巨大作用知之甚少。

广义上的干支，有着浩瀚巨量的信息内涵，这种信息不是固定不变的，而是当干支应用于不同的学科，不同的事物，就会有不同的含义和意义，反映和折射出不同的信息！

例如传统中医学理论中的“干支”则反映出是医学信息；干支应用于经济领域，其反映的是经济信息；干支应用于天文反映出的是时间信息；干支应用于彩票中奖号码方面，则其反映出的是依五行属性运动的号码信息。这个观点十分重要，请广大彩民必须记住和理解！

什么是天干？天干就是信息代码，宇宙万事万物的信息的载体；它们的名称及排列顺序是：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，俗称十天干。

什么是地支？地支就是信息代码，宇宙中万事万物信息的载体；它们的名称及排列顺序是：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，俗称十二地支。

天干、地支的原始意义及其排列序位是指万物生、长、化、收、藏，代表万物产生、发展、壮大、灭亡、更生的整个变化过程。

从时空信息来讲，天干地支可用来代表时间和空间，从而建立起时空体系框架；从全息理论来讲，天干、地支作为事物的信息载体而被广泛应用。天干、地支中蕴含的信息是多元化的和巨量的。

在彩票中奖号码预测学应用方面，开奖日的天干、地支是中奖号码数字信息演示的载体之一，其运作机理寓于系统内的号码间的相生相克，其方位（即空间位置）转移显于中奖号码经过排列后的位置，其过程延续归于由 60 对天干地支（即干支）组成的“六十甲子纳音”的循环不息之中。

天干、地支的哲理性，中奖号码间的依存性，中奖号码体系和系统的空间之抽象性和开奖时间的相对性（包括开奖日的农历日子、新历日子），构成了彩票中奖号码信息演示的特殊性！这种特殊性，乃是预测过程中的重要预测依据。

[记住]

把彩票中奖号码的出没规律的变化信息与开奖日的天干地支挂钩对应，以具有“不变就万变，以变应变”的功能的天干地支作为标准参照系，只要能识别或破解中奖号码与天干地支的对应过程中所产生的各种变化状态的临界点也即是“信息密码”，就能准确地进行预测中奖号码！

三、论六十花甲纳音法

十天干中，甲、丙、戊、庚、壬、为阳干；乙、丁、己、辛、癸为阴干。

十二地支中，子、寅、辰、午、申、戌为阳支；丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

一个天干和一个地支相配合，排列起来，天干在上，地支在下，天干由甲起，地支由子起，阳干配阳支，阴干配阴支（注：阴干不配阳支，阳干不配阴支）共有六十个组合，叫做“六十花甲”。

我国六十花甲循环纪年、纪月、纪日,由来已久,其图表如下:

甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未
甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯
甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑
甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

至于天干地支组合成干支后,干支的五行属性称为“纳音”。干支的纳音如何制定?据六微指论云:天气始于甲,地气始于子,子甲相合,命曰岁,以十干配十二支,周而复始,则六甲成矣。凡欲纳音者,谓子、午数至庚,丑、未数至辛,寅、申数至戊,卯、酉数至己,辰、戌数至丙,巳、亥数至丁;得七者,西方素皇之气,纳音属金也;得三者,南方丹气之气,纳音属火也;得九者,东方阳九之气,纳音属木也;得一者,中央总统之气,纳音属土也;得五者,北方玄极之气,纳音属水也。故颂曰:七金三是火,九木一中央,得五皆为水,纳音宜审详(仅供参考,没必要熟记。)

例如,甲子、甲午从甲到庚;乙丑、乙午、从乙至辛,其数皆七,所以纳音俱属金也。丙寅、丙申,从丙至戊,丁卯、丁酉,从丁至己,其数皆三,所以纳音属火也。戊辰、戊戌,从戊数至丙,己巳、己亥,从己至丁其数皆九,所以纳音属木也。庚子、庚午、辛未、辛丑,其数皆一,所以纳音属土也。丙子、丙午,从丙至庚,丁未、丁丑、从丁至辛,其数皆五,所以纳音属水也。余皆仿此。以上只数其干,不数其支。又例如,从丙至庚,即丙、丁、戊、己、庚,是其数五也。又如从甲到庚,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚,是其数七也。

纳音分为金、木、水、火、土五大类,从全息理论来讲,干支的纳音自然也成为彩票中奖号码的数字信息载体!

[重要说明]

1. 研习和预测彩票中奖号码，不必拘泥于传统文化理论的来源及其产生机理，只要认识和掌握干支的构成及其五行属性而加以运用于预测过程中即可。

2. 由于天干、地支及其所组成的干支纳音均是已知的，相对固定的，但又不断地有规律地变化着，它们是信息载体。鉴于它们自身的组合变化有特定的顺序及其规律，所以充分发挥它们这种“以不变应万变，以变应变”的功能以及把它们这个生生不息、循环往复的体系视作为与千变万化的彩票中奖号码出没规律进行对照的标准参照系是十分恰当的！

3. 针对彩票开奖时间的相对固定，也为了使开奖日的干支纳入一个固定不变的“六十花甲纳音”顺序循环之中，我们以一周的固定某日开奖一次作为（标准的）正常顺序，这样开奖日的干支及其纳音的排列顺序是固定不变的，而且循环往复，这就很好地便于预测技术和预测方法的设置。所以，本书所讲的正常顺序，所讲的干支数字信息载体总系统是以一周开奖一次所产生的相应中奖号码依时间次序排列的顺序及由此顺序排列中奖号码形成的系统。若一周开奖 2—3 次，则以 7 日作为一个周期来考虑，相应地分别建立其“正常顺序”和各个体系。

[记住]

如下便是每周开奖一次时，开奖日的固定不变之干支及其纳音体系，其排列顺序为：

开奖日(七日为一周期)干支	当日干支的纳音
辛酉	木
戊辰	木
乙亥	火
壬午	木

己丑
丙申
癸卯
庚戌
丁巳
甲子
辛未
戊寅
乙酉
壬辰
己亥
丙午
癸丑
庚申
丁卯
甲戌
辛巳
戊子
乙未
壬寅
己酉
丙辰
癸亥
庚午
丁丑
甲申
辛卯

火
火
金
金
土
金
土
土
水
水
木
水
木
木
木
火
火
金
火
金
金
土
土
土
水
土
水
水
木

戊戌
乙巳
壬子
己未
丙寅
癸酉
庚辰
丁亥
甲午
辛丑
戊申
乙卯
壬戌
己巳
丙子
癸未
庚寅
丁酉
甲辰
辛亥
戊午
乙丑
壬申
己卯
丙戌
癸巳
庚子

木
火
木
火
火
金
金
土
金
土
土
土
水
水
水
木
水
木
木
火
火
金
火
金
金
土
土
土
水
土

奖日的中奖号码的五行属性是相对应的、相通的、对等的！即天干的五行属性可以自由地与中奖号码尾数的五行属性进行相生相克关系的对应。

五、地支的五行属性及其相生相克关系

十二地支名称及其排列顺序：

子、丑、寅、卯、辰、巳（音：读四）、午、未、申、酉（音：读有）、戌（音：读须）、亥

地支阴阳分类：

阳支	子	寅	辰	午	申	戌
阴支	丑	卯	巳	未	酉	亥

地支五行归属：

地支	寅、卯	巳、午	申、酉	子、亥	丑、辰、未、戌
五行	木	火	金	水	土

地支五行相生规律：

（寅、卯）木^生（巳、午）火^生（丑、辰、未、戌）土^生（申、酉）金^生（子、亥）水^生（寅、卯）木

地支五行相克规律：

（寅、卯）木^克（丑、辰、未、戌）土^克（子、亥）水^克（巳、午）火^克（申、酉）金^克（寅、卯）木

[重要说明]

在彩票中奖号码预测的过程中，所有地支的五行属性与开奖日的中奖号码的五行属性是相对应的、相通的、对等的！即地支的五行属性可以自由地与中奖号码尾数的五行属性进行相生相克关系的对应！

第三节 十二地支(生肖)与号码数字关系的基本知识

十二地支配以十二种动物即为我们日常所说的十二生肖,其顺序为;子配鼠,丑配牛,寅配虎,卯配兔,辰配龙,巳配蛇,午配马,未配羊,申配猴,酉配鸡,戌配狗,亥配猪。

关于这样匹配的理由有这么一种论述:

是为了分别阴阳。《素问·阴阳应象大论》中说:“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。”阴阳作为一种哲学思想,是中国先哲对整个宇宙间的一切事物的认识和概括,它试图用阴阳两个基本范畴说明宇宙事物的性质和规律,因此,不仅在十天干中分阴阳,在十二地支中也作这种区别,以期达到一种哲学方法上的整体把握。

古先哲认为:四爪为阴,五爪为阳;圆为阳,方为阴。因为鼠前足四爪,后足五爪,因而兼其阴阳两性,以鼠配子,居十二生肖之首。牛方蹄像阴,以配丑;虎五爪像阳,以配寅;兔四爪像阴,以配卯;马圆蹄像阳,以配午;羊方蹄像阴,以配未;猴五爪像阳,以配申;鸡四爪像阴,以配酉;狗五爪像阳,以配戌;猪四爪像阴,以配亥。

至于十二生肖与号码数字的关系,可依如下规则确定:

当年的生肖作为基数:1(岁),每递增12年为一小周期,周而复始。即:1,13,25,37,49,……其他者均每递增12年为一小周期,这样就形成了“生肖岁数”,也即是“生肖数字”。

1, 13, 25, 37, 49, ……

2, 14, 26, 38, 50, ……

3, 15, 27, 39, 51, ……

4, 16, 28, 40, 52, ……

5, 17, 29, 41, 53,

6, 18, 30, 42, 54,

7, 19, 31, 43, 55,

8, 20, 32, 44, 56,

9, 21, 33, 45, 57,

10, 22, 34, 46, 58,

11, 23, 35, 47, 59,

12, 24, 36, 48, 60,

即是说,每一个数字之间均相隔为 12,数字间隔是固定的,但随着“岁数”的逐年递增,生肖的名字是不断依次序进行变换,直到“12 年”为一小周期后,生肖的名字才又重新与“12 年前”的生肖名字一致。

所谓生肖码就是指:在彩票的中奖号码预测过程中,把游戏规则下的各个彩票号码分别与当年农历的“生肖岁数”进行对应,即“生肖岁数”就是号码数,该号码数的生肖名字就与该岁数的当年生肖名为一致,这就形成了“生肖码”。

生肖码间数字关系是固定不变的,生肖码的名字以该年的 1 岁的生肖名字作为基准,再按十二生肖原有的排列顺序依次命名。

每年的生肖名字界定线是以农历“立春”这一节气之日来划分。即“立春”日前的生肖码名字依旧,“立春”日后的同一生肖码的名字则依十二生肖的排列顺序相应改变。

每一个彩票号码与“生肖岁数”对应挂钩后形成了每年变化一次生肖名字的“生肖码”,任何一个生肖码就相应拥有该名字生肖的五行属性和生肖属性。把生肖码与开奖日的干支这个信息载体进行五行的各种特定关系、相生相克关系对应时,通过其中所反映出的变化趋势与特点就可以达到某些预测目的。

如下就是 2000 年(龙年)、2001 年(蛇年)和 2002 年(马年)的

十二生肖码:(其他年次,依此类推)

(生肖码) 数字号码	2000 年(龙年) 生肖名	2001 年(蛇年) 生肖名	2002 年(马年) 生肖名
1, 13, 25, 37, 49	辰 (龙)	巳 (蛇)	午 (马)
2, 14, 26, 38, 50	卯 (兔)	辰 (龙)	巳 (蛇)
3, 15, 27, 39, 51	寅 (虎)	卯 (兔)	辰 (龙)
4, 16, 28, 40, 52	丑 (牛)	寅 (虎)	卯 (兔)
5, 17, 29, 41, 53	子 (鼠)	丑 (牛)	寅 (虎)
6, 18, 30, 42, 54	亥 (猪)	子 (鼠)	丑 (牛)
7, 19, 31, 43, 55	戌 (狗)	亥 (猪)	子 (鼠)
8, 20, 32, 44, 56	酉 (鸡)	戌 (狗)	亥 (猪)
9, 21, 33, 45, 57	申 (猴)	酉 (鸡)	戌 (狗)
10, 22, 34, 46, 58	未 (羊)	申 (猴)	酉 (鸡)
11, 23, 35, 47, 59	午 (马)	未 (羊)	申 (猴)
12, 24, 36, 48, 60	巳 (蛇)	午 (马)	未 (羊)

[重要说明]

1. 为了便于预测,在记录开奖日的中奖号码相应生肖名时,只记录其相配的地支名,这样就能与开奖日的干支中之地支名互相一致,不易产生混淆。

2. 每一期次的中奖号码,就是由若干个相应的生肖(地支)组成。

3. 生肖(地支)有十二个,而传统型彩票,其每一个位置均是由 0-9 十个号码组成,这十个号码中,数字“0”作“10”计;因为无数字“11”和“12”与生肖对应,所以每一年次数字“11”和“12”所对应的生肖就自然空缺。但这不会影响生肖码的预测方法的使用和预测结果。

第三章 彩票中奖号码的结构

任何事物均有其结构。要认识和掌握事物的特性和本质，就要剖析事物的独特结构。

在这里，列举一事例，以证明事物的结构进行重新调整和排列后，其中某些性能得以改变而产生新的使用价值。

继信息技术、基因组工程之后，纳米技术又成为一颗新的科技明星。纳米究竟是什么东西？纳米（nm）实际上是一种计量单位，1 纳米是 1 米的十亿分之一，相当于十个氢原子一个挨一个排起来的长度，人的一根头发丝的直径相当于 6 万个纳米。而纳米技术则是指在纳米尺寸范围内，通过直接操纵单个原子、分子来组装和创造具有特定功能的新物质。当物质颗粒小到纳米量级后，这种物质可被称为纳米材料。神奇的是：同一种物质，因为构造上以纳米为单位的变化，其物理性能与化学性质便会产生意想不到的巨变！发现纳米技术的科学家们坚信，“小”不仅是美丽的，而且是未来、科学技术发展的趋势。纳米技术将引发一场新的工业革命。

所以，在彩票中奖号码预测过程中，对中奖号码在结构上进行分类、整理、排列，不仅是必需的手段，而且也是预测中奖号码出没规律性的特殊要求。

彩票中奖号码的结构，就是研究分析中奖号码的组成结构及其这些结构的组合、发生的内在联系和变化规律。认识和掌握了中奖号码的结构或者重新对中奖号码的结构进行新的排列组合后而产生可以容易被人们利用的变化特点，就可以在总体和局部上把握中奖号码出没变化的规律性，从而达到预测目的！

中奖号码的总体结构可分为：主题、副码；主题类型；数型、配

伍；位置五行属性、总体五行状态；奇偶性、总和数值，共五大部分。

第一节 主题与副码

在 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 这十个数中,有这样一个规律:

$$1 + 9 = 10 \quad \text{——简称 } 1 \cdot 9$$

$$2 + 8 = 10 \quad \text{——简称 } 2 \cdot 8$$

$$3 + 7 = 10 \quad \text{——简称 } 3 \cdot 7$$

$$4 + 6 = 10 \quad \text{——简称 } 4 \cdot 6$$

$$5 + 0 = 10/2 \quad \text{——简称 } 5 \cdot 0$$

为了便于在总体上对彩票中奖号码的出没进行把握,把两个或两个以上的尾数为 [1] 或 [9] 的数字、号码看成是一个整体,这个搭配后的整体就称为主题。鉴于这个主题是由 [1] 或 [9] 组成,故称为 [1 · 9] 主题。

其他的主题均如此类推。包括 [2 · 8] 主题, [3 · 7] 主题, [4 · 6] 主题, [5 · 0] 主题。

在彩票中奖号码的预测学中,为了便于预测和推算,把 [1 · 9] 主题定性为“水”主题,把 [2 · 8] 主题定性为“火”主题,把 [3 · 7] 主题定性为“木”主题,把 [4 · 6] 主题定性为“金”主题,把 [5 · 0] 主题定性为“土”主题,即它们就分别拥有该五行属性了。

即:[1 · 9] 主题属水,包括 [1 + 9], [1 + 1], [9 + 9];

$$[9 + 9 + 9], [1 + 1 + 9], [9 + 9 + 1], [1 + 1 + 1];$$

$$[9 + 9 + 9 + 9], [1 + 1 + 1 + 1], [1 + 1 + 1 + 9]$$

$$[9 + 9 + 9 + 1], [9 + 9 + 1 + 1], \text{等等。}$$

[2 · 8] 主题属火,包括 [2 + 8], [2 + 2], [8 + 8];

$$[2 + 2 + 2], [8 + 8 + 8], [8 + 8 + 2], [2 + 2 + 8];$$

$[2+2+2+2]$, $[8+8+8+8]$, $[2+2+2+8]$

$[8+8+8+2]$, $[2+2+8+8]$, 等等。

$[3 \cdot 7]$ 主题属木, 包括: $[3+7]$, $[3+3]$, $[7+7]$;

$[3+3+3]$, $[3+3+7]$, $[7+7+3]$, $[7+7+7]$;

$[3+3+3+3]$, $[7+7+7+7]$, $[3+3+3+7]$

$[7+7+7+3]$, $[3+3+7+7]$, 等等。

$[4 \cdot 6]$ 主题属金, 包括: $[4+6]$, $[4+4]$, $[6+6]$;

$[4+4+4]$, $[6+6+6]$, $[4+4+6]$, $[6+6+4]$;

$[4+4+4+4]$, $[6+6+6+6]$, $[4+4+4+6]$,

$[6+6+6+4]$, $[4+4+6+6]$, 等等。

$[5 \cdot 0]$ 主题属土, 包括: $[5+0]$, $[5+5]$, $[0+0]$;

$[5+5+5]$, $[0+0+0]$, $[5+5+0]$, $[0+0+5]$;

$[5+5+5+5]$, $[0+0+0+0]$, $[5+5+5+0]$,

$[0+0+0+5]$, $[5+5+0+0]$, 等等。

[说明]

为了便于记忆, $[1 \cdot 9]$ 主题属水, 与 $[1]$ 的属性一样; $[2 \cdot 8]$ 主题属火, 与 $[2]$ 的属性一样; $[3]$ 主题属木, 与 $[3]$ 的属性一样; $[4 \cdot 6]$ 主题属金, 与 $[4]$ 的属性一样; $[5 \cdot 0]$ 主题属土, 与 $[5]$ 的属性一样。在开奖日的中奖号码中出现的主题称为实主题。

在每一期次的彩票中奖号码中, 除了能组成主题的号码组合外, 剩下的单个号码称为副码。

在彩票中奖号码中, 没有出现的、消失的、隐蔽的主题组合号码, 称为虚主题。虚主题的号码组合与实主题的号码组合, 再加上副码, 构成了游戏规则下的彩票号码的完整组合。请注意, 只有副码, 没有“虚副码”。

所以在预测过程中, 预测实主题和预测虚主题都一样重要, 知道了虚主题, 则在组合预测号码时就减少了大量的号码组合。

在彩票中奖号码预测中，对每一期次的中奖号码均进行主题、副码、虚主题的分类处理，对于预测中奖号码具有十分重要的意义。

对中奖号码的主题结构分类处理时，表示虚主题的符号分别为： $\otimes[1 \cdot 9]$ ， $\otimes[2 \cdot 8]$ ， $\otimes[3 \cdot 7]$ ， $\otimes[4 \cdot 6]$ ， $\otimes[5 \cdot 0]$ 。

符号“ \otimes ”表示虚的，隐蔽的，消失的，没有出现的意思。若该期的主题和副码均完全出现，没有虚主题，则记作[齐]。请注意，特别号码可在或不在主题、副码分类处理之列！特别号码根据游戏规则玩法进行灵活处理。

例如某地 36 选 7(即 7/36)彩票中奖号码结构分类处理后为：

中奖号码	主题和副码的结构缩写	虚主题
03 08 10 11 21 29 32 --- 36	$[1+1+9][2+8][0,3]$	$\otimes[4 \cdot 6]$
02 12 13 15 25 31 36 --- 01	$[2+2][5+5][1,3,6]$	[齐]
07 10 13 17 25 28 30 --- 15	$[3+7+7][5+0+0][8]$	$\otimes[1 \cdot 9][4 \cdot 6]$
10 11 17 24 29 32 33 --- 21	$[1+9][3+7][0,2,4]$	[齐]
02 04 08 16 18 32 36 --- 2	$[2+2+8+8][4+6+6]$	$\otimes[1 \cdot 9][3 \cdot 7][5 \cdot 0]$
03 11 20 22 27 33 35 --- 36	$[3+3+7][5+0][1,2]$	$[4 \cdot 6]$
07 08 11 15 20 30 36 --- 33	$[5+0+0][7,8,1,6]$	[齐]
05 10 12 13 15 22 27 --- 02	$[5+5+0][2+2][3+7]$	$\otimes[4 \cdot 6][1 \cdot 9]$
04 16 26 27 32 33 34 --- 09	$[4+4+6+6][3+7][2]$	$\otimes[1 \cdot 9][5 \cdot 0]$

从上述的举例中可知，中奖号码的副码中，包括：

$$\left\{ \begin{matrix} [5] \\ [0] \end{matrix} \right\} \text{之一}, \left\{ \begin{matrix} [1] \\ [9] \end{matrix} \right\} \text{之一}, \left\{ \begin{matrix} [2] \\ [8] \end{matrix} \right\} \text{之一}, \left\{ \begin{matrix} [3] \\ [7] \end{matrix} \right\} \text{之一}, \left\{ \begin{matrix} [4] \\ [6] \end{matrix} \right\} \text{之一}$$

只要其出现其中某一单个号码（但又无两个以上而构不成主题）就当作该类号码已有“代表”出现，并且成为副码，而没有出现的，消失的“另一半”副码不被视作“虚副码”。副码缩写见上例。

在预测过程中，若预测知道某尾数号码作为副码一定会出现

当前期次时，则就包含着两种可能性了。因此，在预测中奖号码时，选择哪一种“尾数”作为副码，还应结合其他内容进行综合预测后再取舍。

上述“[]”内的数字为同尾数缩写数或相同数字，作记录时，不考虑其顺序，只考虑其组成的总内容！

例如某地传统型彩票中奖号码结构分类处理后为：

中奖号码	主题和副码的结构缩写	虚主题
0 4 4 9 8 3—1	[4+4][0,9,8,3]	[齐]
3 9 7 9 7 6—8	[3+7+7][9+9][6]	⊗[2·8][5·0]
8 1 3 5 9 2—0	[2+8][1+9][3,5]	⊗[4·6]
2 1 2 5 7 1—5	[2+2][1+1][5,7]	⊗[4·6]
1 9 4 8 4 9—9	[1+9+9][4+4][8]	⊗[3·7][5·0]
7 7 5 9 7 7—4	[7+7+7+7][5,9]	⊗[2·8][4·6]
3 5 1 0 8 6—1	[5+0][3,1,8,6]	[齐]
1 1 7 9 3 7—0	[1+1+9][7+7+3]	⊗[5·0][4·6][2·8]

[重要说明]

1. 任何游戏规则下的彩票中奖号码均是由金、木、水、火、土五大主题和副码组成。

2. 彩票中奖号码经过结构分类处理后，变得简明，清晰，其总体结构的具体情形一目了然。这也充分发挥“同尾数法则”的作用。

3. 若通过预测方式和预测方法能对中奖号码的主题和副码或虚主题进行准确的预测，则可在总体上能大幅度、大范围地减少号码间组合或出没范围，“价值明显”。

4. 对五大主题进行五行属性的“硬性规定”是为了便于预测，便于其与相对标准参照系或信息载体进行挂钩对应时能反映出相应的变化趋势与特点。

5. 主题的划分和组建,为预测中奖号码的总体结构和位置号码的定量预测开创了一条十分有用的“渠道”!提倡和鼓励充分发挥“主题”的巨大预测作用。

6. 站在“主题”角度来看,副码其实就是主题的“一半”,弄清楚这点,对于预测相应的主题或副码是十分有帮助的。

7. 五大主题出现的次数从长远而言,大致会均匀;但当前期次的主题是否出现,与“概率”无关;同时,主题会因游戏规则的不同可以产生某 1—2 个主题较热或较冷,这由构成主题的号码多与少来决定!若同等情况下,某主题组成的号码比其它多出其 1 个,则就会在客观条件上“制造”出热主题!例如:7/36 与 7/35 或 7/34 或 7/33 或 7/32 或 7/31 或 7/30 或 7/29 等等由于游戏规则的不同从而导致某些主题的冷热配搭是有区别的。

例如:36 选 7 的彩票与 35 选 7 的彩票进行对比可发现,36 选 7 比 35 选 7 客观上多出一个号码 36,站在主题与副码的角度来说:

36 选 7 组成[4·6]主题或[4]、[6]副码共计有 8 个号码:

4 6 14 16 24 26 34 36

35 选 7 中组成[4·6]主题或[4]、[6]副码共计有 7 个号码:

4 6 14 16 24 26 34

所以,36 选 7 比 35 选 7 的开奖号码之主题结构、副码在客观上更容易产生[4·6]主题,以及容易出现副码[4]或[6]。

又例如:36 选 7 的彩票,其号码为:

a: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

b: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

c: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

d: 31, 32, 33, 34, 35, 36。

从上述的数字排列可知,d 行比 a、b、c 行均少了四个号码,若从主题与副码的结构分类而言:五大主题当中,7/36 客观上以

[4·6]主题或副码[4]、[6]则为最热。

由于各类彩票不同游戏规则的关系,开奖号码的“人工排列顺序”的整理也有所不同,为了便于预测推算,主要有如下三种:

(一) 开奖基本号码由小到大,由左至右横向排列,特别号码则分开排列,如国内绝大多数的几十选7、几十选5:

例 1. 广东体彩 7/36: 2 8 10 11 22 29 35 — 26

其主题结构缩写: [2+2+8] [1+9] [5+0]

例 2. 香港六合彩: 13 14 18 30 31 47 — 9

其主题结构缩写: [3+7] [4,8,0,1]

例 3. 海南风采 48 选 5: 1 14 32 38 45 — 9

其主题结构缩写: [2+8] [1,4,5]

(二) 开奖基本号码和特别号码由小至大,由左至右横向排列(特别号码不分开),如国内的(6+1型)几十选7;

例 4. 广东南粤风采 36 选 7 福利彩票:

1 5 7 21 25 29 36 (▲为特别号码)

▲

其主题结构缩写: [1+1+9] [5+5] [6,7]

例 5. 9 13 14 18 21 28 36 (▲为特别号码)

▲

其主题结构缩写: [8+8] [4+6] [9+1]

例 6. 6 7 8 9 19 30 31 (▲为特别号码)

▲

其主题结构缩写: [9+9+1] [6,7,8,0]

(三) 按开奖号码被摇出或吹出的顺序固定位置依次横向排列(即不用通过人工重新排列顺序),如国内的传统型彩票和四花选4,或者各类型的彩票其中奖号码依原来开出顺序“原始”横向排列:

例 7. 传统型彩票:2 1 1 5 8 9 - 0

其主题结构缩写:[2 + 8] [1 + 1 + 9] [5]

例 8. 四花选 4: 10 13 13 1

其主题结构缩写:[3 + 3] [0, 1]

例 9. 广东南粤风采 36 选 7 福利彩票:31 8 7 30 9 6 19

其主题结构缩写:[1 + 9 + 9] [6, 7, 8, 0]

[重要说明]

在预测推算过程中,中奖号码采用何种形式的“排列”,目的只有一个:便于预测推算,便于挖掘和识别各种“相同项”的变化状态之临界点。具体使用的技巧和方法见本书其他有关章节。

学习本书的预测推算技术必须前后内容贯通。

第二节 主题类型

主题类型分为单主题、双主题、三主题、全主题和无主题,共五大类型,即根据开奖号码的主题结构的组成个数来划定主题类型。

(注:特别号码不计算在内,独立考虑)。

单主题:指中奖号码的结构中只有一个主题存在。

双主题:指中奖号码的结构中共有二个主题存在。

三主题:指中奖号码的结构中共有三个主题存在。

全主题:指中奖号码的结构中全部由主题组成,连一个副码都没有。

无主题:指中奖号码的结构中连一个主题都没有,全部由单个副码组成。

所谓主题类型,是指开奖号码内主题组合的个数以及其中能构成主题的号码的个数。知道相应的主题类型就等于在总体上

知道了主题的组成及其个数和副码的个数。

为了便于区分不同游戏规则下的中奖号码的结构中的主题类型,为了便于预测,特制定如下符号以记录:

a.

<1> ——标准单主题,主题仅由两个号码组成。例如[1+1]或[1+9]或[9+9]等。

<1> +1——单主题,主题是由三个号码共同组成,“+1”即在标准单主题的基础上加多一个号码。例如[1+1+1]或[1+1+9]或[9+9+9]等等。

<1> +2——单主题,主题是由四个号码共同组成;“+2”即在标准单主题的基础上加多2个号码,例如[1+1+9+9]或[1+9+9+9]或[1+1+1+9]等等。

<1> +3——单主题,主题是由五个号码共同组成“+3”即在标准单主题的基础上,加多3个号码。例如:[1+1+1+9+9]或[9+9+9+1+1]等。

b.

<2> ——标准双主题,主题由两个标准的<1>单主题联合组成,而每个主题则由两个号码组成,例如:[1+1][2+8];[1+1][2+2];[1+1][8+8]等等。

<2> +1——双主题,主题由一个标准单主题和一个由三个号码构成的主题组成,例如[1+1][2+2+8];[1+1][2+2+2], [1+1][2+8+8]等等。

<2> +1+1——双主题,主题由两个的三个号码形成的主题联合组成,

“+1”即在单主题的基础上加多一个号码,例如:[1+1+1][2+2+8];[1+1+1][2+8+8];[1+1+1][2+2+2]等等,

这种情况在47选6,或49选6中则为全主题。

$\langle 2 \rangle + 2$ ——双主题，主题由一个的四个号码组成的主题和一个标准的单主题联合组成，“+2”即在标准单主题的基础上加多2个号码。例如： $[4+4+6+6][2+8]$ ； $[4+4+4+6][2+2]$ 等等。

$\langle 2 \rangle + 2 + 1$ ——双主题，主题由一个的四个号码组成的主题和一个的三个号码组成主题联合构成；例如： $[3+3+7+7][4+6+6]$ 等等。

c.

$\langle 3 \rangle$ ——标准三主题，主题由分别三个标准的单主题组成，例如： $[1+1][2+8][5+0]$ ； $[1+1][2+8][5+5]$ 等等。

$\langle 3 \rangle + 1$ ——三主题，主题是由2个标准的单主题和一个的三个号码组成的主题联系构成，“+1”即在标准单主题的基础上加多一个号码；例如： $[1+1][2+8][5+5+0]$ ；或 $[1+1][2+2][0+0+5]$ 等等。

这种情况在7/36中则为全主题。（无副码）

d.

凡是中奖号码的结构连一主题都没有者而全都是副码，直接记作：无主题。例如：在几十选5中或在四花选4时可出现无主题；而在几十选6和几十选7中，肯定至少会有一个主题，即不存在无主题。

[重要说明]

1. 主题类型是中奖号码结构中的一项重要内容，若知道了主题类型，则在总体依主题组合预测号码时，就会大幅度、大范围缩减不可能出现的主题间配搭。

2. 上两节所介绍的主题可以在总体上把握中奖号码的结构，但主题到底是由两个码所构成的还是由三个码所构成的，或者是由两个主题联合配搭而成还是由三个主题共同配搭而成呢？或者有多

少个副码呢?这些难题就完全可以由主题类型来解答!

3. 从另一个角度来讲,掌握了准确的“主题+主题类型”就可以在总体上完全支配了相关号码的组合范围。

4. 必须记住,不同游戏规则下的中奖号码的主题类型有所不同,每种主题类型的冷热程度绝对不一样。有的是最热主题类型,即在3—6期中它至少会出现一次;有的是一般主题类型,即除了最热主题类型外,在7—9期中它至少会出现一次;有的是极冷主题类型,在25—30期中才会偶然出现1—2次。

5. 上述所列举的a、b、c、d四大项中共12种的主题类型是全部包括了四花选4、几十选7、几十选6、几十选5彩票的各种主题类型!无论怎样变化,每一期次的中奖号码之主题类型均是上述12种主题类型之一。

第三节 数型与配伍

把每种彩票游戏规则下的号码,相对平均地或尽量平均地划分成五个区间段落,以便在总体趋势上把握中奖号码在五个区间出没变化的走势;所划分的五个区间段落自最小号码开始,依次序分别记作:0, 1, 2, 3, 4。同时,这五个区间段落也依序分别对应土、水、火、木、金的五行属性,把经过上述分类处理后所记作的“数字”称作数型。

把中奖号码由小到大依次进行区间段落的“对号入座”就可以相应得到中奖号码的数型。凡是该号码属于该区间段落范围内的则就拥有该“数型”了。

根据彩票游戏规则的不同,我们把中奖号码由小到大依次横向排列,有多少个号码就有多少个位置,即每个位置号码就拥有一个相应的数型。

所以，数型就是指中奖号码在五大区间段落的数字型号。

因为我们赋予了数型具有土、水、火、木、金的五行属性，所以中奖号码的数型就可以与相对标准体系、信息载体进行五行属性的相生相克关系的对应，通过两者间的对应而产生的变化特点就可能用来预测了。

在社会上，许多彩民把彩票号码区间段落划分为3—4个，或者6—8个，甚至更多，其实这是不太理想的做法，因为它不能充分发挥“数型”的作用，也不能把“数型”与标准参照系、数字信息载体进行五行属性的相生相克关系的对应从而达到更具体的预测要求。为了可以通过不同方式、不同渠道来预测推算某一位置号码的个体数型，把彩票号码相应划分为五大段落(分别对应土、水、火、木、金)是最恰当的。

例如：36选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1， 2， 3， 4， 5， 6， 7

属水的数型，符号为“1”：8， 9， 10， 11， 12， 13， 14

属火的数型，符号为“2”：15， 16， 17， 18， 19， 20， 21

属木的数型，符号为“3”：22， 23， 24， 25， 26， 27， 28

属金的数型，符号为“4”：29， 30， 31， 32， 33， 34， 35， 36

例如：35选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1， 2， 3， 4， 5， 6， 7

属水的数型，符号为“1”：8， 9， 10， 11， 12， 13， 14

属火的数型，符号为“2”：15， 16， 17， 18， 19， 20， 21

属木的数型，符号为“3”：22， 23， 24， 25， 26， 27， 28

属金的数型，符号为“4”：29， 30， 31， 32， 33， 34， 35

例如：34选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1， 2， 3， 4， 5， 6， 7

属水的数型，符号为“1”：8， 9， 10， 11， 12， 13， 14

属火的数型，符号为“2”：15，16，17，18，19，20，21

属木的数型，符号为“3”：22，23，24，25，26，27，28

属金的数型，符号为“4”：29，30，31，32，33，34

例如：33选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6，7

属水的数型，符号为“1”：8，9，10，11，12，13，14

属火的数型，符号为“2”：15，16，17，18，19，20，21

属木的数型，符号为“3”：22，23，24，25，26，27

属金的数型，符号为“4”：28，29，30，31，32，33

例如：32选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6

属水的数型，符号为“1”：7，8，9，10，11，12

属火的数型，符号为“2”：13，14，15，16，17，18

属木的数型，符号为“3”：19，20，21，22，23，24，25

属金的数型，符号为“4”：26，27，28，29，30，31，32

例如：31选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6

属水的数型，符号为“1”：7，8，9，10，11，12

属火的数型，符号为“2”：13，14，15，16，17，18

属木的数型，符号为“3”：19，20，21，22，23，24

属金的数型，符号为“4”：25，26，27，28，29，30，31

例如：30选7的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6

属水的数型，符号为“1”：7，8，9，10，11，12

属火的数型，符号为“2”：13，14，15，16，17，18

属木的数型，符号为“3”：19，20，21，22，23，24

属金的数型，符号为“4”：25，26，27，28，29，30

例如：29 选 7 的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6

属水的数型，符号为“1”：7，8，9，10，11，12

属火的数型，符号为“2”：13，14，15，16，17，18

属木的数型，符号为“3”：19，20，21，22，23，24

属金的数型，符号为“4”：25，26，27，28，29

例如：47 选 6 的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6，7，8，9

属水的数型，符号为“1”：

10，11，12，13，14，15，16，17，18

属火的数型，符号为“2”：

19，20，21，22，23，24，25，26，27

属木的数型，符号为“3”：

28，29，30，31，32，33，34，35，36，37

属金的数型，符号为“4”：

38，39，40，41，42，43，44，45，46，47

例如：49 选 6 的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3，4，5，6，7，8，9，10

属水的数型，符号为“1”：

11，12，13，14，15，16，17，18，19，20

属火的数型，符号为“2”：

21，22，23，24，25，26，27，28，29，30

属木的数型，符号为“3”：

31，32，33，34，35，36，37，38，39，40

属金的数型，符号为“4”：

41，42，43，44，45，46，47，48，49

例如：四花选 4 数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：1，2，3

属水的数型，符号为“1”：4，5，6

属火的数型，符号为“2”：7，8，9

属木的数型，符号为“3”：10，11

属金的数型，符号为“4”：12，13

例如：传统型彩票的数型划分如下：

属土的数型，符号为“0”：0，1

属水的数型，符号为“1”：2，3

属火的数型，符号为“2”：4，5

属木的数型，符号为“3”：6，7

属金的数型，符号为“4”：8，9

数型在中奖号码中，可分为实数型和虚数型两类。

凡是在开奖日的中奖号码中已出现的数型，称为实数型；凡是在开奖日的中奖号码未曾出现的，隐蔽的，消失的数型，称为虚数型；虚数型的记录符号为 \otimes 数型，如 $\otimes 1$ 、 $\otimes 0$ 、 $\otimes 4$ 等等。

在预测过程中，预测实数型和虚数型具有同等的实用价值。若知道了需要预测期次的虚数型，则可在组合预测号码时“刷掉”某一区间段落的号码，从而可以把投注组合范围较大范围地缩减。若中奖号码中的结构包含了五大数型，则记录符号为：[齐]。

至于“配伍”，系指在预测过程中，当中奖号码由小到大横向排列后，就把每个位置号码所对应的数型记录下来，再把各个数型相加起来，所得之和的尾数就是——配伍。为了便于记录和预测，我们所讲的“各个数型相加之和”只取其尾数，不考虑其整数，记录符号为：[数型相加之和尾数]。

同样，配伍也相应拥有“各个数型相加之和”的尾数的五

行属性。数型配伍，就恰似中药配方中的草药配伍：若干种配在一起，它们既互相联系，互相制约，又可以产生“化合”作用。即是说，具有五行属性的数型代表着中奖号码在各个区间段落的局部出没的结构特征，而配伍的尾数及其五行属性则代表着中奖号码在五个区间段落的总体出没的结构特征。

准确地预测各个中奖号码的位置数型，就可以在某个区间段落限制号码的选择；而准确的配伍之预测结果，可在总体过滤“预测数型范围内的不符合配伍总体指标”的号码组合；每一期次的中奖号码的配伍，只不过是其尾数的五行属性之一，即是说五分之四是不符合“指标”的。

所以，数型配伍，互相联系，相互配合。正确地预测数型配伍是中奖号码预测的一项重要内容。

以下就是某地 36 选 7 的中奖号码某阶段的数型配伍：

<u>中奖号码</u>	<u>数型</u>	<u>配伍</u>	<u>虚数型</u>
6 16 18 23 27 29 32—33	0 1 2 3 3 4 4—4	[7]	[齐]
3 11 16 21 22 29 33—19	0 1 2 2 3 4 4—2	[6]	[齐]
8 9 10 11 18 19 24—1	1 1 1 1 2 2 3—0	[1]	⊗0 ⊗4
3 7 8 18 24 25 29—1	0 0 1 2 3 3 4—0	[3]	[齐]
1 2 4 14 15 17 23—34	0 0 0 1 2 2 3—4	[8]	⊗4
4 10 17 22 25 28 34—9	0 1 2 3 3 3 4—1	[6]	[齐]
3 4 12 14 23 30 36—11	0 0 1 1 3 4 4—1	[3]	⊗2
7 20 22 23 28 30 33—17	0 2 3 3 3 4 4—2	[9]	⊗1
10 13 16 20 28 29 34—25	1 1 2 2 3 4 4—3	[7]	⊗0
1 3 7 17 18 21 27—20	0 0 0 2 2 2 3—2	[9]	⊗1⊗4

又例如某地四花选 4 的中奖号码某阶段的数型配伍为：

中奖号码				数型				配伍	虚数型
1	12	7	3	0	4	2	0	[6]	⊗1 ⊗3
5	1	13	4	1	0	4	1	[6]	⊗2 ⊗3
10	4	1	5	3	1	0	1	[5]	⊗2 ⊗4
1	7	13	4	0	2	4	1	[7]	⊗3
9	8	7	8	2	2	2	2	[8]	⊗0 ⊗1 ⊗3 ⊗4
1	8	2	1	0	2	0	0	[2]	⊗1 ⊗3 ⊗4

[重要说明]

中奖号码的实数型、虚数型以及配伍，其实就是中奖号码在五大区间段落的“走势图”，但其比所谓满天星斗的号码“走势图”更能清晰、明显地反映出各个位置号码的局部出没的特征和总体出没的趋势，不仅能便于各个期次间的中奖号码在五大区间段出没的对比，加上我们赋予了它们的五行属性以及“数字代表化”，而且它们更能通过与标准参照系、数字信息载体进行相生相克关系的对应，产生各种相应的变化特征而可以被利用来预测具体的数型或配伍，即更能定性定量化地反映中奖号码的出没范围。

预测中奖号码的实数型、虚数型以及配伍，不用去猜测“走势图”，只需要依相关方法去推算即可。

掌握了中奖号码的数型配伍，则就能较大范围地缩减不可能出现的号码组合。

第四节 位置号码的五行属性和总体五行状态

在彩票中奖号码的开奖过程中，各个中奖号码出现的先后顺序并不能准确地反映出中奖号码的出没规律，鉴于如此，为了便于对比和预测，我们就把中奖号码由小到大、由左到右，依次横向排列，有多少个号码，就相应有多少位置，这就形成了位置号码。所以，位置即号码，号码即位置。

每个位置号码的五行属性就是相应这个位置的号码尾数的五行属性。即是说，如果我们知道了每个位置号码的五行属性，则就相应地知道了该位置的号码了！任何一个位置的五行属性不外乎是五行中之一行。明白了这一点，在预测过程中，我们不是直接去预测位置号码的一行属性，而是直接地通过各种方法去排除该位置号码不可能出现的五行属性，剩下者就是该位置号码可能出现的五行属性。

经过排列后的中奖号码，即每一个位置号码就产生了新的“意义”，可以这么说，有什么样的位置，就有什么样的五行属性，就有什么样的号码。若把每一期次的中奖号码依位置排列好后，按上下关系全部依次排列，就会形成一个位置空间体系，即位置号码体系。在形成的位置空间体系中，每一个位置号码不是孤立的，不是静止的，而是相互广泛联系的，相互发生各种生克关系，从而影响和协调、调整 and 变化各个位置号码相应的五行属性状态！

因此，我们要充分地认识和掌握各个位置号码的五行属性状态，就必须充分利用位置空间体系，包括上下位置；斜线位置（左斜和右斜位置）；各种等距离位置；通过中奖号码位置间的相生相克关系，或者通过位置号码与标准参照系信息载体的生克关系，从而找出两者对应时所产生的各种变化特点而加


以利用，达到预测位置号码的五行属性这个定性定量的要求。

例如：3 14 15 28 32 34 36—2

木克金生土克木生火克金生水克火

4 8 10 12 23 29 35—10

金克木克土生火生木克金生土刑土



[顺注]

1. 在彩票中奖号码预测的应用方面，在五行的相生相克中，同名五行间的相互发生关系时，记作“刑”（实际上也是相克关系的一种）。

2. 位置号码间的相生相克关系必须注明关系的方向，即是谁克谁，谁生谁！这对于预测位置号码的五行属性极有帮助。

所谓总体五行状态，是指中奖号码的各个位置号码的五行属性的总体状态。它代表的是中奖号码整体的五行状态，不讲位置，没有重叠的五行，所以，没有出现在中奖号总体五行中的五行属性称作虚五行。

如果知道了下一期未知的开奖号码的总体结构中，肯定有某五行或没有某五行，那么在组合预测号码范围时就可以据此作出相应的筛选。

每一期次的中奖号码之总体五行状态有的是相同的，有的

是不相同的，通过相关方法处理后，找出期次间的总体五行状态的异同点，可以达到一定效果的预测目的。

不同游戏规则下的彩票中奖号码的总体五行状态之各类型五行组合是固定的，但其冷热程度绝对不一样，有的是最热的五行组合，有的是极冷的五行组合。比如在 36 选 7 的开奖号码中，中奖号码的总体五行状态最热即出现次数最多是这么几种：金木水火土、木水火土(缺金)、金木火土(缺水)、金水火土(缺木)、金木水土(缺火)、金水火木(缺土)。

例如：

.....							总体五行状态	虚五行
3	14	15	28	32	34	36 — 2		
木	金	土	木	火	金	水	金木水火土	[齐]
6	11	12	18	19	27	30 — 34		
水	水	火	木	金	火	土	金木水火土	[齐]
3	8	13	20	25	31	36 — 26		
木	木	木	土	土	水	水	木土水	⊗金木
1	8	11	15	17	20	24 — 10		
水	木	水	土	火	土	金	金木水火土	[齐]
7	12	13	19	25	29	35 — 2		
火	火	木	金	土	金	土	金木火土	⊗水
4	5	11	20	25	29	36 — 7		
金	土	水	土	土	金	水	土金水	⊗木火
1	3	12	14	18	23	36 — 25		
水	木	火	金	木	木	水	金木水火	⊗土
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	?	?

[重要说明]

1. 上述形式的特别号码的五行属性不计入中奖号码的总体

五行状态；其五行状态作位置号码单独处理，而南粤风采(6+1)型 7/36 的特别号码则计入总体五行状态。

2. 预测中奖号码的总体五行状态可以在整体的号码组合中限制预测范围内的号码组合。

3. 从理论上讲，每个位置号码的五行属性若能得到准确的预测，那么只要把每个位置号码的可能出现的五行属性(号码)全部排列组合出来，就可以“全中”！因此，彩票中奖号码预测学的重点预测对象是每个位置号码的五行属性之准确预测及其千方百计缩小每个位置号码可能出现的五行属性范围！

第五节 奇偶性与总和数值

在彩票的游戏规则下的号码，其中号码尾数为[1]、[3]、[5]、[7]、[9]的，则为奇数，俗称单数；其中号码尾数为[0]、[2]、[4]、[6]、[8]的，则为偶数，俗称双数。

彩票中奖号码的奇偶性，包括位置号码的奇偶性和总体结构的奇偶比。每个位置号码不是单数就是双数，而总体结构的奇偶比虽然表现出相当的随意性，但还是表现出一定的配搭比例。

例如在 36 选 7 中，中奖号码的奇偶之比大致符合 $4:3 = \text{奇:偶}$ 或 $3:4 = \text{奇:偶}$ ； $5:2 = \text{奇:偶}$ 或 $2:5 = \text{奇:偶}$ ；而 $1:6 = \text{奇:偶}$ 和 $6:1 = \text{奇:偶}$ ，属于冷的奇偶之比，在正常顺序的中奖号码的总体结构中出现次数很少；而 7 个号码均是单数或是双数的奇偶状态是几乎不可能出现的。

至于每个位置号码的奇偶性，其出现的规律也表现出相当的随意性和反复性或重复性，所以要准确预测位置号码的单双数有时会较困难，有时会较容易，这关键取决每个位置号码奇

偶性变化状态是否于明显临界点的状态，明显者则可以作出判断，不明显者则就不能勉强作出判断。

中奖号码的位置奇偶性和总体结构的奇偶比，在彩票中奖号码预测的具体应用方面，后者的预测作用及价值不是很大。但是，具体问题具体分析，当中奖号码的位置奇偶性表现出变化的明显转折点(即临界点)时，能作出准确预测结论者，就可以发挥其作用。

所谓中奖号码的总和数值，就是把各个中奖号码的数字全部相加起来，所得之和就是号码的总和数值。广东体彩 7/36 特别号码的数值不计入总和数值，而南粤风采 7/36 特别号码的数值计入总和数值。

中奖号码的总和数值，其作用是在总体上大致反映出中奖号码内的大数值号码及小数值号码的组合趋势。

相对而言，中奖号码的数型及配伍之使用及预测价值远远超过总和数值。所以，中奖号码的总和数值的预测功能，其实际价值不大。

例如：

										总体奇偶比
1	11	12	15	21	26	28	—	27		4: 3 = 单: 双
单	单	双	单	单	双	双				
2	7	11	13	19	21	22	—	24		5: 2 = 单: 双
双	单	单	单	单	单	双				
1	8	11	15	21	29	35	—	23		6: 1 = 单: 双
单	双	单	单	单	单	单				
8	16	17	22	27	31	33	—	23		4: 3 = 单: 双
双	双	单	双	单	单	单				

又例如：

								<u>总和数值</u>
1	7	11	17	18	25	—	44	79
4	9	19	23	29	44	—	36	128
1	5	30	34	37	40	—	33	147
12	19	21	26	30	39	—	28	147
15	17	18	22	30	47	—	8	149
7	12	17	27	30	33	—	32	129
3	4	16	25	31	33	—	36	112

第四章 彩票中奖号码的系统

第一节 干支数字信息载体总系统的建立与组成

为了充分发挥每一个已知的中奖号码之全息元的预测作用，为了充分挖掘和识别隐蔽的中奖号码出没变化的规律性，找出预测中奖号码过程中充分的、足够的预测推算“数据”与“证据”，就必须对大量的、已知的中奖号码进行系统性分类处理，科学地建立一个预测推算的数理模型，构筑成一个多维时空的“坐标”体系。

换句话说，彩票中奖号码预测的“数据库”就是系统与演变系统。其中干支数字信息载体总系统就是最重要、最基本的“数据库”。

顾名思义，干支数字信息载体总系统，干支是指开奖日的天干和地支；数字是指开奖日的农历数字和新历的数字以及相应的中奖号码数字；信息载体系统是指这些能承载反映、转译相应中奖号码的信息的载体按某种秩序排列形成一个“信息库”或“数据库”系统，这个系统的功能可以为预测中奖号码的个体和整体提供广阔的时空和可靠的数理基础；这个系统乃是由三方构成：一是用来认识和掌握中奖号码千变万化的出没规律的相对标准体系（即标准参照系）；二是大量的、已知的各期次的中奖号码；三是中奖号码结构分类处理后的各种数字、信息记录符号。

可以说，干支数字信息载体总系统，是彩票中奖号码的预测基础，因而建立的、完善的、齐全的干支数字信息载体总系统是准

确地预测中奖号码的一项不可或缺的关键内容!

干支数字信息载体总系统,是一个总体系统的通称,简称总系统。它包含着各个分系统的各种数据与资料。各个分系统包括:干支系统、农历系统、新历系统、纳音系统、主题系统、数型配伍演变系统、总体五行状态演变系统、五行结构演变系统、五行属性演变系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统、生肖码演变系统、奇偶性演变系统、主题结构演变系统等等。

[重要说明]

(一)干支数字信息载体总系统的建立,是其他各个分系统诞生的基础。即是说,在建立其它各个分系统之前,必须首先建立好干支数字信息载体总系统!

(二)干支数字信息载体总系统的相对标准体系(即标准参照系)最基本内容包含有:

1. 开奖日的干支包括天干地支——查阴阳日历或万年历即知。

2. 开奖日干支的纳音——查阴阳日历或万年历或“六十花甲纳音”表即知。

3. 开奖日的新历日子——查日历即知。

4. 开奖日的农历日子——查日历即知。

5. 开奖日干支所对应的相冲资料包括相冲的干支/纳音/岁数——查阴阳日历或“干支相冲关系一览表”即知。

6. 开奖日的九宫星——查阴阳日历即知或自己推算。

建立干支数字信息载体总系统其实并不复杂,其步骤为:

(一)以每周(7天)固定日开奖一次的中奖号码依(时间序列)上下关系横向排列好,当然,中奖号码的“数据”期次越多越好。

(二)上述开奖日所对应的农历日子及新历日子记录在该期

次的中奖号码之最小号码的旁边。

(三)上述开奖日所对应的天干地支记录在农历日子、新历日子的前面(即开奖日的干支与农历、新历数字连在一起)。

(四)上述开奖日所对应的干支的纳音，记录在该期次的中奖号码之特别号码的旁边。

(五)开奖日的中奖号码之主题副码结构缩写，记录在上述纳音的旁边。

(六)开奖日干支所对应的相冲资料包括相冲干支/纳音/岁数则记录在中奖号码的结构缩写之旁边。

(七)开奖日的九宫星列于相冲资料的旁边。

[说明]

各种资料、数据的排列可依“便于使用”的原则进行处置，不一定死搬硬套。

例如：某地 36 选 7(某阶段)的彩票中奖号码在正常顺序下的干支数字信息载体总系统：

.....

开奖日的干支、 农历和新历日子	开奖日的 中奖号码	开奖日干 支的纳音	中奖号码 结构缩写	中奖号码结 构的虚主题	开奖日干支所对应的相 冲资料 (包括相冲岁数、 开奖日 相冲干支及其纳音)	开奖日 的九宫星
戊寅十六(21) 6	10 22 23 28 33 34-3	土	[4+6][2+8][3+3][0]	⊗[1·9]	(69) [金,水][壬申,甲申]	二黑
乙酉廿三(28) 3	8 11 16 18 20 28-6	水	[8+8+8][3,1,6,0]	[齐]	(62) [土,火][己卯,丁卯]	四绿
壬辰卅十(4) 1	11 12 15 21 26 28-27	水	[1+1+1][2+8][5,6]	⊗[3·7]	(55) [土,火][丙戌,甲戌]	六白
己亥初七(11) 2	7 11 13 19 21 22-24	木	[2+2][1+1+9][3+7]	⊗[4·6][5·0]	(48) [水,土][癸巳,丁巳]	八白
丙午十四(18) 1	8 11 15 21 29 35-23	水	[1+1+1+9][5+5][8]	⊗[4·6][3·7]	(41) [土,火][庚子,戊子]	一白
癸丑廿一(25) 8	16 17 22 27 31 33-23	木	[2+8][7+7+3][6,1]	⊗[5·0]	(34) [水,土][丁未,辛未]	三碧
庚申廿八(2) 10	13 16 20 28 29 34-25	木	[0+0][4+6][3,8,9]	[齐]	(27) [水,土][甲寅,戊寅]	五黄

丁卯初六(9) 5 14 18 21 31 34 35—10 火 [4+4][1+1][5+5][8] ⊗[3·7] (20) [木、金][辛酉、癸酉]三碧
甲戌十三(16) 6 12 19 20 22 24 28—35 火 [4+6][2+8][0,9] ⊗[3·7] (13) [木、金][戊辰、庚辰]一白
辛巳廿十(23) 2 6 16 17 18 29 30—19 金 [6+6][2+2+8][7,9,0][齐] (66) [火、木][乙亥、己亥]八白
戊子廿七(30) 3 14 21 22 23 27 29—32 火 [3+3+7][1+9][2,4] ⊗[5·0] (59) [木、金][壬午、丙午]六白
乙未初五(6) 6 7 17 27 30 33 34—5 金 [7+7+7+3][4+6][0] ⊗[1·9][2·8](52) [火、木][己丑、癸丑]四绿
壬寅十二(13) 7 11 14 15 20 29 31—25 金 [1+1+9][5+0][4,7] ⊗[2·8] (45) [火、木][丙申、庚申]二黑
己酉十九(20) 3 4 6 22 23 33 36—29 土 [3+3+3][4+4+6][2] ⊗[1·9][5·0](38) [金、水][癸卯、乙卯]九紫
丙辰廿六(27) 1 8 13 19 20 22 24—32 土 [1+9][2+8][3,0,4] [齐] (31) [金、水][庚戌、壬戌]七赤
癸亥初三(4) 7 9 11 14 19 21 32—36 水 [9+9+1+1][7,4,2] ⊗[5·0] (24) [土、火][丁巳、乙巳]五黄
庚午初十(11)(1)(2) (3) (4) (5)(6) (7)—(8) 土 (未开奖, 需预测) ? (17) [金、水][甲子、丙子]三碧

——上述的干支数字信息载体总系统的各项内容就一目了然地排列出来,为便于预测和建立其他各个分系统提供极大的方便!

[重要说明]

开奖日的干支所对应的相冲资料包括相冲干支及其纳音均是固定不变的(除相冲岁数不断改变)。每一天的干支,其相冲的干支有两对:第一对为正相冲干支,第二对为次相冲干支。(日历中的)相冲岁数就是第一对正相冲干支当日所对应的“年龄”。日历中的相冲岁数是由 10 开始,至 69 后又循环。为了方便广大彩民的预测,于此列明开奖日“干支相冲关系一览表”:

开奖日的干支及其纳音		相冲的干支及其纳音
辛酉	木	[水、土][乙卯、己卯]
戊辰	木	[水、土][壬戌、丙戌]
乙亥	火	[木、金][己巳、辛巳]
壬午	木	[水、土][丙子、庚子]

己丑	火	[木、金][癸未、乙未]
丙申	火	[木、金][庚寅、壬寅]
癸卯	金	[火、木][丁酉、辛酉]
庚戌	金	[火、木][甲辰、戊辰]
丁巳	土	[金、水][辛亥、癸亥]
甲子	金	[火、木][戊午、壬午]
辛未	土	[金、水][乙丑、丁丑]
戊寅	土	[金、水][壬申、甲申]
乙酉	水	[土、火][己卯、丁卯]
壬辰	水	[土、火][丙戌、甲戌]
己亥	木	[水、土][癸巳、丁巳]
丙午	水	[土、火][庚子、戊子]
癸丑	木	[水、土][丁未、辛未]
庚申	木	[水、土][甲寅、戊寅]
丁卯	火	[木、金][辛酉、癸酉]
甲戌	火	[木、金][戊辰、庚辰]
辛巳	金	[火、木][乙亥、己亥]
戊子	火	[木、金][壬午、丙午]
乙未	金	[火、木][己丑、癸丑]
壬寅	金	[火、木][丙申、庚申]
己酉	土	[金、水][癸卯、乙卯]
丙辰	土	[金、水][庚戌、壬戌]
癸亥	水	[土、火][丁巳、乙巳]
庚午	土	[金、水][甲子、丙子]
丁丑	水	[土、火][辛未、己未]
甲申	水	[土、火][戊寅、丙寅]
辛卯	木	[水、土][乙酉、己酉]

戊戌	木	[水、土][壬辰、丙辰]
乙巳	火	[木、金][己亥、辛亥]
壬子	木	[水、土][丙午、庚午]
己未	火	[木、金][癸丑、乙丑]
丙寅	火	[木、金][庚申、壬申]
癸酉	金	[火、木][丁卯、辛卯]
庚辰	金	[火、木][甲戌、戊戌]
丁亥	土	[金、水][辛巳、癸巳]
甲午	金	[火、木][戊子、壬子]
辛丑	土	[金、水][乙未、丁未]
戊申	土	[金、水][壬寅、甲寅]
乙卯	水	[土、火][己酉、丁酉]
壬戌	水	[土、火][丙辰、甲辰]
己巳	木	[水、土][癸亥、丁亥]
丙子	水	[土、火][庚午、戊午]
癸未	木	[水、土][丁丑、辛丑]
庚寅	木	[水、土][甲申、戊申]
丁酉	火	[木、金][辛卯、癸卯]
甲辰	火	[木、金][戊戌、庚戌]
辛亥	金	[火、木][乙巳、己巳]
戊午	火	[木、金][壬子、丙子]
乙丑	金	[火、木][己未、癸未]
壬申	金	[火、木][丙寅、庚寅]
己卯	土	[金、水][癸酉、乙酉]
丙戌	土	[金、水][庚辰、壬辰]
癸巳	水	[土、火][丁亥、乙亥]
庚子	土	[金、水][甲午、丙午]

丁未	水	[土、火][辛丑、己丑]
甲寅	水	[土、火][戊申、丙申]
(辛酉)		
(戊辰)	(重新循环)	

第二节 干支系统：地支系统、天干系统

所谓干支系统，就是以开奖日的干支作为排列和组合系统的“向导”和依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依次序排列在一起而成。

干支系统包括：地支系统、天干系统两大类。

当然，把开奖日的同名干支所对应的干支数字信息载体系统相关内容全部依次序排列在一起可形成——同名干支系统，但需要超过 25 个月的开奖日才能组成一次的同名干支系统(60 期循环一次)。

地支系统就是以开奖日的同名地支作为组建系统的依据，把所有同名地支开奖日所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。

地支系统，实际上也就是正常顺序中相隔第 11 位的等距离排列系统，因为 12 期为一小周期，地支又开始循环了。正因为这些期次的中奖号码之标准参照系的地支均同名，所以各个位置间的中奖号码与各方面的对比更能反映出某些变化状态的特点从而加以利用。

天干系统就是以开奖日的同名天干作为组建系统的依据，把所有同名天干开奖日所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。实际上也就是正常顺序中相隔第 9 位的等距离排列系统，因为 10 期以后，天干又开始循环了。正因为这些期次的中奖号码之标准参照系统的天干

均是同名，所以各个位置的中奖号码与各方面的对比更能反映出某些变化状态的特点从而加以利用。

地支系统和天干系统，适用于中奖号码的总体结构或局部或位置号码的预测。

例如：某地 36 选 7 某阶段的地支系统：

.....

	结构缩写	虚主题	相冲岁数	相冲资料	九宫星
辛酉廿八(4)	6 16 18 23 27 29 32—33	木	[6+6][2+8][3+7][9] ⊗[5·0]	(25) [水、土][乙卯、己卯]	七赤
乙酉廿三(28)	3 8 11 16 18 20 28—27	水	[8+8+8][3,1,6,0] [齐]	(62) [土、火][己卯、丁卯]	四绿
己酉十九(20)	3 4 6 22 23 33 36—29	土	[3+3+3][4+6+6][2] ⊗[1·9][5·0]	(38) [金、水][癸卯、乙卯]	九紫
癸酉十五(12)	6 9 11 15 23 31 36—25	金	[1+1+9][6+6][3,5] ⊗[2·8]	(14) [火、木][丁卯、辛卯]	三碧
丁酉初十(5)	2 3 10 18 29 22 30—25	火	[2+2+8][0+0][3,9] ⊗[4·6]	(50) [木、金][辛卯、癸卯]	四绿
辛酉初五(27)	10 18 19 22 23 26 32—30	木	[8+2+2][9,3,0,6] [齐]	(27) [水、土][乙卯、己卯]	一白
乙酉卅十(22)	10 15 18 19 21 26 35—2	水	[5+5++0][1+9][6,8] ⊗[3·7]	(63) [土、火][己卯、丁卯]	三碧
己酉廿五(14)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8)	土	(未开奖，需预测) ?	(39) [金、水][癸卯、乙卯]	六白

例如：某地 36 选 7 某阶段的天干系统：

.....

	结构缩写	虚主题	相冲资料
辛酉廿八(4)	6 16 18 23 27 29 32—33	木	[6+6][2+8][3+7][9] ⊗[5·0] (25) [水、土][乙卯、己卯]七赤
辛未初九(14)	2 5 9 21 25 28 32—31	土	[5+5][9+1][2+2+8] ⊗[4·6][3·7] (16) [金、水][乙丑、丁丑]九紫
辛巳廿十(23)	2 6 16 17 18 29 30—19	金	[2+8][6+6][7,9,0] [齐] (66) [火、木][乙亥、己亥]八白
辛卯初二(1)	10 18 25 26 32 33 36—2	木	[6+6][2+8][5+0][3] ⊗[1·9] (56) [水、土][乙酉、己酉]六白
辛丑十三(10)	12 17 18 22 26 30 33—1	土	[2+2+8][3+7][0,6] ⊗[1·9] (46) [金、水][乙未、丁未]四绿
辛亥廿四(19)	1 16 17 18 19 22 27—11	金	[1+9][2+8][7+7][6] ⊗[5·0] (36) [火、木][乙巳、己巳]八白
辛酉初五(27)	10 18 19 22 23 26 32—30	木	[8+2+2][9,3,0,6] [齐] (27) [水、土][乙卯、己卯]一白
辛未十六(8)	4 8 10 12 23 29 36—31	土	[2+8][4+6][9,0,3] [齐] (17) [金、水][乙丑、丁丑]七赤
辛巳廿七(17)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8)	金	(未开奖，需预测)? (67) [火、木][乙亥、己亥]五黄

[重要说明]

为了充分发挥系统的预测作用，每项内容在操作时除了要观察和分析本系统的独特变化和特点外，还应同时观察、分析和对比本系统的其他同类系统变化趋势之共性！

第三节 农历系统和同尾数农历系统

所谓农历系统，就是以开奖日的农历日子作为排列和组合系统的“向导”和依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成的。

同尾数农历系统，就是以开奖日的同尾数农历日子作为排列和组合系统的依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容，全部依先后次序排列在一起而形成的。

同尾数农历系统，此时的农历尾数，已不再仅是记录开奖的时间，而是成为该开奖日的中奖号码之标准参照系的组成元素，也可视作为该开奖日的中奖号码的信息载体；以这些具有某种相同特性的同尾数农历作为排列和组合系统的依据，它们所对应的干支数字信息载体总系统相关内容之间的对比更能反映出某些变化状态的特点从而加以利用。同尾数农历系统适用于中奖号码的总体结构或局部或位置号码的预测。

例如：某地某阶段 36 选 7 的同尾数农历系统：

.....

辛酉廿八(4) 6 16 18 23 27 29 32—33木 [6+6][2+8][3+7][9] ⊗[5·0] (25) [水、土][乙卯、己卯]七赤
 庚戌十八(22) 7 20 22 23 28 30 33—17金 [0+0][3+3+7][2+8] ⊗[1·9][4·6](37) [火、木][甲辰、戊辰]三碧
 庚申廿八(2) 10 13 16 20 28 29 34—25木 [0+0][4+6][3,8,9] [齐] (27) [水、土][甲寅、戊寅]五黄
 丙寅初八(5) 15 18 20 25 27 34 36—7 火 [5+5+0][4+6][7,8] ⊗[1·9][4·6](21) [木、金][庚申、壬申]五黄
 乙丑初八(2) 5 13 23 27 28 30 35—19金 [5+5+0][3+3+7][8] [齐] (22) [火、木][己未、癸未]三碧
 甲寅廿八(20) 14 22 24 27 29 34 35—8 水 [4+4+6][2,7,9,5] [齐] (34) [土、火][戊申、丙申]八白
 癸丑廿八(19) 3 6 8 20 27 28 35—33木 [8+8][5+0][3+7][6] ⊗[1·9] (35) [水、土][丁未、辛未]四绿
 壬寅十八(7)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8) 金 (未开奖, 需预测) ? (46) [火、木][丙申、庚申]八白

[重要说明]

为了充分发挥系统的预测作用, 每项预测内容在具体操作时, 除了要观察和分析本系统的独特变化趋势和特点外, 还应同时观察、分析和对比本系统的其他同类系统变化趋势之共性!

比如上述同尾数农历[八]系统在预测各项内容时, 还应同时观察、分析和对比其它同尾数农历[一]或[二]、[三]、[四]、[五]、[六]、[七]、[九]、[十]系统在相应该项内容上的变化趋势之共性!

第四节 新历系统和同尾数新历系统

所谓新历系统, 就是以开奖日的农历日子作为排列和组合系统的“向导”和依据, 把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容依先后次序排列在一起而形成。

同尾数新历系统就是以开奖日的同尾数新历日子作为组建系统的依据，把所有同尾数新历日子开奖日所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。

同尾数新历系统，此时的新历尾数，已不再仅是记录开奖的时间，而是成为该开奖日的中奖号码之标准参照系的组成元素，也可视作为该开奖日的中奖号码的信息载体；以这些具有某种相同特性的同尾数新历作为排列和组合系统的依据，它们所对应的干支数字信息载体总系统相关内容之间的对比更能反映出某些变化状态的特点从而加以利用。

本系统适用于中奖号码的总体结构或局部或位置号码的预测。

例如：某地某阶段 36 选 7 的同尾数新历系统：

.....

辛酉廿八(4) 6 16 18 23 27 29 32—33 木 [6+6][2+8][3+7][9] ⊗ [5·0] (25) [水、土][乙卯、己卯]七赤
 辛未初九(14) 2 5 9 21 25 28 32—31 土 [5+5][1+9][2+2+8] ⊗ [4·6][3·7] (16) [金、水][乙丑、丁丑]九紫
 壬辰卅十(4) 1 11 12 15 21 26 28—27 水 [1+1+1][2+8][5,6] ⊗ [3·7] (55) [土、火][丙戌、甲戌]六白
 癸亥初三(4) 7 9 11 14 19 21 32—36 水 [9+9+1+1][4,7,2] ⊗ [5·0] (24) [土、火][丁巳、乙巳]五黄
 乙卯廿七(24) 11 14 17 21 22 31 33—35 水 [1+1+1][3+7][4,2] ⊗ [5·0] (32) [土、火][己酉、丁酉]九紫
 丙子十九(14) 1 3 14 19 24 28 30—20 水 [1+9][4+4][3,8,0] [齐] (11) [土、火][庚午、戊午]七赤
 戊子初四(24) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 火(未开奖，需预测)? (60) [木、金][壬午、丙午]三碧

[重要说明]

比如上述同尾数新历[4]系统在预测各项内容时，还应同时观察、分析和对比其他同尾数新历[1]、[2]、[3]、[5]、[6]、[7]、[8]、[9]、[0]系统在相应该项内容上的变化趋势之共性。

第五节 纳音系统和同名纳音系统

所谓纳音系统，就是以开奖日的干支纳音作为排列和组合系统的“向导”和依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依次序排列在一起而形成。

同名纳音系统就是以开奖日的同名干支纳音作为组建系统的依据，把所有相同纳音开奖日所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。

同名纳音系统，此时的(干支)纳音，不仅成为该开奖日的中奖号码的标准参照系组成元素，而且也是开奖日的中奖号码的信息载体；以这些具有相同特性的同名纳音作为排列和组合系统的依据，它们所对应的干支数字信息载体总系统相关内容之间的对比，更能反映出某些变化状态的特点从而加以利用。

例如：某地某阶段 36 选 7 的同名纳音系统(水系统)

.....

乙酉廿三(28) 3 8 11 16 18 20 28—6 水 [8+8+8][3,1,6,0] [齐] (62) [土、火][己卯、丁卯]四绿
壬辰卅十(4) 1 11 12 15 21 26 28—27 水 [1+1+1][2+8][5,6] ⊗[3·7] (55) [土、火][丙戌、甲戌]六白
丙午十四(18) 1 8 11 15 21 29 35—23 水 [1+1+1+9][5+5][8] ⊗[4·6][3·7](41) [土、火][庚子、戊子]一白
癸亥初三(4) 7 9 11 14 19 21 32—36 水 [9+9+1+1][7,4,2] ⊗[5·0] (10) [土、火][丁巳、乙巳]五黄
丁丑十七(18) 3 7 9 12 23 24 36—25 水 [3+3+7][4+6][2,9] ⊗[5·0] (24) [土、火][辛未、己未]一白
甲申廿四(25) 3 5 12 14 24 28 31—8 水 [4+4][2+8][5,3,1] [齐] (63) [土、火][戊寅、丙寅]八白
乙卯廿七(24) 11 14 17 21 22 31 33—35 水 [1+1+1][3+7][4,2] ⊗[5·0] (32) [土、火][己酉、丁酉]九紫
壬戌初五(31) 3 14 25 28 30 32 34—26 水 [2+8][5+0][4+4][3] ⊗[1·9] (25) [土、火][丙辰、甲辰]七赤
丙子十九(14) 1 3 14 19 24 28 30—20 水 [1+9][4+4][3,8,0] [齐] (11) [土、火][庚午、戊午]七赤
癸巳初七(30) 1 4 6 11 13 14 27—19 水 [1+1][4+4+6][3+7] ⊗[5·0][2·8](54) [土、火][丁亥、乙亥]二黑
丁未廿一(13) 6 16 22 23 31 33 34—26 水 [6+6+4][3+3][1,2] ⊗[5·0] (41) [土、火][辛丑、己丑]六白
甲寅廿八(20) 14 22 24 27 29 34 35—8 水 [4+4+4][2,7,9,5] [齐] (34) [土、火][戊申、丙申]八白
乙酉三十(22) 1 15 18 19 21 26 35—2 水 [5+5][1+1+9][8,6] ⊗[3·7] (63) [土、火][己卯、丁卯]三碧
壬辰初七(29) 7 8 9 16 18 26 34—28 水 [8+8][6+6+4][7,9] ⊗[5·0] (56) [土、火][丙戌、甲戌]一白
丙午廿一(12)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 水 (未开奖,需预测)? (42) [土、火][庚子、戊子]六白

[重要说明]

1. 比如上述同名纳音[水]系统在预测各项内容时，除了观察和分析其自身的变化趋势与特点外，还应同时分析和对比其它同名纳音系统(土、金、木、火)在相应项目内容的变化趋势之共性！

2. 同名纳音系统适用于中奖号码的总体结构或局部或位置号码的预测。

第六节 主题系统(农历主题系统、新历主题系统) 和主题结构演变系统

所谓主题系统：就是以开奖日的农历尾数或新历尾数中能组成主题者作为排列和组合系统的“向导”和依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。主题者不外乎五大主题：

[1·9]、[2·8]、[3·7]、[4·6]、[5·0]。

农历主题系统：就是以开奖日的农历尾数中能组成主题者作为组建系统的依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。

新历主题系统：就是以开奖日的新历尾数中能组成主题者作为组建系统的依据，把其所对应的干支数字信息载体总系统相关内容全部依先后次序排列在一起而形成。

无论是农历主题系统还是新历主题系统，此时的农历尾数或新历尾数，已不再仅是记录开奖的时间，而是成为开奖日的中奖号码的标准参照系的组成元素，也可看成是该开奖日的中

奖号码的信息载体；以这些能组成主题的同尾数农历或新历作为排列和组合系统的依据，它们所对应的干支数字信息载体总系统相关内容之间的对比更能反映出某些变化状态的特点，从而加以利用。这两个系统适用于中奖号码的总体结构或局部或位置号码的预测。

例如：某地某阶段 36 选 7 的农历[2·8]主题系统：

.....

	主题结构缩写	虚主题	相冲资料	九宫星
辛酉廿八(4)	6 16 18 23 27 29 32—33	木 [6+6][2+8][3+7][9] ⊗ [5·0]	(25) [水、土][乙卯、己卯]	七赤
乙亥十二(18)	8 9 10 11 18 19 24—1	火 [1+9+9][8+8][0,4] ⊗ [3·7]	(11) [木、金][己巳、辛巳]	二黑
庚戌十八(22)	7 20 22 23 28 30 33—17	金 [7+3+3][2+8][0+0] ⊗ [4·6][1·9] (37)	[火、木][甲辰、戊辰]	三碧
甲子初二(1)	1 5 6 19 20 23 35—11	金 [5+5+0][1+9][6,3] ⊗ [2·8]	(23) [火、木][戊午、壬午]	七赤
庚申廿八(2)	10 13 16 20 28 29 34—25	木 [6+4][0+0][3,8,9] [齐]	(27) [水、土][甲寅、戊寅]	五黄
壬寅十二(13)	7 11 14 15 20 29 31—25	金 [1+1+9][5+0][4,7] ⊗ [2·8]	(45) [火、木][丙申、庚申]	二黑
辛卯初二(1)	10 18 25 26 32 33 36—2	木 [5+0][2+8][6+6][3] ⊗ [1·9]	(56) [水、土][乙酉、己酉]	六白
丙寅初八(5)	15 18 20 25 27 34 36—7	火 [5+5+0][4+6][7,8] ⊗ [1·9]	(21) [木、金][庚申、壬申]	五黄
庚辰廿二(19)	6 17 18 20 26 29 31—25	金 [1+9][6+6][7,8,0] [齐]	(67) [火、木][甲戌、戊戌]	一白
己巳十二(7)	3 4 5 6 7 10 23—33	木 [3+3+7][4+6][5+0] ⊗ [1·9][2·8] (18)	[水、土][癸亥、丁亥]	五黄
乙丑初八(2)	5 13 23 27 28 30 35—19	金 [5+5+0][3+3+7][8] ⊗ [1·9][4·6] (22)	[火、木][己未、癸未]	三碧
己卯廿二(16)	6 14 17 24 25 30 33—10	土 [3+7][5+0][4+4+6] ⊗ [1·9][2·8] (68)	[金、水][癸酉、乙酉]	七赤
甲寅廿八(20)	14 22 24 27 29 34 35—8	水 [4+4+4][2,7,9,5] ⊗ [4·6] (34)	[土、火][戊申、丙申]	八白
戊辰十二(6)	1 2 5 7 17 19 23—30	木 [7+7+3][1+9][2,5] [齐]	(20) [水、土][壬戌、丙戌]	三碧
丁巳初二(24)	3 8 13 20 25 31 36—26	土 [3+3][5+0][8,1,6] ⊗ [1·9] (31)	[金、水][辛亥、癸亥]	八白
癸丑廿八(19)	3 6 8 20 27 28 35—33	木 [8+8][5+0][3+7][6]	(35) [水、土][丁未、辛未]	四绿
壬寅十八(7)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8)	金 (未开奖, 需预测)?	(46) [火、木][丙申、庚申]	八白

例如：某地某阶段 36 选 7 的新历[4·6]主题系统：

(注：有关相冲资料部分略去，请谅！)

.....

主题结构缩写

辛酉 _{廿八(4)}	6	16	18	22	27	29	33	—	33	木	[6+6][2+8][3+7][9]
辛未 _{初九(14)}	2	5	9	21	25	28	32	—	31	土	[5+5][9+1][2+2+8]
壬辰 _{三十(4)}	1	11	12	15	21	26	28	—	27	水	[1+1+1][2+8][5,6]
甲戌 _{十三(16)}	6	12	19	20	22	24	28	—	35	火	[2+2+8][4+6][0,9]
乙未 _{初五(6)}	6	7	17	27	30	33	34	—	5	金	[3+7+7+7][4+6][0]
癸亥 _{初三(4)}	7	9	11	14	19	21	32	—	36	水	[9+9+1+1][4,7,2]
丁亥 _{廿九(26)}	1	6	7	11	17	18	35	—	33	土	[7+7][1+1][6,8,5]
乙卯 _{廿七(24)}	11	14	17	21	22	31	33	—	35	水	[1+1+1][3+7][4,2]
丙子 _{十九(14)}	1	3	14	19	24	28	30	—	20	水	[1+9][4+4][3,8,0]
戊午 _{初一(26)}	1	10	15	21	24	30	35	—	12	火	[5+5+0+0][1+1][4]
己卯 _{廿二(16)}	6	14	17	24	25	30	33	—	10	土	[3+7][5+0][4+4+6]
庚子 _{十四(6)}	5	7	10	12	25	32	36	—	29	土	[5+5+0][2+2][7,6]
戊辰 _{十二(6)}	1	2	5	7	17	19	23	—	30	木	[7+7+3][1+9][2,5]
丁巳 _{初二(24)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金	(未开奖，需预测)

[重要说明]

比如上述农历[2·8]主题系统和新历[4·6]主题系统在预测各项内容时，除了观察和分析其自身的变化趋势与特点外，还应同时分析和对比其他农历主题系统和新历主题系统在相应该项内容上的变化趋势之共性！

至于主题结构演变系统，是指在正常顺序的干支数字信息载体总系统中，把各期次的中奖号码依先后顺序上下关系按五大主题结构逐一分类后而形成。

主题结构演变系统，其功能主要是反映出正常顺序下各期的具体中奖号码在分类主题结构中的变化趋势与特点。这个系统不是结构缩写，而是具体每一个中奖号码依五大主题组合分类而形成的。

[注：特别号码独立处理，不在组合分类之列]。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的主题结构演变系统：

.....

	<u>[4·6]主题</u>	<u>[5·0]主题</u>	<u>[1·9]主题</u>	<u>[2·8]主题</u>	<u>[3·7]主题</u>	<u>纳音</u>
戊辰初五(11) 16	⊗		11+21+29	22	3+33	木
乙亥十二(18) 24	10		9+19+11	8+18	⊗	火
壬午十九(25) 24	25		29	8+18	3+7	木
己丑廿六(1) 4+14	15		1	2	17+23	火
丙申初四(8) 4+34	10+25	⊗		22+28	1+	火
癸卯十一(15) 4+14+36	30	⊗		12	3+23	金
庚戌十八(22) ⊗	20+30	⊗		22+28	7+23+33	金
丁巳廿五(29) 14	25	9+29		22+28	27	土
甲子初二(7) 6	5+35+20	1+19	⊗		23	金
辛未初九(14) ⊗	5+25	9+21	2+32+28	⊗		土
戊寅十六(21) 6+34	10	⊗	22+28	23+33		土
乙酉廿三(28) 16	20	11	8+18+28	3		水
壬辰三十(4) 26	15	1+11+21	12+28	⊗		水
己亥初七(11) ⊗	⊗	11+21+19	2+22	7+13		木
丙午十四(18) 〈1〉	(2)	〈3〉	〈4〉	〈5〉		水

(未开奖，需预测)

[重要说明]

1. 主题结构演变系统不仅适用于中奖号码的总结构之预测，更是具体中奖号码预测时的取舍依据之一。

2. 主题配搭是彩票中奖号码中的一种特殊的、科学的组合，以它作为预测的“向导”和衡量中奖号码的各种变化状态的“指标”，往往能达到事半功倍的效果！

3. 在主题系统的具体应用过程中，既要注重本身系统变化趋势的个性、特殊性，又要注重同类的其他系统在相应的内容上的变化趋势之共性、普遍性；个性与共性的有机结合，更能充分地、准确地识别各种变化的临界点从而达到预测目的。

4. 彩票中奖号码预测中的符号：“⊗”代表无、不成立、不存在、不对称、不相等、消失的、隐蔽的意思。

第七节 农历——号码主题对应演变系统、 新历——号码主题对应演变系统以及 上期号码——号码主题对应演变系统

所谓农历——号码主题对应演变系统，就是指以开奖日的农历尾数作为标准参照系，与当期的中奖号码进行主题配搭对应；在对应的过程中，凡是中奖号码的尾数与农历尾数是相同的，记作：正；尾数不同但能构成主题者则记作：反；尾数不同而又不能构成主题者则记作：⊗；把这过程的记录符号依先后顺序上下关系全部排列在一起就形成了农历——号码主题对应系统。在对应的过程中，有多少个中奖号码能与开奖日的农历尾数可以组成主题者，则就相应记录有多少个“正”或“反”。

同理，所谓新历——号码主题对应演变系统，就是指以开

奖日的新历尾数作为标准参照系，与当期的中奖号码进行主题配搭对应；在对应的过程中，凡是中奖号码的尾数与新历尾数是相同的，记作：正；尾数不同但能构成主题者则记作：反；尾数不同而又不能构成主题者则记作：⊗；把这过程的记录符号依先后顺序上下关系全部排列在一起就形成了新历——号码主题对应系统。在对应的过程中，有多少个中奖号码能与开奖日的新历尾数可以组成主题者，则就相应记录有多少个“正”或“反”。

农历或新历——号码主题对应演变系统，其功能就是用已知的农历或新历尾数通过与中奖号码进行主题配搭对应，反映出正常顺序下中奖号码在这种主题结构中的变化趋势与特点，通过观察、对比、分析就可以加以利用。

即利用已知的农历(新历)尾数去预测未知的中奖号码之总体在这种主题结构状况下的变化状态。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的农历——号码主题对应演变系统和新历——号码主题对应演变系统：

.....

													农历——号码	新历——号码
													主题对应	主题对应
辛酉	廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32	—	33	木	正+反	反+反	
戊辰	初五(11)	3	11	16	21	22	29	33	—	19	木	⊗	正+正+反	
乙亥	十二(18)	8	9	10	11	18	19	24	—	1	火	反+反	正+正	
壬午	十九(25)	3	7	8	18	24	25	29	—	1	木	正	正	
己丑	廿六(1)	1	2	4	14	25	17	23	—	34	火	反+反	正	
丙申	初四(8)	4	10	17	22	25	28	34	—	9	火	正+正	正+反	

癸卯十一(15)	3	4	12	14	23	30	36	—11	金	⊗	反
庚戌十八(22)	7	20	22	23	28	30	33	—17	金	正+反	正+反
丁巳廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29	—26	土	正	正+正
甲子初二(7)	1	5	6	19	20	23	35	—11	金	⊗	反
辛未初九(14)	2	5	9	21	25	28	32	—31	土	正+反	⊗
戊寅十六(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	土	?(未开奖,需预测)	

[重要说明]

农历——号码主题对应演变系统和新历——号码主题对应演变系统，适用于中奖号码的总体结构的预测。

至于上期号码——号码主题对应演变系统，就是指在正常顺序中，以上一期的每一个位置号码作为下一期中奖号码的标准参照物，以上下的同一位置的号码与号码间进行主题搭配对应；在对应的过程中，凡是上一期的中奖号码尾数与下一期的中奖号码尾数是相同的，记作：正；尾数不同但能构成主题者则记作：反；尾数不同而又不能构成主题者则记作：⊗；把这过程的记录符号依先后顺序上下关系全部排列在一起，就形成了上期号码——号码主题对应演变系统。在对应的过程中，下一期的中奖号码有多少个能与上一期的位置号码可以组成主题者，则就相应记录有多少个“正”或“反”。

上期号码——号码主题对应演变系统，其功能就是用已知的上一期位置号码通过与下一期总体中奖号码进行主题配搭对应，反映出正常顺序下中奖号码在相应主题结构中的变化趋势与特点，通过观察、对比、分析之就可以加以利用。即利用已知的上一期位置号码通过与下一期总体中奖号奖进行主题配搭对应，反映出正常顺序下中奖号码之总体在相应主题结构状况下的变化状态。

这个系统适用于中奖号码的总体结构之预测。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的上期号码——号码主题对应演变系统：

.....

上一期各个位置号码——下一期号码主题对应

己未初-(29) 1 5 17 20 22 31 36-19 火	<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>
丙寅初八(5) 15 18 20 25 27 34 36-7 火	⊗	正+正+反	正	正+反+反	反	⊗	正+反	⊗
癸酉十五(12) 6 9 11 15 23 31 36-25 金	正	⊗	反	正	反	反+反	正+正	反
庚辰廿二(19) 6 17 18 20 26 29 31-25 金	正+正	正+反	正+反	反	反	正+反	正+正	反
丁亥廿九(26) 1 6 7 11 17 18 35-33 土	正	正+正	正	反	正	反+反	⊗	正
甲午初六(3) 3 6 7 17 23 24 36-22 金	⊗	正+正+反	正+正+反+反	⊗	正+正+反+反	⊗	正	正+正+反+反
辛丑十三(10) 12 17 18 22 26 30 33-1 土	正+反	正	正+反	正+反	正+反	反	正+反	正+正+反
戊申廿十(17) 1 3 17 18 28 30 31-36 土	反+反	正+反	正+正	反+反	⊗	正	正+正+正	正+正
乙卯廿七(24) 11 14 17 21 22 31 33-35 水	正+正+正	正+反	正+反	反	反	⊗	正	反
壬戌初五(31) 3 14 25 28 30 32 34-26 水	⊗	正+正	反	反	⊗	⊗	正+反	正+反
己巳十二(7) 3 4 5 6 7 10 23-33 木	正+正+反	正+反	正+反	⊗	正+反	⊗	正	正+反
丙子十九(14) 1 3 14 19 24 28 30-20 水	正	正+正	反	反+反	反	正	反+反	正
癸未廿六(21) 5 8 13 16 17 25 33-18 木	⊗	正+正+反	反	⊗	反	正	反	反+反
庚寅初三(28)(1) (2) (3) (4) (5)(6) (7)-(8) 木	?	?	?	?	?	?	?	?

[重要说明]

上述的系统或者演变系统，其各种变化趋势与特点能否用

得上，则根据预测内容以及该种变化状态是否处于明显的临界点。只有变化状态处于明显的临界点才能采用。即是说，建立众多的各个系统就是要尽量地“制造”和“暴露”出各种变化状态的明显临界点以供预测使用！

第八节 天干——号码主题对应演变系统、 地支——号码对应演变系统和 纳音——号码主题对应演变系统

我们已经知道，在彩票中奖号码预测中， $[1 \cdot 9]$ 、 $[2 \cdot 8]$ 、 $[3 \cdot 7]$ 、 $[4 \cdot 6]$ 和 $[5 \cdot 0]$ 这五大主题的相应之五行属性分别是：

$[1 \cdot 9] = \text{水}$ （即与 $[1]$ 的五行属性一致）

$[2 \cdot 8] = \text{火}$ （即与 $[2]$ 的五行属性一致）

$[3 \cdot 7] = \text{木}$ （即与 $[3]$ 的五行属性一致）

$[4 \cdot 6] = \text{金}$ （即与 $[4]$ 的五行属性一致）

$[5 \cdot 0] = \text{土}$ （即与 $[5]$ 的五行属性一致）

所以，把开奖日的天干、地支及其纳音相应的五行属性通过主题的五行属性分别与主题进行挂钩和对应，它们之间的对应关系如下：

$[1 \cdot 9] = \text{水} = \text{天干}[\text{壬}, \text{癸}] = \text{地支}[\text{子}, \text{亥}]$

$[2 \cdot 8] = \text{火} = \text{天干}[\text{丙}, \text{丁}] = \text{地支}[\text{午}, \text{巳}]$

$[3 \cdot 7] = \text{木} = \text{天干}[\text{甲}, \text{乙}] = \text{地支}[\text{寅}, \text{卯}]$

$[4 \cdot 6] = \text{金} = \text{天干}[\text{庚}, \text{辛}] = \text{地支}[\text{申}, \text{酉}]$

$[5 \cdot 0] = \text{土} = \text{天干}[\text{戊}, \text{己}] = \text{地支}[\text{辰}, \text{戌}, \text{丑}, \text{未}]$

所谓天干——号码主题对应演变系统，就是把开奖日的天干作为标准参照系，与当期的中奖号码之主题总体结构进行对应；在对应的过程中，凡是中奖号码之主题总体结构与天干能产生主题对应者，（注：必须是主题，副码不算），则记作：*，未能发生主题对应者，则记作：⊗。

把这过程的记录符号依先后顺序上下关系全部排列在一起就形成了天干——号码主题对应演变系统。

同理，这种方式同样可以形成地支——号码主题对应演变系统和纳音——号码主题对应演变系统。

所谓地支——号码主题对应，就是把开奖日的地支作为标准参照系，与当期的中奖号码之主题总体结构进行对应。

所谓纳音——号码主题对应，就是把开奖日的纳音作为标准参照系，与当期的中奖号码之主题总体结构进行对应。

上述的三个演变系统，其功能就是用已知的天干、地支和纳音通过与中奖号码进行主题总体结构的对应，反映出当期的中奖号码的结构中有或没有相应的主题。即是说，利用已知的开奖日之天干、地支和纳音去预测未知的中奖号码的总体结构是否存在某种主题结构！

天干——号码主题对应演变系统，地支——号码主题对应演变系统和纳音——号码主题对应演变系统适用于中奖号码的总体结构（包括实主题、虚主题）的预测。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的天干或地支——号码主题对应演变系统和纳音——号码主题对应演变系统：

.....

										天干——号码 主题对应	地支——号码 主题对应	纳音——号码 主题对应
辛酉	廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32	—33	木 *	*	*
戊辰	初五(11)	3	11	16	21	22	29	33	—19	木 ⊗	⊗	*
乙亥	十二(18)	8	9	10	11	18	19	24	—1	火 ⊗	*	*
壬午	十九(25)	3	7	8	18	24	25	29	—1	木 ⊗	*	*
己丑	廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23	—34	火 ⊗	⊗	⊗
丙申	初四(8)	4	10	17	22	25	28	34	—9	火 *	*	*
癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36	—11	金 ⊗	*	*
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33	—17	金 ⊗	*	⊗
丁巳	廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29	—26	土 *	*	⊗
甲子	初二(7)	1	5	6	19	20	23	35	—11	金 ⊗	*	⊗
辛未	初九(14)	2	5	9	21	25	28	32	—31	土 ⊗	*	*
戊寅	十六(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	土 ?	(未开奖,需预测)	

第九节 数型演变系统和配伍演变系统

所谓数型演变系统，就是把正常顺序下各期次的各个位置号码所对应的数型记录下来，依先后顺序上下关系全部排列起来，形成数型演变系统。当然，各期次相应的虚数型也随着数型演变系统记录附上。

所谓配伍演变系统，就是把正常顺序的各期次之数型转化成相应的配伍后，依先后顺序上下关系全部排列起来，形成配伍演变系统。

每一期次的总体配伍，其结果可以在整体上去把握和控制预测范围内的各个位置号码组合的总状况，但其缺陷是，对局部的限制与约束能力相对而言较弱，所以，为了解决这个问题，又把配伍分为前段配伍和后段配伍。

在几十选7的中奖号码中，前面四个位置数型相加之和的尾数就是前段配伍，后面三个位置数型相加之和的尾数就是后段配伍。

在几十选6的中奖号码中，前面三个位置数型相加之和的尾数就是前段配伍，后面三个位置数型相加之和的尾数就是后段配伍。

在几十选5的中奖号码中，前面二个位置数型相加之和的尾数就是前段配伍，后面二个位置数型相加之和的尾数就是后段配伍。

其实，无论是数型演变系统还是配伍演变系统，他们均是干支数字信息载体总系统的一部分，也属于每一期次的“数据”、“信息”，所以每一期次相应的数型和配伍均可以在干支系统、主题系统、纳音系统、农历系统、新历系统中作为一项内容附上，目的是充分发挥系统的作用，充分发挥数型和配伍的预测功能。

数型或配伍演变系统，均是通过已知的，大量的数型或配伍来预测未知的数型或配伍，以期望能在五大区间段落内掌握各个位置号码出没的局部范围。

这两个演变系统均可适用于中奖号码的总体结构之预测。

例如：某地36选7某阶段正常顺序下中奖号码的数型、配伍演变系统：

.....

第十节 主题类型演变系统

主题类型演变系统同样是属于每一期次中“数据”、“信息”的一部分，属于干支数字信息载体总系统的一部分。所以每一期次相应的主题类型均可以在干支系统、纳音系统、农历系统、新历系统中作为一项内容附上，目的是充分发挥系统的

作用，充分发挥主题类型的预测作用。

主题类型演变系统均是通过大量的、已知的主题类型来预测未知的主题类型，以期望能在中奖号码的总体结构中大范围地缩减不可能出现的主题间搭配；在总体上把握需要预测的期次到底有或没有副码，有多少个副码；有多少个主题组合，是单主题还是双主题，或是三主题、全主题等。

本演变系统适用于中奖号码的总体结构的预测。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的主题类型演变系统：

• • • • •

		结构缩写		虚主题		主题类型	
辛未	初九(14)	2	5 9 21 25 28 32—31	土	[5+5][9+1][2+2+8] ⊗ [4·6][3·7]	〈3〉+1	
戊寅	十六(21)	6	10 22 23 28 33 34—3	土	[3+3][2+8][4+6][0] ⊗ [1·9]	〈3〉	
乙酉	廿三(28)	3	8 11 16 18 20 28—6	水	[8+8+8][3,1,6,0]	[齐] 〈1〉+1	
壬辰	三十(4)	1	11 12 15 21 26 28—27	水	[1+1+1][2+8][5,6] ⊗ [3·7]	〈2〉+1	
己亥	初七(11)	2	7 11 13 19 21 22—24	木	[1+1+9][2+2][3+7] ⊗ [4·6][5·0]	〈3〉+1	
丙午	十四(18)	1	8 11 15 21 29 35—23	木	[1+1+1+9][5+5][8] ⊗ [4·6][3·7]	〈2〉+2	
癸丑	廿一(25)	8	16 17 22 27 31 33—23	水	[7+7+3][2+8][6,1] ⊗ [5·0]	〈2〉+1	
庚申	廿八(2)	10	13 16 20 28 29 34—35	木	[0+0][4+6][3,8,9]	[齐] 〈2〉	
丁卯	初六(9)	(1)	(2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8)	火	? (未开奖, 需预测)		

又例如：某地传统型彩票某阶段中奖号码的主题类型演变系统：

• • • • •

	结构缩写	虚主题	主题类型
丁亥 _{廿二(3)}	2 4 9 1 2 4—0 土	[2+2][4+4][1+9] ⊗[3·7][5·0]	〈3〉
甲午 _{廿九(10)}	5 2 4 1 2 7—3 金	[2+2][5,4,1,7] [齐]	〈1〉
辛丑 _{初七(17)}	3 6 4 5 0 4—5 土	[6+4+4][5+0][3] ⊗[1·9][2·8]	〈2〉+1
戊申 _{十四(24)}	9 8 9 6 9 0—9 土	[9+9+9][8,6,0] ⊗[3·7]	〈1〉+1
乙卯 _{廿一(31)}	5 1 2 6 6 6—8 水	[6+6+6][5,1,2] ⊗[3·7]	〈1〉+1
壬戌 _{廿八(7)}	7 4 8 7 9 2—6 水	[7+7][2+8][4,9] ⊗[5·0]	〈2〉
己巳 _{初五(14)}	5 4 6 2 1 6—5 木	[4+6+6][5,2,1] ⊗[3·7]	〈1〉+1
丙子 _{十二(21)}	2 9 9 8 8 6—0 水	[2+8+8][9+9][6] ⊗[5·0][3·7]	〈2〉+1
癸未 _{十九(28)}	(1)(2)(3)(4)(5)(6)—(7)木	？(未开奖，需预测)	

第十一节 位置号码五行属性演变系统、总体五行 状态演变系统和五行结构演变系统

所谓位置号码五行属性演变系统，就是把正常顺序下各期次的各个位置号码所对应的五行属性记录下来，依先后顺序上下关系全部排列起来，形成位置号码五行属性演变系统。

至于总体五行状态演变系统，就是在位置号码五行属性的基础上，把每一期次所相应的总体五行状态记录下来，依先后顺序上下关系全部排列起来，形成总体五行状态演变系统。

位置号码五行属性演变系统是彩票中奖号码预测的最基本的基础之一，它具体地反映出各个位置的号码的五行属性之变化趋势，当我们要逐个位置地预测推算未知的号码时，就要凭借这

系统,就是要通过这系统找寻和识别这种变化的明显转折点以达到预测目的。本系统适用于中奖号码的个体即位置号码的预测。

而总体五行状态演变系统则是适用于中奖号码的总体结构的预测,因为它所反映的是不讲位置,内部没有重复五行属性的总体五行组合的变化趋势。认识和掌握中奖号码的总体五行状态可以在整体上去把握或约束预测范围内的号码之组合。

总体五行状态演变系统无疑也是干支数字信息载体总系统的一部分。它同样可以在干支系统、主题系统、纳音系统、农历系统、新历系统中作为一项内容附上。目的是充分发挥系统对总体五行状态的预测作用。

例如:某地36选7某阶段中奖号码在正常顺序下的位置号码五行属性演变系统和总体五行状态演变系统:

.....

	纳音	位置号码的五行属性	总体五行属性	虚五行
辛酉 _{廿八(4)}	6 16 18 23 27 29 32-33木	水水木木火金火-木	金木水火	⊗土
戊辰 _{初五(11)}	3 11 16 21 22 29 33-19木	木水水水火金木-金	金木水火	⊗土
乙亥 _{十二(18)}	8 9 10 11 18 19 24-1火	木金土水木金金-水	金木水土	⊗火
壬午 _{十九(25)}	3 7 8 18 24 25 29-1木	木火木木金土金-水	金木火土	⊗水
己丑 _{廿六(1)}	1 2 4 14 15 17 23-34火	水火金金土火木-金	金木水火土	[齐]
丙申 _{初四(8)}	4 10 17 22 25 28 34-9火	金土火火土木金-金	金木火土	⊗水
癸卯 _{十一(15)}	3 4 12 14 23 30 36-11金	木金火金木土水-水	金木水火土	[齐]
庚戌 _{十八(22)}	7 20 22 23 28 30 33-17金	火土火木木土木-火	木土火	⊗金水
丁巳 _{廿五(29)}	9 14 22 25 27 28 29-26土	金金火土火木金-水	金木火土	⊗水
甲子 _{初二(7)}	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)-(8)金	(未开奖,需预测)	?	?

又例如：某地传统型彩票某阶段中奖号码在正常顺序下的位置号码五行属性演变系统和总体五行状态演变系统：

.....

	纳音	位置号码的五行属性	总体五行属性	虚五行
丁亥 _{廿二(3)}	2 4 9 1 2 4—0	土 火金金水火金—土	金水火	⊗土木
甲午 _{廿九(10)}	5 2 4 1 2 7—3	金 土火金水火火—木	金水火土	⊗木
辛丑 _{初七(17)}	3 6 4 5 0 4—5	土 木水金土土金—土	金木土水	⊗火
戊申 _{十四(24)}	9 8 9 6 9 0—9	土 金木金水金土—金	金木土水	⊗火
乙卯 _{廿一(31)}	5 1 2 6 6 6—8	水 土水火水水水—木	土水火	⊗金木
壬戌 _{廿八(7)}	7 4 8 7 9 2—6	水 火金木火金火—水	金木火	⊗土水
己巳 _{初五(14)}	5 4 6 2 1 6—5	木 土金水火水水—土	金土水火	⊗木
丙子 _{十二(21)}	2 9 9 8 8 6—0	水 火金金木木水—土	金木水火	⊗土
癸未 _{十九(28)}	(1)(2)(3)(4)(5)(6)–(7)	木 ? (未开奖，需预测)		

[重要说明]

在预测过程中，除了要充分地观察、分析本位置号码在垂直方向的变化趋势与特点外，还应观察分析本位置号码在斜线方向与其他号码的相生相克关系。

所谓五行结构演变系统，就指在正常顺序下的干支数字信息载体总系统中，把各期次的中奖号码依先后顺序上下关系按五行结构即金木水火土逐一分类后而形成。

五行结构演变系统，其功能主要是反映出正常顺序下各期次的具体中奖号码在五行分类中的变化趋势与特点。这个系统不是结构缩写，而是具体每一个中奖号码依五行属性分类组合

而形成；本系统内的具体中奖号码之排列虽然不讲位置，但能充分反映出当期次的中奖号码中有多少个“木”，而且能真实地反映出有哪些“木”号码，“金”号码，“土”号码，“水”号码，“火”号码。当然，在五行结构演变系统中，同样能反映出虚五行号码，其在系统中记作为：⊗。

五行结构演变系统不仅适用于中奖号码的总体结构的预测，更是具体中奖号码预测时的取舍依据之一！

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的五行结构演变系统：

.....

										⊙金	⊙木	⊙水	⊙火	⊙土
辛酉	廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32-33	木	29	18,23	6,16	27	⊗
戊辰	初五(11)	3	11	16	21	22	29	33-19	木	29	3,33	11,21,16	22	⊗
乙亥	十二(18)	8	9	10	11	18	19	24-1	火	9,19,24	8,18	11	⊗	10
壬午	十九(25)	3	7	8	18	24	25	29-1	木	24,29	3,8,18	⊗	7	25
己丑	廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23-34	火	4,14	23	1	2,17	15
丙申	初四(8)	4	10	17	22	25	28	34-9	火	4,34	28	⊗	17,22	10
癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36-11	金	4,14	3,23	36	12	30
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33-17	金	⊗	23,33,28	⊗	7,22	20,30
丁巳	廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29-26	土	9,29,24	28	⊗	22,27	25
甲子	初二(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)	金	?	?	?	?	?

[注：特别号码单独考虑，不在处理之列。]

又例如：某地传统型彩票某阶段中奖号码的五行结构演变系统：

.....

									金	木	水	火	土
丁亥	廿二(3)	2	4	9	1	2	4-0	土	4,4,9	⊗	1	2,2	⊗
甲午	廿九(10)	5	2	4	1	2	7-3	金	4	⊗	1	2,2,7	5
辛丑	初七(17)	3	6	4	5	0	4-5	土	4,4	3	6	⊗	5,0
戊申	十四(24)	9	8	9	6	9	0-9	土	9,9,9	8	6	⊗	0
乙卯	廿一(31)	5	1	2	6	6	6-8	水	⊗	⊗	1,6,6,6	2	5
壬戌	廿八(7)	7	4	8	7	9	2-6	水	4,9	8	⊗	7,7,2	⊗
己巳	初五(14)	5	4	6	2	1	6-5	木	4	⊗	1,6,6	2	5
丙子	十二(21)	2	9	9	8	8	6-0	水	9,9	8,8	6	2	⊗
癸未	十九(28)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(7)	木	? (未开奖, 需预测)				

[重要说明]

乐透型彩票(如 36 选 7)的位置号码是经过人工重新排列的,而传统型彩票的位置号码是直接开奖得到的,没有经过人工排列,是固定的;乐透型彩票的每一个号码没有重复,而传统型彩票每个位置号码均是 0—9 共十个号码,即各个位置可以重复号码,所以相对而言,传统型彩票的各项内容预测更注重每个位置的“独立”预测,某些总体结构预测的效果有时比不上乐透型彩票那么明显。但无论如何万变也不离其宗。

第十二节 奇偶性演变系统

所谓奇偶性演变系统,就是把正常顺序下各期次的各个位置号码所对应的奇或偶记录下来,依先后顺序上下关系全部排列起来,形成奇偶性演变系统。

本系统是适用于中奖号码的总体结构和局部个体的奇或偶数的预测。因为每一位置号码不是单就是双，若能准确地判断出该位置号码属于哪一个，则就能把相关号码数字可以缩减一半了。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码的奇偶性演变系统：

.....

										总体奇/偶比例
辛酉	廿八(4)	双	双	双	单	单	单	双	— 单	木 3:4
戊辰	初五(11)	单	单	双	单	双	单	单	— 单	木 5:2
乙亥	十二(18)	双	单	双	单	双	单	双	— 单	火 3:4
壬午	十九(25)	单	单	双	双	双	单	单	— 单	木 4:3
己丑	廿六(1)	单	双	双	双	单	单	单	— 双	火 4:3
丙申	初四(8)	双	双	单	双	单	双	双	— 单	火 2:5
癸卯	十一(15)	单	双	双	双	单	双	双	— 单	金 2:5
庚戌	十八(22)	单	双	双	单	双	双	单	— 单	金 3:4
丁巳	廿五(29)	单	双	双	单	单	双	单	— 双	土 4:3
甲子	初二(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	金 ?(未开奖,需预测)

第十三节 生肖码演变系统

所谓生肖码演变系统，就是把正常顺序下各期次的各个位置号码所对应的生肖(地支)名记录下来，依先后顺序上下关系全部排列起来，形成生肖码演变系统。

因为生肖码是每一个位置号码的生肖名，它反映的是具体号码，是与这一生肖对应的具体号码，所以，每一个位置号码经过五行属性的预测后所剩下的小范围“尾数”，若再结合位置的生肖号码之预测，则最后的预测结论所得出的号码就不会

有多少了。

若经过预测得知下一期的中奖号码总体中，一定会含有某种“生肖码”或某 2 种“生肖码”，则就可以在总体的号码组合中去衡量和把握。

生肖码演变系统适用于中奖号码的总体结构和位置号码的个体预测。可以说，生肖码演变系统是专门为独特的、自成特点体系的生肖码的预测而设，即是说，生肖码的预测既可独立地进行，也可以结合其他的预测体系进行。

例如：某地 47 选 6(2001 年)某阶段中奖号码的生肖码演变系统：

.....

庚子 _{十四(6)}	8 戌	28 寅	29 丑	45 酉	46 申	47 未	—	13 巳
丁未 _{廿一(13)}	9 酉	12 午	14 辰	22 申	29 丑	43 亥	—	8 戌
甲寅 _{廿八(20)}	5 丑	9 酉	18 子	20 戌	41 丑	44 戌	—	14 辰
辛酉 _{初五(27)}	1 巳	10 申	24 午	25 巳	43 亥	47 未	—	34 申
戊辰 _{十二(6)}	9 酉	19 亥	20 戌	28 寅	29 丑	35 未	—	15 卯
乙亥 _{十九(13)}	7 亥	19 亥	26 辰	36 午	37 巳	42 子	—	33 酉
壬午 _{廿六(20)}	11 未	18 子	20 戌	26 辰	28 寅	47 未	—	10 申
己丑 _{初三(27)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	—	(7)

又例如：某地传统型彩票(2001 年)某阶段中奖号码的生肖码演变系统：

.....

庚子 _{十四(6)}	1 巳	4 寅	5 丑	1 巳	9 酉	7 亥 —	2 辰
丁未 _{廿一(13)}	1 巳	7 亥	3 卯	8 戌	7 亥	0 申 —	9 酉
甲寅 _{廿八(20)}	5 丑	8 戌	0 申	2 辰	2 辰	4 寅 —	3 卯
辛酉 _{初五(27)}	3 卯	3 卯	1 巳	2 辰	6 子	9 酉 —	0 申
戊辰 _{十二(6)}	6 子	5 丑	4 寅	9 酉	6 子	0 申 —	4 寅
乙亥 _{十九(13)}	2 辰	7 亥	4 寅	6 子	8 戌	8 戌 —	1 巳
壬午 _{廿六(20)}	3 卯	2 辰	8 戌	1 巳	5 丑	5 丑 —	6 子
己丑 _{初三(27)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) —	(7)

(未开奖，需预测)

[重要说明]

因为生肖有十二个，而传统型彩票的每一个位置只有 0—9 十个号码，所以当年生肖与 0—9 的数字进行挂钩对应时，“0”作“10”与相应的生肖对应；因为没有数字“11”和“12”，则“11”和“12”所对应的两个生肖就自然空缺，比如 2001 年与“11”和“12”对应的两个生肖分别是未(11)和午(12)而到了 2002 年“11”和“12”对应的两个生肖分别是申(11)和未(12)。自然空缺的生肖不会影响预测方法的应用，也不会影响其他生肖码的预测结果。

又比如“四花选 4”彩票，其每个位置有 1—13 个号码，这些号码与当年次的生肖发生对应时，则其中号码“13”就自然地多出了一个，但“13”的生肖名与号码“1”是一致的，这也不影响生肖码演变系统的预测功能。

第十四节 等距离排列系统和号码等距离环环相比系统

等距离者，是指正常顺序下(每周固定日开奖一次)开奖日的期次与期次间的间隔相等；把所有间隔相等期次的干支数字信息载体总系统的相关资料、数据全部依先后顺序上下关系排列在一起，就形成了等距离排列系统。

等距离排列系统的基础是正常顺序下的干支数字信息载体总系统，总系统中所有项目内容也相应地成为等距离排列系统的内容。换句话说，等距离排列系统也是另外一种顺序排列的干支数字信息载体系统。

从理论上而言，在正常顺序下的干支数字信息载体总系统中所有开奖期次不论其等距离的间隔有多远、多么长，均可以组成相应的等距离排列系统，但在实际预测应用过程中，只建立和组成相隔 1—11 位的等距离排列系统，即是说，凡是相隔 1 期的中奖号码及其相关项目、内容、数据全部依先后顺序排列起来就形成了第 2 位的等距离排列系统；凡是相隔 2 期的中奖号码及其相关项目、内容、数据全部依先后顺序排列起来形成第 3 位的等距离排列系统；凡是相隔 3 期的中奖号码及其相关项目、内容、数据全部依先后顺序排列起来形成第 4 位的等距离排列系统……其他位置的等距离排列系统如此类推形成。其中相隔 9 期的第 10 位的等距离排列系统就是天干系统，相隔 11 期的第 12 位的等距离排列系统就是地支系统。

等距离排列系统的建立的目的就是通过“等距离”的同一条件下重新排列干支数字信息载体总系统中所有“数据”和“信息”，找寻和识别出中奖号码更多的出没变化规律性的东西，以便于在预测过程中能有足够的“理由”、“数据”作出

准确的预测结论。有时候，某种变化状态的临界点在正常顺序下的干支数字信息载体总系统中不明显而不能作出预测结论，但在某个等距离排列系统中则就呈现出明显的变化临界点，这时就可以放心地作出相关预测结论。

等距离排列系统适用于中奖号码的总体结构和各个位置号码的个体预测。在正常顺序下的干支数字信息载体总系统下能应用的各种预测方法同样适用于等距离排列系统。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码相隔 2 期的第 3 位等距离排列系统：（注：各期次的数型、配伍、主题类型等等均可以相应附上，如下省略，请谅！）

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

主题结构缩写		虚主题	岁数	相冲资料	九宫星
辛酉廿八(4)	6	16 18 23 27 29 32—33	木	$[6+6][2+8][3+7][9] \otimes [5 \cdot 0]$ (25)	[水、土][乙卯、己卯]七赤
壬午十九(25)	3	7 8 18 24 25 29—1	木	$[3+7][8+8][4,5,9]$ [齐] (64)	[水、土][丙子、庚子]四绿
癸卯十一(15)	3	4 12 14 23 30 36—11	金	$[3+3][4+4+6][0,2] \otimes [1 \cdot 9]$ (44)	[火、木][丁酉、辛酉]一白
甲子初二(7)	1	5 6 19 20 23 35—11	金	$[1+9][5+5+0][3,6] \otimes [2 \cdot 8]$ (23)	[火、木][戊午、壬午]七赤
乙酉廿三(28)	3	8 11 16 18 20 28—6	水	$[8+8+8][3,1,0,6]$ [齐] (62)	[土、火][己卯、丁卯]四绿
丙午十四(18)	1	8 11 15 21 29 35—23	水	$[1+1+1+9][5+5][8] \otimes [4 \cdot 6][3 \cdot 7]$ (41)	[土、火][庚子、戊子]一白
丁卯初六(9)	5	14 18 21 31 34 35—10	火	$[1+1][4+4][5+5][8] \otimes [3 \cdot 7]$ (20)	[木、金][辛酉、癸酉]三碧
戊子廿七(30)	3	14 21 22 23 27 29—32	火	$[3+3+7][1+9][2,4] \otimes [5 \cdot 0]$ (59)	[木、金][壬午、丙午]六白
己酉十九(20)	3	4 6 22 23 33 36—29	土	$[4+6+6][3+3+3][2] \otimes [1 \cdot 9][5 \cdot 0]$ (38)	[金、水][癸卯、乙卯]九紫
庚午初十(11)	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8)	土 (未开奖，需预测) ?	(17)	[金、水][甲子、丙子]三碧	

至于传统型彩票与乐透型(比如 36 选 7)的等距离排列系统的形式均是一样的。

所谓号码等距离环环相比系统，就是指各期次的中奖号码在“等距离”的同一条件下，各期次的中奖号码相应上下配对，然后再依先后顺序上下关系排列在一起而形成号码等距离环环相比系统。

例如：某地 36 选 7 某阶段中奖号码相隔 2 期的第 3 位号码等距离环环相比系统：

(为便于对比，附上相应的正常顺序下的中奖号码为：)

.....

辛酉	廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32 — 33	木
戊辰	初五(11)	3	11	16	21	22	29	33 — 19	木
乙亥	十二(18)	8	9	10	11	18	19	24 — 1	火
壬午	十九(25)	3	7	8	18	24	25	29 — 1	木
己丑	廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23 — 34	火
丙申	初四(8)	4	10	17	22	25	28	34 — 9	火
癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36 — 11	金
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33 — 17	金
丁巳	廿五(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土

(未开奖，需预测)

.....

			↓			↓			
{	辛酉	廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32 — 33
{	壬午	十九(25)	3	7	8	18	24	25	29 — 1
{	戊辰	初五(11)	3	11	16	21	22	29	33 — 19
{	己丑	廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23 — 34

{	乙亥 ^{十二(18)}	8	9	10	11	18	19	24	—	1
	丙申 ^{初四(8)}	4	10	17	22	25	28	34	—	9
{	壬午 ^{十九(25)}	3	7	8	18	24	25	29	—	1
	癸卯 ^{十一(15)}	3	4	12	14	23	30	36	—	11
{	己丑 ^{廿六(1)}	1	2	4	14	15	17	23	—	34
	庚戌 ^{十八(22)}	7	20	22	23	28	30	33	—	17
{	丙申 ^{初四(8)}	4	10	17	22	25	28	34	—	9
	丁巳 ^{廿五(29)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	

(未开奖，需预测)

——上述的号码等距离环环相比系统，同样可以附上数型、配伍、主题类型及结构缩写。比如，上述中的 $\left\{ \begin{array}{l} \text{辛酉}^{廿八(4)} \\ \text{壬午}^{十九(25)} \end{array} \right.$ 整理为：

$\left\{ \begin{array}{l} \text{辛酉}^{廿八(4)} \text{ 6 16 18 23 27 29 32—33 木 } [6+6][2+8][3+7][9] \text{ } \otimes [5 \cdot 0] \text{ (25)[水、土][乙卯、己卯]七赤 } 0 \text{ 1 2 3 6 3 4 4 1 }^{[7]} \text{—4} \\ \text{壬午}^{十九(25)} \text{ 3 7 8 18 24 25 29—1 木 } [3+7][8+8][4, 5, 9] \text{ [齐] (64)[水、土][丙子、庚子]四绿 } 0 0 1 2 3 3 3 4 0^{[3]} \text{—0} \end{array} \right.$

其他均如此类推。建立各期次的号码等距离环环相比系统，目的是发现和挖掘出中奖号码在这种形式排列后，期次间各种变化状态对比的明显临界点，以便于作出相应的预测结论。本系统适用于中奖号码的总体结构和位置号码的个体预测推算。

在实际预测过程中，只建立和组成相隔 1—11 位的号码等距离环环相比系统，其原理与等距离排列系统是一致的，只不过它们之间的排列组合的方式不同而已。

[重要说明]

1. 等距离排列和等距离环环相比是彩票中奖号码预测学的

两种重要的预测途径和手段，目的就是千方百计地发挥和利用现有的、已知的中奖号码及其相应的标准参照系为准确的预测推算服务。不经过合理的分类处理、排列组合，是不足以产生极小范围内的准确的预测结果的。1—12 期的等距离排列以及 1—12 期的号码等距离环环相比形成系统后，就“创造”出了科学的、合理的、全新排列的“中奖号码”，为准确预测推算提供了足够的“信息库”与“数据库”！

2. 号码等距离环环相比系统，实质上是以等距离配对的中奖号码作为一个局部的小整体，依先后顺序排列好，小整体与小整体间再进行多种预测内容的具体对比，找出上下间这种变化趋势的明显转折点，从而加以利用达到某些预测目的。

3. 无论是某系统还是某演变系统或是某等距离排列系统、号码等距离环环相比系统，其共通的功能就是尽量地为准确的预测服务。在预测的具体过程中，对于各种预测内容的变化趋势、特点或状态，其在相应的系统之具体反映时，去判断和识别其变化的明显转折点即临界点的原则是：明显者用之，不明显者弃之。

记住：每一个系统均可以为你带来有预测价值的东西：系统越多，就越能挖掘出更多的变化的明显临界点；充分发挥了每一个系统的预测作用，等于中奖号码的预测推算就有了足够的保障。

比如彩票发行中心开奖期次顺序（即混合顺序，一周 2—3 次）的号码排列所形成的整体，也可以视作为一个特别的系统。或者乐透型彩票现场被摇出的中奖号码之顺序而形成的“期次整体”，也可以被视作为一个特别的系统。

第五章 每一个位置号码的预测 推算原则与方法

第一节 预测推算前的准备工作

为了保证预测过程的顺利、高效、准确地进行,广大彩民在预测推算中奖号码的每一个位置号码之前,必须要熟练掌握如下必需的,最基本的常识:

(一)十天干和十二地支的名称排列顺序和五行属性:

属“木”的 { 天干:甲、乙
 地支:寅、卯

属“火”的 { 天干:丙、丁
 地支:午、巳

属“土”的 { 天干:戊、己
 地支:丑、辰、未、戌

属“金”的 { 天干:庚、辛
 地支:申、酉

属“水”的 { 天干:壬、癸
 地支:子、亥

(二)彩票游戏规则下的每个号码之五行属性:

1. 属“水”的号码:凡是号码的尾数含有“1”和“6”的数字,分别记作[1]和[6];

2. 属“木”的号码：凡是号码的尾数含有“3”和“8”的数字，分别记作[3]和[8]；

3. 属“火”的号码：凡是号码的尾数含有“2”和“7”的数字，分别记作[2]和[7]；

4. 属“金”的号码：凡是号码的尾数含有“4”和“9”的数字，分别记作[4]和[9]；

5. 属“土”的号码：凡是号码的尾数含有“5”和“0”的数字，分别记作[5]和[0]。

(三) 标准参照系中开奖日的农历尾数和新历尾数以及相冲岁数之五行属性：

1. 属“水”的数字：凡是农历尾数含有“一”和“六”者，新历尾数，相冲(数字)尾数含有“1”和“6”者；

2. 属“木”的数字：凡是农历尾数含有“三”和“八”者，新历尾数，相冲(数字)尾数含有“3”和“8”者；

3. 属“火”的数字：凡是农历尾数含有“二”和“七”者，新历尾数，相冲(数字)尾数含有“2”和“7”者；

4. 属“金”的数字：凡是农历尾数含有“四”和“九”者，新历尾数，相冲(数字)尾数含有“4”和“9”者；

5. 属“土”的数字：凡是农历尾数含有“十”和“五”者，新历尾数，相冲(数字)尾数含有“0”和“5”者。

(四) 五行属性之相生相克规律：

水 $\xrightarrow{\text{生}}$ 木 $\xrightarrow{\text{生}}$ 火 $\xrightarrow{\text{生}}$ 土 $\xrightarrow{\text{生}}$ 金 $\xrightarrow{\text{生}}$ 水

[1][6] [3][8] [2][7] [5][0] [4][9] [1][6]

水 $\xrightarrow{\text{克}}$ 火 $\xrightarrow{\text{克}}$ 金 $\xrightarrow{\text{克}}$ 木 $\xrightarrow{\text{克}}$ 土 $\xrightarrow{\text{克}}$ 水

[1][6] [2][7] [4][9] [3][8] [0][5] [1][6]

水 $\xleftarrow{\text{刑}}$ 水； 土 $\xleftarrow{\text{刑}}$ 土； 木 $\xleftarrow{\text{刑}}$ 木；

[1][6] [1][6] [5][0] [5][0] [3][8] [3][8]

火 $\xleftarrow{\text{刑}}$ 火； 金 $\xleftarrow{\text{刑}}$ 金

[2][7] [2][7] [4][9] [4][9]

注：同类五行属性进行相生相克关系对应时，在彩票中奖号码预测的应用过程中，记作“刑”，（其实也是相克关系的特殊表现）。

〔重要说明〕

在彩票中奖号码预测中，中奖号码的尾数之五行属性不仅与开奖日的标准参照系中的天干、地支、纳音之五行属性是对等的、相通的、一致的，而且与开奖日的标准参照系的农历尾数、新历尾数、相冲岁数、九宫星的五行属性也是对等的、一致的，所以中奖号码的尾数可以自由地与标准参照系中任何一项“标准”进行生克关系的对应！

当然，除了要熟练掌握上述的最基本常识外，还必须具备如下必需的“数据”与“信息库”：

（一）一本正版的、通胜日历（即阴阳日历）或万年历。

（二）一份正确的、依正常顺序的“六十花甲纳音表”。

（三）一份正确的、依正常顺序的“干支相冲关系一览表”。注：上述（二）、（三）本书均附有。

（四）建立和组建开奖日齐全的、完善的、干支数字信息载体总系统。

（五）在上述的基础上分类组建齐全的、完善的各种系统与演变系统、等距离排列系统和号码等距离环环相比系统。

已知的、过往的中奖号码数据越多越好，为了便于预测推算，中奖号码的“历史”数据（以每周开奖一次计）至少不应少于一年。若因某种特殊情况，某一期的开奖因故提早或推迟 1—2 天，那么该开奖结果的中奖号码也可以变通地、灵活地“充当”正常固

定日的中奖号码，这样就不会影响标准参照系的结构以及各系统的组建。

又比如因故某开奖日停止开奖而又没有推迟或补开，那么，该日的标准参照系依旧按照顺序填写、排列，只不过相应的开奖号码只能空缺。即是说，无论什么情况，正常顺序下的干支数字信息载体总系统的顺序结构不能空缺！

因为预测方法是以开奖日的标准参照系来衡量相关的中奖号码，相对而言，当天开奖日内的开奖时间的波动对本书的预测方法不会构成足够改变预测结果的影响。

第二节 “事应过三”验证法则和“事不过三”预测法则

本书前面的章节已介绍过，“事应过三”验证法则就是指彩票中奖号码的整个预测过程中，凡是作出任何一个预测结果，必须至少还有三种以上其它不同方式，不同渠道的一致预测结果来进一步证实，以确保预测结果的准确性。

我们已经知道，彩票中奖号码在摇奖机中的产生过程，是一个“伪随机”过程，正所谓“一方彩票养一方特点”，但无论如何，彩票中奖号码的出没规律性，其呈现在变化万千的各种变化现象和状态中或明显或不明显，所以，为了达到准确地预测中奖号码的目的，针对中奖号码变化出没的外因和内因，我们必须抓住和利用中奖号码间、中奖号码与开奖日的标准参照系间的各种关系的对应，对比所显示出的轨迹变化状态，灵活地、准确地识别出这些变化状态的明显临界点，根据临界点变化前后的不一样性就可以达到预测目的。

彩票中奖号码的出没特点，就是——多变、变得快，不变的现

象没有，所以中奖号码间、中奖号码与标准参照系间的各种关系进行对比时所显示出的某种变化状态，绝大多数不会维持这种变化状态太长时间。即所谓“物极必反”。

“事不过三”预测法则，就是指中奖号码间、中奖号码与标准参照系间若干对之个体、局部、总体进行对应时一是共同所产生的相生或相克，相刑关系的次数与同一方向，大多数不会超过三次；二是共同所产生的某一数值绝大多数不会超过三次。

每一位位置号码的预测推算就是从“次数”和“同一方向”着手！

次数，指在预测过程中，运用各种预测技术，预测方法时在同一条件下，若干对两种事物或两个数字间发生某种共同的特定关系对应的次数。这是判断明显临界点的主要依据。

方向，指在预测过程中，开奖日的天干、地支、纳音、数字与号码间、或号码与号码间依五行理论的相生相克规律对应时所产生的轨迹对应方向。这也是判断明显临界点的主要依据。

例如：土与水发生相克的关系，那么只能是土^克→水，但如果是“土”与未知的位置号码发生相克的关系，那么就会有三种方向相克的可能：要么土^克→水；要么土^克←木；要么土^刑←土。

如果是“土”与未知的位置号码发生相生的关系，那么就会有两种方向相生的可能：要么土^生→金；要么土^生←火。

〔重要说明〕

即是说，“方向”也能准确地反映出两者间的相应关系；只要其中一个对象的五行属性是已知的，而两者间发生相生相克关系的方向也是知道的，则可通过相应的生克规律推理就可得出另一个对象（未知的）五行属性。所以判断号码与号码间、号码与标准参照系间若干对同等位置共同进行相生相克关系时所产生的次数与方向是预测推算位置号码的重要途径和手段。

中奖号码经过由左到右、由小至大的位置排列后，每一位位置

号码的预测推算的方法均是一致的，各种预测方法在任何一个位置号码的使用均是共通的，所以，只要某种预测方法在某一具体位置能使用，则其在另外的位置同样能使用。

第三节 标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测法

位置号码与标准参照系各信息载体的对应、或号码间的对应，在系统内的方位而言，有三种对应：一是平行对应，二是斜线对应，三是垂直对应。

平行对应：是指位置号码与标准参照系各载体或号码间进行对应时，两者由于均是同一开奖日的资料组成部分，所以在同一水平线上进行，故称为平行对应。

斜线对应：是指位置号码与标准参照系各载体或号码间进行对应时，两者由于不是同一开奖日的资料组成部分，所以不在同一水平线上进行，若两者间用直线连接起来，直观上形成一条斜线，故形象地称为斜线对应。包括：左斜线和右斜线两种对应。

垂直对应：是指位置号码与位置号码间进行对应时，两者由于不是同一开奖日中的组成部分，所以不在同一水平线上进行，若两者间用直线连接起来，直观上形成一条垂直的直线，故形象地称为垂直对应，垂直对应实际上是同一位置上的号码间的对应。

上述三种对应过程中，因为两者的对比，对应关系均可以通过“直线”连接起来而得到形象的反映，所以这些若干条“直线”就被看成两者间这种对应关系的“运动轨迹”了。

标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测法，就是在干支数字信息载体总系统（包含其他各个系统）中，已知的号码、未知的号码与系统内相应的各信息载体（天干、地支、纳音、农历尾数、新历尾数、相冲岁数等）若干对进行同等位置的、逐项的、逐个

位置的五行属性之生克关系对应，通过记录若干对两者间在对应过程中共同产生的生克关系之次数与方向，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

衡量生克关系的临界点不外乎是两者的相生或相克（相刑）的次数和方向，但如何制定识别生克关系变化状态的临界点的标准呢？这是判断变化状态转折点的关键。

识别生克关系变化的临界点的标准有两个：一是“最高记录”标准，二是“次最高记录”标准。

所谓“最高记录”标准，是指在由已知的、大量的中奖号码组成的干支数字信息载体总系统内，已经发生过、类似的位置号码与系统内相应的各信息载体（天干/地支/纳音/九宫星/农历尾数/新历尾数/相冲岁数等）若干对进行同等位置的，逐项的五行属性的生克关系对应时，查阅同一类、若干对两者间在对应过程中共同产生的生克关系之次数与方向的最高记录是多少，即这个最高记录反映的是同等位置下的这种变化状态能维持的最长时间，这个最高记录就自然地成为识别这一类变化状态的临界点的“最高记录”标准。同理：

所谓“次最高记录标准”，就是查阅同一类、若干对两者间在对应过程中共同产生的生克关系之次数与方向的次最高记录是多少，这个次最高记录就自然地成为识别这一类变化状态的临界点之“次最高记录”标准。

识别生克关系变化状态的临界点的“最高记录”与“次最高记录”标准其实是根据这只彩票发生过的同一类的历史数据来制定，因为“最高记录”和“次最高记录”是源自本只彩票的大量的同一类变化状态的统计数据，所以其可靠性不用置疑。

为什么要制定两个标准呢？在实际的预测过程中，出现某种

“最高记录”标准的临界点变化状态毕竟是比较少的,大多数情形是出现“次最高记录”标准的临界点变化状态,换句话说,大多数情况下当某种变化的状态已经达到“次最高记录”标准,其实这就是变化的临界点了。采用“最高记录”标准来识别变化状态的临界点当然能保证相应所得的预测结论是正确的,但这种标准适用的机会不是很多,若处处坚持“最高记录”标准,则浪费了许多较明显的变化临界点。所以为了解决既要保证预测的结果是正确的(当然这是前提),又要充分发挥较多的变化的较明显临界点的预测作用,则就要坚决地执行如下两项措施:

1. 坚持“事应过三”的验证法则;
2. 具体问题总是具体地分析和解决。

有了识别生克关系变化状态的临界点的标准,就可以进行具体判断每一位置号码相应的、同一类的变化状态的准确的临界点,根据临界点变化前后的不一样性就可以得出某种相应的预测结论。

我们已经知道,任何一个位置号码的范畴不外乎金、木、水、火、土之一,就是说,每一个位置号码的五行属性,其中4/5行是多余的,不可能出现的,只有1/5行才是正确的出现范围!所以,运用各种方式,通过各种渠道,逐个位置地排除不可能出现的若干个五行属性或尾数,极力地、准确地缩减中奖号码产生的包围圈,这就是我们的预测目的。

[重要说明]

充分发挥干支数字信息载体总系统(包括各个分系统)的“信息库”功能,高度重视和发挥每一种方式,每一种方法,每一个环节所能达到的预测推算作用,能准确地排除多一个位置号码或五行属性,就能多排除成千上万不可能出现的号码组合!

一、天干——位置号码生克轨迹对应预测法

就是指开奖日的天干（包括相冲资料的天干）与系统内各个位置号码间，若干对在同等位置进行的生克关系对应的预测法。通过记录若干对两者间在对应过程中形成的生克关系（包括相刑）的次数与方向，确认该变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。


（一）选定适用的系统：总系统、干支系统、纳音系统、农历系统、新历系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

（二）检索和找出：识别天干——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

①天干——位置号码进行相生相克（相刑）关系对应时，同一方向的相生或相克或相刑为：3—4次；

②天干——位置号码进行相生相克关系对应时，同一方向的相生和相克（不含相刑）混合轨迹为 6—7 次；

③天干——位置号码进行相生相克关系对应时，混合轨迹对称的方向来回达 3—4 次，即



（注：只考虑方向及次数，不考虑是否相生和相克）

（三）搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量对比，当然具体问题还须具体分析。原则是：明显者用之，不明显者弃之。

（四）作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码,同一预测内容必须坚持“事应过三”验证法则。原则是:必须保证预测结论是准确的。

例 1:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰	初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	土
癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	水
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	土
丁丑	廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36	—	4	水
甲申	初二(18)	5	7	12	20	22	26	29	—	3	水
辛卯	初九(25)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木(未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上图箭头所示的斜线对应,天干甲——位置(2)之前出现一个变化的明显临界点(相刑已达3次),所以“甲”与位置(2)就不会再发生相刑的关系,即甲(木) $\xrightarrow[\text{刑}]{\otimes}$ 位置(2),从而位置(2)就可以排除属木的[3]和[8]的号码了。

例 2:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木
丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34	—	13	水
癸丑	廿八(19)	3	5	8	20	27	28	35	—	33	木
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木
丁卯	十三(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	火(未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上述箭头所示的平行对应,天干丁——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑已达3次),所以“丁”与位置(2)就不会再发生相刑的关系,即“丁”(火) $\xrightarrow[\text{刑}]{\otimes}$ 位置(2),从而位置(2)就可以排除属火的[2]和[7]的号码了。

例 3:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	— 30	木	(注:其他资料略)
戊辰	十二(16)	1	2	5	7	17	19	23	— 30	木	
乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36	— 3	火	
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	— 28	木	
己丑	初三(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	火(未开奖,需预测)	
丙申	初十(3)									火	

——如上图箭头所示的斜线对应,天干丙——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑已达3次),所以“丙”与位置(7)就不会再发生相刑的关系,即丙(火) $\xleftarrow[\otimes]{刑}$ 位置(7),从而位置(7)就可以排除属火的[2]和[7]之号码了。

例 4:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34	— 13	水	(注:其他资料略)
癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35	— 33	木	
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	— 3	木	
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36	— 34	火	
甲戌	廿十(10)	1	5	6	13	19	21	23	— 20	火	
辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	— 32	金	
戊子	初四(24)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	火(未开奖,需预测)	

——如上图箭头所示的斜线对应，天干辛——位置 (3) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向相克已达 4 次)，所以“辛”与位置 (3) 就不会再发生同一方向的相克关系，即辛 (金) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 火，从而位置 (3) 就可以排除属火的 [2] 和 [7] 的号码了。

例 5: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁卯 _{十三(3)}	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火
甲戌 _{廿十(10)}	1	5	6 _克	13	19	21	23	—	20	火
辛巳 _{廿七(17)}	8	9	14 _克	20	22	29	31	—	32	金
戊子 _{初四(24)}	3	12	15 _克	16	17	33	35	—	8	火
乙未 _{廿十(31)}	(1)	(2)	(3) _克	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金(未开奖,需预测)
壬寅 _{十八(7)}										金

(注: 其他资料略)

——如上图箭头所示的斜线对应，天干壬——位置 (7) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相克关系已达 3 次)，所以“壬”与位置 (7) 就不会再发生同一方向的相克关系，即壬 (水) $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 火，从而位置 (7) 就可以排除属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 6: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27	—	7	土
乙酉 _{卅(22)}	10	15	18	19	21	26	35	—	2	水
壬辰 _{初七(29)}	7	8	9	16	18	26	34	—	28	水
己亥 _{十四(5)}	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木
丙午 _{廿一(12)}	4	12	17	20	22	24	34	—	13	水
癸丑 _{廿八(19)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上图箭头所示的平行对应，天干癸——位置 (1) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向的相克关系已经达 4 次)，所以“癸”与位置 (1) 就不会再发生同一方向的相克关系，即：癸 (水) $\xrightarrow{\text{克}} \text{火}$ ，从而位置 (1) 就可以排除属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 7: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

庚戌	廿四 (17)	6	11	12	18	19	27	30	—	34	金
丁巳	初二 (24)	3	8	13	20	25	31	36	—	26	土
甲子	初九 (1)	1	8	11	15	17	20	24	—	10	金
辛未	十六 (8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31	土
戊寅	廿三 (15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土 (未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上图箭头所示的平行对应，天干戊——位置 (3) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生关系已达 3 次)，所以“戊”与位置 (3) 就不会再发生同一方向的相生关系，即：戊 (土) $\xleftarrow{\text{克}} \text{火}$ ，从而位置 (3) 就可以排除属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 8: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

癸丑	廿八 (19)	3	6	8	20	27	28	35	—	33	木
庚申	初六 (26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木
丁卯	十三 (3)	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火
甲戌	二十 (10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	火
辛巳	廿七 (17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金
戊子	初四 (24)	3	12	15	16	17	33	35	—	8	火
乙未	十一 (31)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金 (未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上图箭头所示的平行对应，天干戊——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达3次)，所以“戊”与位置(7)就不会再发生同一方向的相生关系，即：戊(土) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 火，从而位置(7)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 9:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35	—	33	木
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火
甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	火
辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金
戊子	初四(24)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	火(未开奖,需预测)
乙未	十一(31)										金

(注:其他资料略)

——如上图箭头所示斜线对应，天干乙——位置(3)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达4次)，所以“乙”与位置(3)就不会再发生同一方向的相生关系，即：乙(木) $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 火，从而位置(3)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 10:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31-2	木	[水、土]	[癸巳、丁巳]
丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34-13	水	[土、火]	[庚子、戊子]
癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35-33	木	[水、土]	[丁未、辛未]
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35-3	木	[水、土]	[甲寅、戊寅]
丁卯	十三(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)	火	[木、金]	[辛酉、癸酉]

(未开奖,需预测)

开奖日的相冲资料

——如上图箭头所示的平行对应,相冲资料的天干甲——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达3次),所以“甲”与位置(2)就不会再发生同一方向的相克关系,即火 $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 辛(金),从而位置(2)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 11:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—	28	木	[水、土]	[丙子、庚子]
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	—	4	火	[木、金]	[癸未、乙未]
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	—	19	火	[木、金]	[庚寅、壬寅]
癸卯	十七(10)	3	14	15	18	32	34	36	—	2	金	[火、木]	[丁酉、辛酉]
庚戌	廿四(17)	6	11	12	28	19	27	30	—	34	金	[火、木]	[甲辰、戊辰]
丁巳	初二(24)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土	[金、水]	[辛亥、癸亥]
甲子	初九(1)	(未开奖,需预测)									金	[火、木]	[戊午、壬午]

——如上图箭头所示的斜线对应,相冲资料的天干戊——位置(7)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达4次),所以“戊”与位置(7)就不会再发生同一方向的相生关系,即:火 $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 戊,从而位置(7)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 12:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木	[水、土]	[甲寅、戊寅]
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火	[木、金]	[辛酉、癸酉]
甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	火	[木、金]	[戊辰、庚辰]
辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金	[火、木]	[乙亥、己亥]
戊子	初四(24)	3	12	15	16	17	33	35	—	8	火	[木、金]	[壬午、丙午]
乙未	十一(31)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金	[火、木]	[己丑、癸丑]

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的天干丙——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系已达3次)，所以“丙”与位置(3)就不会再发生相刑关系，即火 $\xleftarrow{\text{刑}} \text{丙}(\text{火})$ ，从而位置(3)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 13: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬辰初七(29)	7	8	9	16	18	26	34—28	水
己亥十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木
丙午廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
癸丑廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35—33	木
庚申初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
丁卯十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
甲戌二十(10)	1	5	6	13	19	21	23—20	火
辛巳廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
乙未十一(31)	4	8	13	15	16	24	26—28	金
壬寅十八(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，位置(3)——天干乙之前出现一个变化的明显临界点(同一方向混合生克轨迹对应竟达8次!)，所以“乙”与位置(3)就不会再发生同一方向的相生或相克关系，即乙(木) $\xleftarrow{\text{生}} \text{水}$ ，乙(木) $\xleftarrow{\text{克}} \text{金}$ ，从而位置(3)就可以排除属水的号码[1]和[6]，以及属金的号码[4]和[9]了。

[说明]

上述产生的同一方向混合生克轨迹达8次，乃是“破记录”之

次数,这种情况极罕见,在平时的预测推算过程中,彩民们仍可以按6—7次的“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别该类变化状态的明显临界点。

例 14:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

己酉	廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—	17	土	[金、水]	[癸卯、乙卯]
丙辰	初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	土	[金、水]	[庚戌、壬戌]
癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	水	[土、火]	[丁巳、乙巳]
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	土	[金、水]	[甲子、丙子]
丁丑	廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36	—	4	水	[土、火]	[辛未、己未]
甲申	初二(18)	5	7	12	20	22	26	29	—	3	水	[土、火]	[戊寅、丙寅]
辛卯	初九(25)	7	12	18	21	28	29	36	—	14	木	[水、土]	[乙酉、己酉]
戊戌	十六(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木	[水、土]	[壬辰、丙辰]

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,位置(7)——天干丙之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的混合生克轨迹对应达6次),所以“丙”与位置(7)就不会再发生同一方向的相生或相克关系,即土 $\xleftarrow{\text{生}} \text{⊗}$ (火)丙,金 $\xleftarrow{\text{克}} \text{⊗}$ (火)丙,从而位置(7)就可以排除属土的号码[5]和[0];以及属金的号码[4]和[9]了。

例 15:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬申	十五(9)	3	17	23	26	30	35	36	— 28	金 [火、木]	[丙寅、庚寅]
己卯	廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33	— 10	土 [金、水]	[癸酉、乙酉]
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	— 8	土 [金、水]	[庚辰、壬辰]
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	— 19	水 [土、水]	[丁亥、乙亥]
庚子	十四(6)	5	7	10	12	25	32	36	— 29	土 [金、水]	[甲午、丙午]
丁未	廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	— 26	水 [土、火]	[辛丑、己丑]
甲寅	廿八(20)	14	22	24	27	29	34	35	— 8	水 [土、火]	[戊申、丙申]
辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	— 30	木 [水、土]	[乙卯、己卯]
戊辰	十二(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	木 [水、土]	[壬戌、丙戌]
乙亥	十九(13)	(未开奖, 需预测)								火 [木、金]	[己巳、辛巳]

——如上图箭头所示的斜线对应，位置(7)——天干己之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的生克关系混合轨迹达7次)，所示“己”与位置(7)就不会再发生同一方向的相生或相克关系，即金 $\xleftarrow{\text{⊗}}$ 己(土)，水 $\xleftarrow{\text{⊗}}$ 己(土)，从而位置(7)就可以排除属金的号码[4]和[9]，以及属水的号码[1]和[6]了。

例 16:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....									
辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32—30	木 [水、土] [乙卯、己卯]
戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23—30	木 [水、土] [壬戌、丙戌]
乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36—3	火 [木、金] [己巳、辛巳]
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35—28	木 [水、土] [丙子、庚子]
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	火 [木、金] [癸未、乙未]
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	火 [木、金] [庚寅、壬寅]
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	金 [火、木] [丁酉、辛酉]
庚戌	廿四(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金 [火、木] [甲辰、戊辰]

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，位置(4)——天干庚之前出现一个变化的较明显临界点(对称的来回方向生或克关系达3次)，所以“庚”与位置(4)就不会再生产对称的来回方向的相生或相克关系，即庚(金) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 火，庚(金) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 土，从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7]，以及属土的号码[5]和[0]了。

例 17: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊辰初五(11)	3	11	16	21	22	29	33 — 19	木
乙亥十二(18)	8	9	10	11	18	19	24 — 1	火
壬午十九(25)	3	7	8	18	24	25	29 — 1	木
己丑廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23 — 34	火
丙申初四(8)	4	10	17	22	25	28	34 — 9	火
癸卯十一(15)	3	4	12	14	23	30	36 — 11	金
庚戌十八(22)	7	20	22	23	28	30	33 — 17	金
丁巳廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29 — 26	土
甲子初二(7)	1	5	6	19	20	23	35 — 11	金
辛未初九(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) — (8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，位置(6)——天干甲之前出现一个变化的较明显临界点(对称的来回方向生或克关系达3次)，所以“甲”与位置(6)就不会再产生对称的来回方向的相生或相克关系，即：甲(木) $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 火，甲(木) $\xrightarrow{\text{克}\otimes}$ 土，从而位置(6)就可以排除属火的号码[2]和[7]，以及属土的号码[5]和[0]了。

例 18: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 10 位的号码等距离环环相比系统:

.....

辛亥	廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27	—11	金
辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	—30	木
戊午	初一(26)	1	10	15	21	24	30	35	—12	火
戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23	—30	木
乙丑	初八(2)	5	13	23	27	28	30	35	—19	金
乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36	—3	火
壬申	十五(9)	3	17	23	26	30	35	36	—28	金
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—28	木
己卯	廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33	—10	土
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	—4	火
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	—8	土
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	—19	火
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	—19	水
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36	—2	金
庚子	十四(6)	5	7	10	12	25	32	36	—29	土
庚戌	廿四(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	金(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，天干庚——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向混合轨迹来回已达3次)，所以天干庚与位置(4)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应，即：庚(金) $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 木，庚(金) $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 水，从而位置(4)就可以排除属木的号码[3]和[8]，以及属水的号码[1]和[6]了。

[重要说明]

1. 当位置号码与标准参照系各信息载体(如天干)进行生克关系的对应时,一定要高度重视其对应关系的方向。即是“方向”就是对应关系,“方向”就是五行属性,“方向”就是号码。

2. 上述举例虽然以正常顺序下的总系统的资料、数据进行举例,但其预测推算的方式及其方法在其他各个适用的分系统中均是相通的,一致的。

3. 若干对两者间进行相生或相克或相刑关系的轨迹对应过程而形成的“方向”以及“次数”,就是识别变化状态的临界点的重要依据。在检索和寻找变化状态的明显或较明显临界点的过程中,必须按部就班,逐个位置地和逐项地进行生克(含相刑)关系的对应,以免产生“混乱”或“遗漏”。比如可先平行对应,后斜线对应。

二、地支——位置号码生克轨迹对应预测法:

就是指开奖日的地支(包括相冲资料的地支)与系统内各个位置号码间,若干对在同等位置进行的生克关系对应的预测法。通过记录若干对两者间在对应过程中形成的生克关系(包括相刑)的次数与方向,确认该变化状态的临界点,根据临界点变化前后的一不样性从而达到预测推算的目的。


(一) 选定适用的系统:总系统、干支系统、纳音系统、农历系统、新历系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

(二) 检索和找出:识别地支——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准:

①地支——位置号码进行相生相克关系对应时,同一方向的相生或相克或相刑为:3—4次;

②地支——位置号码进行相生相克关系对应时,同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为:6—7次;

③地支——位置号码进行相生相克关系对应时,混合轨迹对应的方向来回达:3—4次,即:



(注:只考虑方向及次数,不考虑是否相生和相克。)

(三)搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点,以上述制定的标准去衡量对比;当然具体问题还须具体分析。原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码,同一预测内容,必须坚持“事应过三”验证法则,最后综合各项的初步预测结果得出最终的预测结论。原则是:必须保证预测结论是准确的。

例 1:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰初三(21) 13 15 19 21 25 28 32 — 30 土

癸亥初十(28) 3 15 18 25 26 27 32 — 8 水

└──────────────────┐
 克 ↑

庚午十七(4) 7 21 25 26 28 32 34 — 31 土

└──────────────────┐
 克 ↑

丁丑廿四(11) 10 14 15 18 21 31 36 — 4 水

└──────────────────┐
 克 ↑

甲申初二(18) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8) 水

└──────────────────┐
 ⊗ ↑

(未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上图箭头所示的平行对应，地支申——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达3次)，所以，“申”与位置(7)就不会再产生同一方向的相克关系，即：申(金) $\xrightarrow{\text{克}\otimes}$ 木，从而位置(7)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

例 2:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31	土
戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	—	7	土
乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2	水
壬辰	初七(29)	7	8	9	16	18	26	34	—	28	水
己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木
丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34	—	13	水
癸丑	廿八(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木

(注:其他资料略)

——如上图箭头所示的斜线对应，地支午——位置(2)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相克关系已达4次)，所以“午”与位置(2)就不会再产生同一方向的相克关系，即：午(火) $\xrightarrow{\text{克}\otimes}$ 金，从而位置(2)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例 3:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

己酉	廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—	17	土
丙辰	初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	土
癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	水
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	土
丁丑	廿四(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水
甲申	初二(18)	(未开奖,需预测)									水

(注:其他资料略)

——如上图箭头所示的斜线对应，地支申——位置(5)之前出现一个变化的较明显临界点（同一方向的相克关系已达3次），所以，“申”与位置(5)就不会再产生同一方向的相生关系，即：申(金)← $\textcircled{\otimes}$ 火，从而位置(5)就可以排除属火号码[2]和[7]了。

例4:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬寅 _{十八(7)}	5	20	22	25	26	32	34	—16	金
己酉 _{廿五(14)}	2	6	9	15	29	32	36	—17	土
丙辰 _{初三(21)}	13	15	19	21	25	28	32	—30	土
癸亥 _{初十(28)}	3	15	18	25	26	27	32	—8	水
庚午 _{十七(4)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，地支午——位置(5)之前出现一个较明显临界点（相刑关系已达3次），所以“午”与位置(5)就不会再产生相刑的关系，即午(火)← $\textcircled{\otimes}$ 火，从而位置(5)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例5:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛酉 _{初五(27)}	10	18	19	22	23	26	32	—30	木
戊辰 _{十二(6)}	1	2	5	7	17	19	23	—30	木
乙亥 _{十九(13)}	11	14	15	22	28	33	36	—3	火
壬午 _{廿六(20)}	1	5	6	9	15	33	35	—28	木
己丑 _{初三(27)}	5	6	12	21	30	31	35	—4	火
丙申 _{初十(3)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	火(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，地支丑——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑已达3次)，所以“丑”与位置(3)就不会再产生相刑的关系，即丑(土) $\xleftarrow{\text{刑} \otimes}$ 土，从而位置(3)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

例6:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—	28	木	
丁酉	初十(5)	2	3	刑	10	18	19	22	30	—	25	火
甲辰	十七(12)	8	10	刑	13	19	20	21	36	—	12	火
辛亥	廿四(19)	1	16	刑	17	18	19	22	27	—	11	金
戊午	初一(26)	1	10	刑	15	21	24	30	35	—	12	火
乙丑	初八(2)	(1)	(2)	刑	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金
壬申	十五(9)	(未开奖,需预测)									金	

——如上图箭头所示的斜线对应，地支申——位置(7)之前出现一个变化的明显临界点(相刑已达4次)，所以“申”与位置(7)就不会再产生相刑的关系，即申(金) $\xleftarrow{\text{刑} \otimes}$ 金，从而位置(7)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例7:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金
戊子	初四(24)	3	12	15	16	17	33	35	—	8	火
乙未	十一(31)	4	8	13	15	16	24	26	—	28	金
壬寅	十八(7)	5	20	22	25	26	32	34	—	16	金
己酉	廿五(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,地支酉——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达3次),所以,“酉”与位置(6)就不会再产生同一方向的相生关系,即:酉(金) $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 水,从而位置(6)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 8:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛卯初二(1) 10 18 25 26 32 33 36 — 2 木

戊戌初九(8) 6 8 10 13 25 32 36 — 22 木

乙巳十六(15) 2 6 11 14 21 31 34 — 26 火

壬子廿三(22) 1 3 7 17 18 21 27 — 20 木

己未初一(29) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8) 火(未开奖,需预测)

丙寅初八(5)

——如上图箭头所示的斜线对应,地支寅——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达3次),所以,“寅”与位置(4)就不会再产生同一方向的相生关系,即:寅(木) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 水,从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 9:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑廿一(25) 8 16 17 22 27 31 33 — 23 木

庚申廿八(2) 10 13 16 20 28 29 34 — 25 木

丁卯初六(9) 5 14 18 21 31 34 35 — 10 火

甲戌十三(16) 6 12 19 20 22 24 28 — 35 火

辛巳廿七(23) 2 6 16 17 18 29 30 — 19 金

戊子二十(23) 3 14 21 22 23 27 29 — 32 火

乙未初五(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8) 金(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,地支子——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达4次),所以,“子”与位置(1)就不会再产生同一方向的相生关系,即:子(水) $\xleftarrow{\text{生}} \otimes$ 金,从而位置(1)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例 10:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32—30	木	[水、土]	[乙卯、己卯]
戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23—30	木	[水、土]	[壬戌、丙戌]
								$\xrightarrow{\text{克}}$			
乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36—3	火	[木、金]	[己巳、辛巳]
								$\xrightarrow{\text{克}}$			
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35—28	木	[水、土]	[丙子、庚子]
								$\xrightarrow{\text{克}}$			
己丑	初三(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火	[木、金]	[癸未、乙未]
								$\xrightarrow{\otimes \text{克}}$			

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,相冲资料的地支未——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达3次),所以“未”与位置(7)就不会再产生同一方向的相克关系,即:木 $\xrightarrow{\text{克}} \otimes$ 未(土),从而位置(7)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

例 11:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

											开奖日的相冲资料
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—26	土	[金、水]	[辛亥、癸亥]
甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24—10	金	[火、木]	[戊午、壬午]
				$\xrightarrow{\text{生}}$							
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36—31	土	[金、水]	[乙丑、丁丑]
				$\xrightarrow{\text{生}}$							
戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27—7	土	[金、水]	[壬申、甲申]
				$\xrightarrow{\text{生}}$							
乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35—2	水	[土、火]	[己卯、丁卯]
				$\xrightarrow{\otimes \text{生}}$							
壬辰	初七(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水	[土、火]	[丙戌、甲戌]

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的地支卯——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达3次)，所以“卯”与位置(2)就不会再产生同一方向的相生关系，即：水 $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 卯(木)，从而位置(2)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 12: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

壬戌	初五(31)	3	14	25	28	30	32	34	—26	水	[土、火]	[丙辰、甲辰]
己巳	十二(7)	3	4	5	6	7	10	23	—33	木	[水、土]	[癸亥、丁亥]
丙子	十九(14)	1	3	14	19	24	28	30	—20	水	[土、火]	[庚午、戊午]
癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	—18	木	[水、土]	[丁丑、辛丑]
庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—28	木	[水、土]	[甲申、戊申]
丁酉	初十(5)	2	3	10	18	19	22	30	—25	火	[木、金]	[辛卯、癸卯]
甲辰	十七(12)	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)	—(8)							火	[木、金]	[戊戌、庚戌]

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的地支卯——位置(3)之前出现一个变化的明显临界点，(同一方向的相生关系已达4次)，所以“卯”与位置(3)就不会再产生同一方向的相生关系，即水 $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 卯(木)，从而位置(3)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 13: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	—10	金	[火、木]	[戊午、壬午]
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—31	土	[金、水]	[乙丑、丁丑]

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的地支未——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系轨迹对应已达5次)，所以“未”与位置(1)就不会再发生相刑关系，即土 $\xleftarrow{\text{刑} \otimes}$ 未(土)，从而位置(1)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

上述相刑关系轨迹对应竟达 5 次, 这种情况极为罕见。当这“最高记录”不幸出现时, 则只能作偶然失误计, 可忽略。因为绝大多数情形下产生变化的明显或较明显临界点的标准: 3—4 次。99%, 放弃 1%, 在所难免。

• • • • •

辛巳	二十(23)	2	6	16	17	18	29	30	—	19	金	[火、木]	[乙亥、己亥]
戊子	廿七(30)	3	14	21	22	23	27	29	—	32	火	[木、金]	[壬午、丙午]
乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34	—	5	金	[火、木]	[己丑、癸丑]
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31	—	25	金	[火、木]	[丙申、庚申]
己酉	十九(20)	3	4	6	22	23	33	36	—	29	土	[金、水]	[癸卯、乙卯]
丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24	—	32	土	[金、水]	[庚戌、壬戌]
癸亥	初三(4)	7	9	11	14	19	21	32	—	36	水	[土、火]	[丁巳、乙巳]
庚午	初十(11)	10	17	19	24	27	33	35	—	7	土	[金、水]	[甲子、丙子]
丁丑	十七(18)	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8)	水 [土、水] [辛未、己未]										

(未开奖, 需预测)

——上图箭头所示的平行对应,地支丑——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹已达7次),所以“丑”与位置(1)就不会再产生同一方向的相生或相克关系的轨迹对应,即:丑(土) $\xrightarrow{\text{克}\otimes}$ 水,丑(土) $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 金,从而位置(1)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属金的号码[4]和[9]了。

例 15: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36	— 11 金
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33	— 17 金
				生					
丁巳	廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29	— 26 土
				克					
甲子	初二(7)	1	5	6	19	20	23	35	— 11 金
				生					
辛未	初九(14)	2	5	9	21	25	28	32	— 31 土
				生					
戊寅	十六(21)	6	10	22	23	28	33	34	— 3 土
				生					
乙酉	廿三(28)	3	8	11	16	18	20	28	— 6 水
				克					
壬辰	三十(4)	1	11	12	15	21	26	28	— 27 水
				生或克					
己亥	初七(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8) 木 (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,地支辰——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹已达6次),所以“辰”与位置(3)就不会再产生同一方向的相生或相克关系的轨迹对应,即:辰(土) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 火,辰(土) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 木,从而位置(3)就可以排除属火的号码[2]和[7],以及属木的号码的[3]和[8]了。

例 16: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
甲戌	廿十(10)	1	5	6	13	19	21	23—20	火
辛巳	廿七(17)	8	9	14	生 20	22	29	31—32	金
戊子	初四(24)	3	12	15	克 16	17	33	35—8	火
乙未	十一(31)	4	8	13	克 15	16	24	26—28	金
壬寅	十八(7)	5	20	22	克 25	26	32	34—16	金
己酉	廿五(14)	2	6	9	生 15	29	32	36—17	土
丙辰	初三(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土 (未开奖,需预测)
癸亥	初十(28)	(未开奖,需预测)							

——如上图箭头所示的斜线对应,地支亥——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹已达6次),所以“亥”与位置(6)就不会再产生同一方向的相生或相克关系的轨迹对应,即:亥(水) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 土,亥(水) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 金,从而位置(6)就可以排除属土的号码[5]和[0],以及属金的号码[4]和[9]了。

例 17:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳	二十(23)	2	6	16	17	18	29	30—19	金 [火、木] [乙亥、己亥]
戊子	廿七(30)	3	14	21	22	23	27	29—32	火 [木、金] [壬午、丙午]
乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34—5	金 [火、木] [己丑、癸丑]
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31—25	金 [火、木] [丙申、庚申]
己酉	十九(20)	3	4	6	22	23	33	36—29	土 [金、水] [癸卯、乙卯]
丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土 [金、水] [庚戌、壬戌]

癸亥_{初三(4)} 7 9 11 14 19 21 32 — 36 水 [土、火] [丁巳、乙巳]
 庚午_{初十(11)} 10 17 19 24 27 33 35 — 7 土 [金、水] [甲子、丙子]
 丁丑_{十七(18)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8) 水 [土、水] [辛未、己未]
 (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,位置(1)——地支丑之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向生和克混合轨迹达 7 次), 所以“丑”与位置(1)就不会再产生同一方向的相生或相克关系, 即: 丑(土) $\xrightarrow{\text{克}} \text{水}$, 丑(土) $\xrightarrow{\text{生}} \text{金}$, 从而位置(1)就可以排除属水的号码[1]和[6], 以及属金的号码[4]和[9]了。

例 18: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 10 位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	甲寅 _{廿八(20)}	14	22	24	27	29	34	35	— 8 水
	甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24	— 10 金
{	辛酉 _{初五(27)}	10	18	19	22	23	26	32	— 30 木
	辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36	— 31 土
{	戊辰 _{十二(6)}	1	2	5	7	17	19	23	— 30 木
	戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27	— 7 土
{	乙亥 _{十九(13)}	11	14	15	22	28	33	36	— 3 火
	乙酉 _{三十(22)}	10	15	18	19	21	26	35	— 2 水
{	壬午 _{廿六(20)}	1	5	6	9	15	33	35	— 28 木
	壬辰 _{初七(29)}	7	8	9	16	18	26	34	— 28 水

{	己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	火
	己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木
{	丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	火
	丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
{	癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	金
	癸丑	廿八(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,地支卯——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹对应已达6次),所以地支卯与位置(4)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应,即:卯(木) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 水,卯(木) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 金,从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属金的号码[4]和[9]了。

例 19: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

• • • • •

己卯 廿二(16) 6 14 17 24 25 30 33 — 10 土 [金、水] [癸酉、乙酉]

丙戌 廿九(23) 1 4 5 10 26 30 34 — 8 土 [金、水] [庚辰、壬辰]

癸巳 初七(30) 1 4 6 11 13 14 27 — 19 水 [土、火] [丁亥、乙亥]

庚子 十四(6) 5 7 10 12 25 32 36 — 29 土 [金、水] [甲午、丙午]

丁未 廿一(13) 6 16 22 23 31 33 34 — 26 水 [土、火] [辛丑、己丑]

甲寅 廿八(20) 14 22 24 27 29 34 35 — 8 水 [土、火] [戊申、丙申]

辛酉 初五(27) 10 18 19 22 23 26 32 — 30 木 [水、土] [乙卯、己卯]

戊辰 十二(6) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) — (8) 木 [水、土] [壬戌、丙戌]

乙亥 十九(13) (未开奖,需预测) [木、金] [己巳、辛巳]

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的地支巳——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(出现对称的来回方向混合轨迹达3次)，所以“巳”与位置(6)就不会再产生对称的来回方向之混合轨迹，即：木 $\xrightarrow{\text{生}} \text{巳}(\text{火})$ ，水 $\xrightarrow{\text{克}} \text{巳}(\text{火})$ ，从而位置(6)就可以排除属木的号码[3]和[8]，以及属水的号码[1]和[6]。

例 20: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	— 4	火
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	— 19	火
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36	— 2	金
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30	— 34	金
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36	— 26	土
甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	— 10	金
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	— 31	土
戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	— 7	土
乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	— 2	水
壬辰	初七(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	水(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，地支辰——位置(2)之前出现一个变化的明显临界点(出现对称的来回方向混合轨迹竟达4次)，所以“辰”与位置(2)就不会再产生对称的来回方向的混合轨迹，即辰(土) $\xrightarrow{\text{生}} \text{金}$ ，辰(土) $\xrightarrow{\text{克}} \text{水}$ ，从而位置(2)就可以排除属金的号码[4]和[9]，以及属水的号码[1]和[6]了。

[说明]

在正常顺序下的总系统，出现完整的对称的来回方向混合轨

迹达4次是罕见的,绝大多数情形下,产生3次或3次半完整的对称的来回方向混合轨迹往往就是一个变化的较明显临界点。

三、纳音——位置号码生克轨迹对应预测法

就是指开奖日的纳音(包括相冲资料的纳音)与系统内各个位置号码间,若干对在同等位置进行的生克关系对应的预测法。通过记录若干对两者间在对应过程中形成的生克关系(包括相刑)的次数与方向,确认该变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

原则与方法:

(一)选定适用的系统:总系统、干支系统、纳音系统、农历系统、新历系统、等距离排列系统(注:相冲资料中的纳音不适用)和号码等距离环环相比系统。


(二)检索和找出:识别纳音——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准:

①纳音——位置号码进行相生相克(相刑)关系对应时,同一方向的相生或相克或相刑为:

相刑:4—5次; 相生或相克:4—5次。

②纳音——位置号码进行相生相克关系对应时,同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为:6—7次(很少达7次)。

③纳音——位置号码进行相生相克对应时,对称的方向混合轨迹来回达3—4,即:



(注:只考虑方向及次数,不考虑是否相生和相克)

(三)搜索判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比;当然具体问题还须具体分析。原则是:明显者用之,不明显者弃之。

例 1: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音水——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑已达4次)，所以纳音“水”与位置(6)就不会再产生相刑关系的轨迹对应，即：水 $\xleftarrow{\text{刑}} \textcircled{\otimes} \text{水}$ ，从而位置(6)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 2:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

乙未	十一(31)	4	8	13	15	26	24	26	—	28	金
壬寅	十八(7)	5	20	22	25	26	32	34	—	16	金
己酉	廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—	17	土
丙辰	初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	土
癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	水
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	土
丁丑	廿四(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水
甲申	初二(18)										水

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音水——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(相刑已达5次)，所以纳音“水”与位置(4)就不会再产生相刑关系的轨迹对应，即水 $\xleftarrow{\text{刑}} \text{水}$ ，从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例3:广东7/36某阶段中奖号码同名纳音[土]系统:

.....

庚午	初十(11)	10	17	19	24	27	33	35—7	土
丁亥	廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35—33	土
辛丑	十三(10)	12	17	18	22	26	30	33—1	土
戊申	廿十(17)	1	3	17	18	28	30	31—36	土
己卯	廿十(16)	6	14	17	24	25	30	33—10	土
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34—8	土
庚子	十四(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，纳音“土”——位置(6)之前出现一个变化的较明显临点(相刑已达4次)，所以纳音土与位置(6)就不会再产生相刑关系的轨迹对应，即：土 $\xleftarrow{\text{刑}} \text{土}$ ，从而位置(6)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

例4:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—26	土
甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24—10	金
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36—31	土
戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27—7	土
乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35—2	水
壬辰	初七(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，纳音水——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达4次)，所以纳音“水”与位置(4)就不会再产生同一方向的相生关系，即：金 $\xrightarrow{\text{生}}\text{水}$ ，从而(4)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例5:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土
癸亥	初三(4)	7	9	11	14	19	21	$\xrightarrow{\text{生}}$ 32—36	水
庚午	初十(11)	10	17	19	24	27	33	$\xrightarrow{\text{生}}$ 35—7	土
丁丑	十七(18)	3	7	9	12	23	24	$\xrightarrow{\text{生}}$ 36—25	水
甲申	廿四(25)	3	5	12	14	24	28	$\xrightarrow{\text{生}}$ 31—8	水
辛卯	初二(1)	10	18	25	26	32	33	$\xrightarrow{\text{生}}$ 36—2	木
戊戌	初九(8)	6	8	10	13	25	32	$\xrightarrow{\text{生}}$ 36—22	木
乙巳	十六(15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音木——位置(6)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达5次)，所以纳音木与位置(6)就不会再产生同一方向的相生关系的轨迹对应，即：火 $\xleftarrow{\text{克}}\text{木}$ ，从而位置(6)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例6:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬戌	初五(31)	3	14	25	28	30	32	34—26	水[土、火][丙辰、甲辰]
己巳	十二(7)	3	4	5	6	7	10	23—33	木[水、土][癸亥、丁亥]
丙子	十九(14)	1	3	14	19	24	28	30—20	水[土、火][庚午、戊午]
癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33—18	木[水、土][丁丑、辛丑]
庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32—28	木[水、土][甲申、戊申]
丁酉	初十(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火[木、金][辛卯、癸卯]
甲辰	十七(12)	(未开奖,需预测)	\otimes	生					火[木、金][戊戌、庚戌]

——如上图箭头所示的斜线对应, 纳音水——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达4次), 所以纳音木与位置(2)就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即: 木 $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 火, 从而位置(2)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例7: 广东7/36某阶段中奖号码第10位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	壬辰初七(29)	7	8	9	16	18	26	34—28	水
	壬寅十八(7)	5	20	22	25	26	32	34—16	金
{	己亥十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木
	己酉廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36—17	土
{	丙午廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
	丙辰初三(21)	13	15	19	21	25	28	32—30	土
{	癸丑廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35—33	木
	癸亥初十(28)	3	15	18	25	26	27	32—8	水
{	庚申初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
	庚午十七(4)	7	21	25	26	28	32	34—31	土
{	丁卯十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
	丁丑廿四(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水(未开奖, 需预测)

——如上图箭头所示的平行对应, 纳音火——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达4次), 所以纳音火与位置(6)就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即火 $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 土, 从而位置(6)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

■ ◆ ● ◆ ◆ ◆

——如上图箭头所示的平行对应,相冲资料的纳音木——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达4次),所以纳音木与位置(6)就不会再产生同一方向的相克关系,即金 $\xrightarrow[\text{克}]{\text{克}}$ 木,从而位置(6)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

• • • • •

戊子初四(24) 3 12 15 16 17 33 35—8 火 [木、金][壬午、丙午]
乙未十一(31) 4 8 13 15 16 24 26—28 金 [火、木][己丑、癸丑]
壬寅十八(7) 5 20 22 25 26 32 34—16 金 [火、木][丙申、庚申]
己酉廿五(14) 2 6 9 15 29 32 36—17 土 [金、水][癸卯、乙卯]
丙辰初三(21) 13 15 19 21 25 28 32—30 土 [金、水][庚戌、壬戌]
癸亥初十(28) 3 15 18 25 26 27 32—8 水 [土、火][丁巳、乙巳]
庚午十七(4) 7 21 25 26 28 32 34—31 土 [金、水][甲子、丙子]
丁丑廿四(11) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8) 水 [土、火][辛未、己未]
甲申初二(18) (未开奖,需预测) 水 [土、火][戊寅、丙寅]

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的纳音火——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相克关系已达5次)，所以火与位置(4)就不会再产生同一方向的相克关系，即水 $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 火，从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 10: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳二十(23)	2	6	16	17	18	29	30	—19	金[火、木]	[乙亥、己亥]
戊子廿七(30)	3	14	21	22	23	27	29	—32	火[木、金]	[壬午、丙午]
乙未初五(6)	6	7	17	27	30	33	34	—5	金[火、木]	[己丑、癸丑]
丙子十九(14)	1	3	14	19	24	28	30	—20	水[土、火]	[庚午、戊午]
癸未廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	—18	木[水、土]	[丁丑、辛丑]
庚寅初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—28	木[水、土]	[甲申、戊申]
丁酉初十(5)	2	3	10	18	19	22	30	—25	火[木、金]	[辛卯、癸卯]
甲辰十七(12)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	水[木、金]	[戊戌、庚戌]

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，相冲资料的纳音金——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相克关系已达5次)，所以，纳音金与位置(4)就不会再产生同一方向的相克关系，即：火 $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 金，从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 11: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛亥廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27	—11	金[火、木]	[乙巳、己巳]
戊午初一(26)	1	10	15	21	24	30	35	—12	火[木、金]	[壬子、甲子]
乙丑初八(2)	5	13	23	27	28	30	35	—19	金[火、木]	[己未、癸未]
壬申十五(9)	3	17	23	26	30	35	36	—28	金[火、木]	[丙寅、庚寅]

己卯 廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33	—10	土	[金、水]	[癸酉、乙酉]
丙戌 廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	—8	土	[金、水]	[庚辰、壬辰]
癸巳 初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	—19	水	[土、火]	[丁亥、乙亥]
庚子 十四(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	土	[金、水]	[甲午、丙午]
丁未 廿一(13)									水	[土、火]	[辛丑、己丑]

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音水——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向来回混合轨迹已达3次)，所以纳音水与位置(2)就不会再产生来回对称的方向混合轨迹对应，即土 $\xrightarrow{\text{克}}\text{水}$ ，或金 $\xrightarrow{\text{生}}\text{水}$ ，从而位置(2)就可排除属土的号码[5]和[0]，以及属金的号码[4]和[9]了。

例 12: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲戌 二十(10)	1	5	6	13	19	21	31	—	20	火
辛巳 廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金
戊子 初四(24)	3	12	15	13	17	33	35	—	8	火
乙未 十一(31)	4	8	13	15	16	24	26	—	28	金
壬寅 十八(7)	5	20	22	25	26	32	34	—	16	金
己酉 廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—	17	土
丙辰 初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	土
癸亥 初十(28)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水
庚午 十七(4)										土

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音土——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向来回混合轨迹已达

3次),所以纳音土与位置(3)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即金 $\xleftarrow{\text{生}}\text{土}$,水 $\xleftarrow{\text{克}}\text{土}$,从而位置(3)就可以排除属金的号码[4]和[9],以及属水的号码[1]和[6]了。

例 13:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35—33	木
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23—20	火
辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
戊子	初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
乙未	十一(31)	4	8	13	15	16	24	26—28	金
壬寅	十八(7)	5	20	22	25	26	32	34—16	金
己酉	廿五(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,纳音土——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹对应已达7次),所以纳音土与位置(4)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应,即:火 $\xrightarrow{\text{生}}\text{土}$,或木 $\xrightarrow{\text{克}}\text{土}$,从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7],以及属木的号码[3]和[8]了。

例 14:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	火
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	金
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30—34	金

丁巳初二(24)	3	8	7	20	25 _克	31	36	—	26	土
甲子初九(1)	1	8	15	15	12 _克	20	24	—	10	金
辛未十六(8)	4	8	10	12	23 _生	29	36	—	31	土
戊寅廿三(15)	8	12	16	17 _{⊗生或克}	20	25	27	—	7	土
乙酉卅十(22)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土
壬辰初七(29)	(未开奖,需预测)									水

如上图箭头所示的斜线对应, 纳音水——位置 (1) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相克和相生混合轨迹已达 5 次), 所以位置 (1) 与纳音水就不会再产生同一方向的相生或相克混合轨迹对应, 即: 木 $\xleftarrow{\text{生}}\text{⊗}\text{水}$, 火 $\xleftarrow{\text{克}}\text{⊗}\text{水}$, 从而位置 (1) 就可以排除属木的号码 [3] 和 [8], 以及属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 15: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸卯十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—	2	金	[火、木][丁酉、辛酉]
庚戌廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30—	34	金	[火、木][甲辰、戊辰]
丁巳初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—	26	土	[金、水][辛亥、癸亥]
甲子初九(1)	1	8	11	15	17	20	24—	10	金	[火、木][戊午、壬午]
辛未十六(8)	4	8	10	12	23	29	36—	31	土	[金、水][乙丑、丁丑]
戊寅廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27—	7	土	[金、水][壬申、甲申]
乙酉三十(22)	10	15	18	19	21	26	35—	2	水	[土、火][己卯、丁卯]
壬辰初七(29)	7	8	9	16	18	26	34—	28	水	[土、火][丙戌、甲戌]
己亥十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—	2	木	[水、土][癸巳、丁巳]
丙午廿一(12)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—	(8)	水	[土、火][庚子、戊子]

——如上图箭头所示的斜线对应，纳音水——位置(8)之前出现一个变化的明显临界点，(同一方向的相生和相克混合轨迹已达7次)，所以位置(8)与纳音水就不会再产生同一方向的相生或相克混合轨迹对应，即： $\text{土} \xrightarrow{\text{克}} \text{水}$ ， $\text{金} \xrightarrow{\text{生}} \text{水}$ ，从而位置(8)就可以排除属土的号码[5]和[0]，以及属金的号码[4]和[9]了。

例 16: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

乙未 _{十一(31)}	4	8	13	15	16	24	26	—	28	金	[火、木]	[己丑、癸丑]
壬寅 _{十八(7)}	5	20	22	25	26	32	34	— 克	16	金	[火、木]	[丙申、庚申]
己酉 _{廿五(14)}	2	6	9	15	29	32	36	— 克	17	土	[金、水]	[癸卯、乙卯]
丙辰 _{初三(21)}	13	15	19	21	25	28	32	— 克	30	土	[金、水]	[庚戌、壬戌]
癸亥 _{初十(28)}	3	15	18	25	26	27	32	— 克	8	水	[土、火]	[丁巳、乙巳]
庚午 _{十七(4)}	7	21	25	26	28	32	34	— 克	31	土	[金、水]	[甲子、丙子]
丁丑 _{廿四(11)}	10	14	15	18	21	31	36	— 生	4	水	[土、火]	[辛未、己未]
甲申 _{初二(18)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— ⊗生或克	(8)	水	[土、火]	[戊寅、丙寅]
辛卯 _{初九(25)}	(未开奖,需预测)									木	[水、土]	[乙酉、己酉]

——如上图箭头所示的斜线对应，位置(4)——纳音土之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克和相生的混合轨迹已达6次)，所以位置(4)与纳音土就不会再产生同一方向的相生或相克的混合轨迹对应，即： $\text{火} \xrightarrow{\text{生}} \text{土}$ ， $\text{木} \xrightarrow{\text{克}} \text{土}$ ，从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7]，以及属木的号码[3]和[8]了。

[说明]

在上述例 16 的同一方向的相克和相生的混合轨迹对应中，可发现其中同一方向的相克关系轨迹对应竟达 5 次，这种情形较

少见。

坚持 99% 的正确性(指产生变化的明显或较明显临界点之次数), 放弃 1% 的偶然失误, 是一种合理而实际的预测推算策略。

例 17: 广东 7/36 某阶段中奖号码同名纳音[土]系统:

.....

丁巳	廿五(29)	9	14	22	25	27	28	29—26	土
								克	
辛未	初九(14)	2	5	9	21	25	28	32—31	土
								克	
戊寅	十六(21)	6	10	22	23	28	33	34—3	土
								克	
己酉	十九(20)	3	4	6	22	23	33	36—29	土
								克	
丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土
								生	
庚午	初十(11)	10	17	19	24	27	33	35—7	土
								克	
丁亥	廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35—33	土
								克	
辛丑	十三(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土
								生或克	

(注: 其他资料略)

(未开奖, 需预测)

——如上图箭头所示的平行对应, 纳音土——位置(6)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克的混合轨迹对应已达 7 次), 所以纳音土与位置(6)就不会再产生同一方向的相克或相生关系轨迹对应, 即火 $\xrightarrow{\text{生}} \text{土}$, 木 $\xrightarrow{\text{克}} \text{土}$, 从而位置(6)就可以排除属火的号码[2]和[7], 以及属木的号码[3]和[8]了。

四、农历尾数——位置号码生克轨迹对应预测法、

所谓农历尾数或新历尾数或相冲岁数（尾数）——位置号码生克轨迹对应预测法，就是指开奖日的农历/新历/相冲岁数/尾数与系统内各个位置号码间，若干对在同等位置进行的生克关系对应的预测法。这三种预测法均是标准参照系的信息载体尾数与号码尾数之间进行生克关系的对应。通过记录若干对两者间在对应过程中形成的生克关系（包括相刑）的次数与方向，确认该变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性，从而达到预测推算的目的。


原则与方法：

(一) 选定适用的系统: 总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

(二) 检索和找出：识别农历尾数或新历尾数或相冲岁数(尾数)——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”之标准：

①农历尾数或新历尾数或相冲岁数（尾数）与位置号码进行相生相克（相刑）关系对应时，同一方向的相生或相克为：4—5次，相刑：3—4次；

②农历尾数或新历尾数或相冲岁数（尾数）与位置号码进行相生相克关系对应时，对称的方向混合轨迹来回达 3—4 次，即：



(注:只考虑方向及次数,不考虑是否相生和相克)

③农历尾数或新历尾数或相冲岁数(尾数)与位置号码进行相生相克关系(不含相刑)对应时,同一方向的相生和相克混合轨迹轨迹为:6—7次。

(三)搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比;当然具体问题具体分析。原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码同一预测内容,必须坚持“事应过三”验证法则,最后综合各项的初步测结果得出最终的结论。原则是:必须保证预测结论是准确的。

例 1: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸巳初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	—	19	水
庚子十四(6)	5	7	10	12	25	32	36	—	29	土
丁未廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	—	26	水
甲寅廿八(20)	14	22	24	27	29	34	35	—	8	水
辛酉初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	—	30	木
戊辰十二(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,农历十二(尾数)——位置(8)之前出一个变化的明显临界点(相刑关系轨迹对应已达4次),所以农历十二与位置(8)就不会再产生相刑关系,即十二(火)← 刑 →火,从而位置(8)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 2: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳	二十(23)	2	6	16	17	18	29	30—19	金	
戊子	廿七(30)	3	刑	14	21	22	23	27	29—32	火
乙未	初五(6)	6	刑	7	17	27	30	33	34—5	金
壬寅	十二(13)	7	刑	11	14	15	20	29	31—25	金
己酉	十九(20)	3	刑	4	6	22	23	33	36—29	土
丙辰	廿六(27)	1	刑	8	13	19	20	22	24—32	土
癸亥	初三(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水 (未开奖,需预测)	

——如上图箭头所示的斜线对应,农历廿六(尾数)——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系轨迹对应已达4次),所以农历廿六与位置(4)就不会再产生相刑关系,即廿六(水) $\xrightarrow[\text{刑}]{\text{刑}}$ 水,从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例3:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....


戊子	廿七(30)	3	14	21	22	23	27	29—32	火
乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34—5	金
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31—25	金
己酉	十九(20)	3	4	6	22	23	33	36—29	土
丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土
癸亥	初三(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水 (未开奖,需预测)
庚午	初十(11)								


——如上图箭头所示的斜线对应,农历初十(尾数)——位置(3)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系轨迹对应已达4次),所以农历初十与位置(3)就不会再产生相刑关系,即:初十(土) $\xrightarrow[\text{刑}]{\text{刑}}$ 土,从而位置(3)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。


例4:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:


.....

辛未_{十六(8)} 4 8 10 12 23 29 36—31 土

戊寅_{廿三(15)} 8 12 16 17 20 25 27—7 土


乙酉_{卅十(22)} 10 15 18 19 21 26 35—2 水


壬辰_{初七(29)} 7 8 9 16 18 26 34—28 水



己亥_{十四(5)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 木 (未开奖,需预测)


——如上图箭头所示的平行对应,农历十四(尾数)——位置(1)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系轨迹对应已达3次),所以农历十四与位置(1)就不会再产生相刑关系,即:十四(金) $\xrightarrow[\text{刑}]{\text{金}}$ 金,从而位置(1)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例5: 广东7/36某阶段中奖号码第12位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	乙亥 _{十九(13)}	11	14	15	22	28	33	36—3	火
	己亥 _{十四(5)}	1	11	12	23	26	28	31—2	木
{	壬午 _{廿六(20)}	1	5	6	9	15	33	35—28	木
	丙午 _{廿一(12)}	4	12	17	20	22	24	34—13	水
{	己丑 _{初三(27)}	5	6	12	21	30	31	35—4	火
	癸丑 _{廿八(19)}	3	6	8	20	27	28	35—33	木
{	丙申 _{初十(3)}	2	6	7	11	12	17	23—19	火
	庚申 _{初六(26)}	4	9	10	29	33	34	35—3	木
{	癸卯 _{十七(10)}	3	14	15	28	32	34	36—2	金
	丁卯 _{十三(3)}	3	5	27	28	30	31	36—34	火
{	庚戌 _{廿四(17)}	6	11	12	18	19	27	30—34	金
	甲戌 _{二十(10)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火 (未开奖,需预测)



——如上图箭头所示的斜线对应,位置(3)——农历廿四(尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系轨迹对应已达3次),所以位置(3)与农历廿四就不会再产生相刑关系,即廿四(金) $\xleftarrow{\text{刑}} \text{金}$,从而位置(3)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例6:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35	—8	火
乙未十一(31)	4	8	13	15	16	24	26	—28	金
壬寅十八(7)	5	20	22	25	26	32	34	—16	金
己酉廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—17	土
丙辰初三(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,农历初三(尾数)——位置(3)之前出现一个变化的疑点(同一方向的相生关系仅达3次),所以,农历初三与位置(3)会不会再产生同一方向的相生关系,即初三(木) $\xleftarrow{\text{生}} \text{水}$,则还应结合其它预测方式的结果再作最终的取舍。这称为“明显者用之,不明显者弃之。”

例7:广东7/36某阶段中奖号码同名纳音[木]系统:

.....

辛卯初二(1)	10	18	25	26	32	33	36	—2	木
戊戌初九(8)	6	8	10	13	25	32	36	—22	木
壬子廿三(22)	1	3	7	17	18	21	27	—20	木
己巳十二(7)	3	4	5	6	7	10	23	—33	木
癸未廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	—18	木
庚寅初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—28	木
辛酉初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	—30	木
戊辰十二(6)	1	2	5	7	17	19	23	—30	木
壬午廿六(20)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	木(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应, 农历廿六(尾数)——位置(3) 出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系竟达6次!), 所以农历廿六与位置(3) 就不会再产生同一方向的相生关系, 即廿六(水) $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{生}}$ 木, 从而位置(3) 就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

[说明]

在同名纳音系统中(或其它分系统中), 开奖日农历尾数与位置号码间极少有机会出现同一方向相生或相克关系达6次才产生一个变化的明显临界点。这种情况下的临界点可依具体问题具体分析地采用。要么坚持(平时的大多数)原则, 要么放弃(极少数、偶然出现的)1%。

例8: 广东7/36某阶段中奖号码第10位号码等距离环环相比系统:

.....

{	己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	火
	己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木
{	丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	火
	丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
{	癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	金
	癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35—33	木
{	庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30—34	金
	庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
{	丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—26	土
	丁卯	十三(24)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,农历初二——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系轨迹对应已达3次),所以农历初二与位置(3)就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应,即:初二(火) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 木,从而位置(3)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。上述的“3次”临界点之识别就是具体问题具体分析的结果。

例9:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33—1	土
戊申二十(17)	1	3	17	18	28	30	31—36	土
乙卯廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33—35	水
壬戌初五(31)	3	14	25	28	30	32	34—26	水
己巳十二(7)	3	4	5	6	7	10	23—33	木
丙子十九(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	水(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,农历十九(尾数)——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达4次),所以位置(4)与农历十九就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应,即十九(金) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 火,从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例10:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰初三(21)	13	15	19	21	25	28	32—30	土
癸亥初十(28)	3	15	18	25	26	27	32—8	水
庚午十七(4)	7	21	25	26	28	32	34—31	土
丁丑廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36—4	水

甲申	初二(18)	5	7	12	20 _克	22	26	29	—	3	水
辛卯	初九(25)	7	12	18	21 _克	28	29	36	—	14	木
戊戌	十六(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,农历初九——位置(8)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达4次),所以农历初九与位置(8)就不会再产生同一方向的相克关系,即初九(金) $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 木,从而位置(8)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

例 11:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35	—	33	木
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火
甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	火
辛巳	廿七(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金
戊子	初四(24)										火

——如上图箭头所示的斜线对应,农历初四——位置(1)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系仅达3次),所以农历初四与位置(1)就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应,即:初四(金) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 火,从而位置(1)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。这例子也是灵活运用“临界点次数”的举证。

[说明]

在广东的 7/36 之正常顺序下的总系统中,大多数时候,同一方向的相生或相克或相刑关系轨迹对应达 3 次时,往往就是一个

(真正的)临界点。

例 12: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬申 _{十五(9)}	3	17	23	26	30	35	36—28	金
己卯 _{廿二(16)}	6	14	17	24	25	30	33—10	土
丙戌 _{廿九(23)}	1	4	5	10	26	30	34—8	土
癸巳 _{初七(30)}	1	4	6	11	13	14	27—19	水
庚子 _{十四(6)}	5	7	10	12	25	32	36—29	土
丁未 _{廿一(13)}	6	16	22	23	31	33	34—26	水
甲寅 _{廿八(20)}	14	22	24	27	29	34	35—8	水
辛酉 _{初五(27)}	10	18	19	22	23	26	32—30	木
戊辰 _{十二(6)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金 (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应, 农历十二(尾数)——位置(6)之前出现一个变化的明显临界点(对称的方向混合轨迹来回已3次), 所以位置(6)与农历十二就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应, 即: 十二(火) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 水, 十二(火) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 木, 从而位置(6)就可以排除属水的号码[1]和[6], 以及属木的号码[3]和[8]了。

例 13: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸卯 _{十七(10)}	3	14	15	28	32	34	36—2	金
庚戌 _{廿四(17)}	6	11	12	18	19	27	30—34	金
丁巳 _{初二(24)}	3	8	13	20	25	31	36—26	土

甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	—	10	金
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31	土
戊寅	廿三(15)	8	12	10	17	20	25	27	—	7	土
乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2	水
壬辰	初七(29)	7	8	9	16	18	26	34	—	18	水
己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木
丙午	廿一(12)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水 (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,农历十四(尾数)——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(对称的方向混合轨迹来回已达3次),所以位置(4)与农历十四就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即:十四(金) $\xrightarrow{\text{生}} \text{水}$,十四(金) $\xrightarrow{\text{克}} \text{木}$,从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属木的号码[3]和[8]了。

例 14: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 3 位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木
	庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木
{	丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34	—	13	水
	丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火
{	癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35	—	33	木
	甲戌	廿二(10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	火

{	庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
	辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
{	丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
	戊子	初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
{	甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23—20	火
	乙未	十一(31)	4	8	13	15	16	24	26—28	金
{	辛巳	廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
	壬寅	十八(7)	5	20	22	25	26	32	34—16	金
{	戊子	初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
	己酉	廿五(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应,农历初四——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向混合轨迹来回已达3次),所以农历初四与位置(2)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即:初四(金) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 土,初四(金) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 火,从而位置(2)就可以排除属土的号码[2]和[7]了。

例 15:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬辰	初七(29)	7	8	9	16	18	26	34—28	水
己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木
丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
癸丑	廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35—33	木
庚申	初六(26)	4	9	10	29	33	34	35—3	木
丁卯	十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火

甲戌	二十(10)	1	5	6	13	19	21	23	— 20	火
辛巳	廿七(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	金 (未开奖,需预测)

——如上图所示的平行对应, 农历廿七 (尾数) ——位置 (5) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应已达 6 次), 所以农历廿七与位置 (5) 就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应, 即: 廿七 (火) $\xrightarrow{\text{生} \otimes}$ 土, 廿七 (火) $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 金, 从而位置 (5) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0], 以及属金的号码 [4] 和 [9] 了。

例 16: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙午	十四(18)	1	8	11	15	21	29	35	— 23	水
癸丑	廿一(25)	8	16	17	22	27	31	33	— 23	木
庚申	廿八(2)	10	13	16	20	28	29	34	— 25	木
丁卯	初六(9)	5	14	18	21	31	34	35	— 10	火
甲戌	十三(16)	6	12	19	20	22	24	28	— 35	火
辛巳	二十(23)	2	6	16	17	18	29	30	— 19	金
戊子	廿七(30)	3	14	21	22	23	27	29	— 32	火
乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34	— 5	金
壬寅	十二(13)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	金 (未开奖,需预测)

如上图箭头所示的斜线对应, 农历初五 —— 位置 (6) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生和相克关系已达 6 次), 所以农历初五与位置 (6) 就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应, 即初五 (土) $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 木, 初五 (土) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 火, 从而位置 (6) 就可以排除属木的号码 [3] 和 [8], 以及属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 17:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:
.....

庚辰	廿二(19)	6	17	18	20	26	29	31	—	25	金
丁亥	廿九(26)	1	6	7 _克	11	17	18	35	—	33	土
甲午	初六(3)	3	6	7 _生	17	23	24	36	—	22	金
辛丑	十三(10)	12	17	18 _克	22	26	30	33	—	1	土
戊申	二十(17)	1	3	17 _克	18	28	30	31	—	36	土
乙卯	廿七(24)	11	14	17 _克	21	22	31	33	—	35	水
壬戌	初五(31)	(1)	(2)	(3) _{⊗生或克}	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水
己巳	十二(7)	(未开奖,需预测)									木

(其他资料省略)

——如上图箭头所示的斜线对应, 农历十二 (尾数) ——位置 (7) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生和相克关系混合对应仅达 5 次), 所以农历十二与位置 (7) 就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应, 即: 十二 (火) $\xleftarrow{\text{生}} \text{⊗}$ 木, 十二 (火) $\xleftarrow{\text{克}} \text{⊗}$ 水, 从而位置 (7) 就可以排除属木的号码 [3] 和 [8], 以及属水的号码 [1] 和 [6] 了。这例子也是灵活运用“临界点次数”的举证。

[说明]

上述的较明显临界点的依据是: 同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应达 5 次, 这完全是一个“疑点”, 因为这种情形下的变化状态还有可能继续达到 6 次, 甚至 7 次, 所以据此而作出初步预测结果后必须坚持“事应过三”的验证法则, 还有待于其它不同方式、不同渠道的预测结果来进一步证实。


例 18: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 7 位的号码等距离环环相比系统:
.....

戊戌	初九(8)	6	8	10	13	25	32	36—	22	木
乙巳	十六(15)	2	6	11	14	21	31	34—	26	火
壬子	廿三(22)	1	3	7	17	18	21	27—	20	木
己未	初一(29)	1	5	17	20	22	31	36—	19	火
丙寅	初八(5)	15	18	20	25	27	34	36—	7	火
癸酉	十五(12)	6	9	11	15	23	31	36—	25	金
庚辰	廿二(19)	6	17	18	20	26	29	31—	25	金
丁亥	廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35—	33	土
甲午	初六(3)	3	6	7	17	23	24	36—	22	金
辛丑	十三(10)	12	17	18	22	26	30	33—	1	土
戊申	二十(17)	1	3	17	18	28	30	31—	36	土
乙卯	廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33—	35	水
壬戌	初五(31)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—	(8)	水(未开奖,需预测)

上就是第7位的号码等距离环环相比系统！
 相隔6期的等距离之五行属性，互相对应，实质

.....
 ↓ 上述过程的等距离环环相比系统如下：

{	戊戌	初九(8)	6	8	10	13	25	32	36 —	22	木
	丁亥	廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35 —	33	土
{	乙巳	十六(15)	2	6	11	14	21	31	34 —	26	火
	甲午	初六(3)	3	6	7	17	23	24	36 —	22	金
{	壬子	廿三(22)	1	3	7	17	18	21	27 —	20	木
	辛丑	十三(10)	12	17	18	22	26	30	33 —	1	土



——如上图箭头所示的斜线对应，农历十五(尾数)——位置(7)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系已达4次)，所以位置(7)与农历十五就不会再产生相刑关系轨迹对应，即：十五(土) ←_刑 ⊗ → 土，从而位置(7)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

[说明]

号码等距离环环相比系统在预测推算过程是一个十分“有用”和“好用”的工具。至于开奖日的天干或地支或纳音或新历尾数或农历尾数等标准参照系中的信息载体与位置号码的“环环相比”原理，其过程与上例 18 演变的原理是一致的、相通的！所以在每个位置号码的预测推算过程中，着重发挥 1—12 位的号码等距离环环相比系统——识别各种变化状态的临界点的作用，具有特别重要意义！

以下就是专门以开奖日的新历尾数作为标准参照物，与各个位置号码进行相生或相克或相刑关系，从而识别变化的临界点达到预测目的之例子。

例 1: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：
.....

癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	—	18	木
庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—	28	木
丁酉	初十(5)	2	3	10	18	19	22	30	—	25	火
甲辰	十七(12)	8	10	13	19	20	21	36	—	12	火
辛亥	廿四(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应，新历(19)尾数——位置(8)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系已达3次)，所以新历(19)与位置(8)就不会再产生相刑关系，即：(19)金 $\xleftarrow{\text{刑}} \text{金}$ ，从而位置(8)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。这也是灵活运用“机会点”的举证。

例 2：广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：





.....

壬申	十五(9)	3	17	23	26	30	35	36	—	28	金
己卯	廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33	—	10	土
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	—	8	土
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	—	19	水
庚子	十四(6)	5	7	10	12	25	32	36	—	29	土
丁未	廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	—	26	水
甲寅	廿八(20)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应，新历(13)尾数——位置(5)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系已达4次)，所以新历(13)与位置(5)就不会再产生相刑关系轨迹对应，即(13)(木) $\xleftarrow{\text{刑}} \text{木}$ ，从而位置(5)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

例 3: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:






.....

癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—8	水
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—31	土
										
丁丑	廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36	—4	水
										
甲申	初二(18)	5	7	12	20	22	26	29	—3	水
										
辛卯	初九(25)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	木(未开奖,需预测)
										
戊戌	十六(2)									

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(2)尾数——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系已达3次),所以新历(2)与位置(4)就不会再产生相刑关系,即(2)(火) $\xleftarrow{\text{刑}} \text{火}$,从而位置(4)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 4: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬辰	三十(4)	1	11	12	15	21	26	28	—27	水
己亥	初七(11)	2	7	11	13	19	21	22	—24	木
										
丙午	十四(18)	1	8	11	15	21	29	35	—23	水
										
癸丑	廿一(25)	8	16	17	22	27	31	33	—23	木
										
庚申	廿八(2)	10	13	16	20	28	29	34	—25	木
										
丁卯	初六(9)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	火(未开奖,需预测)
										

——如上述箭头所示的平行对应,新历(9)尾数——位置(5)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达4次),所以新历(9)与位置(5)就不会再产生同一方向的相生关系

轨迹对应,即(9)(金) \leftarrow 土,从而位置(5)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

例 5: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

辛丑_{十三(10)} 12 17 18 22 26 30 33—1 土

戊申_{二十(17)} 1 3 17 18_生 28 30 31—36 土

乙卯_{廿七(24)} 11 14 17 21_生 22 31 33—35 水

壬戌_{初五(31)} 3 14 25 28_生 30 32 34—26 水

己巳_{十二(7)} 3 4 5 6_生 7 10 23—33 木

丙子_{十九(14)} 1 3 14 19_生 24 28 30—20 水

癸未_{廿六(21)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 木 (未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应，新历(14)尾数——位置(8)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生关系已达4次)，所以新历(14)与位置(8)就不会再产生同一方向相生关系轨迹对应，即(14)(金) $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{生}}$ 水，从而位置(8)就可以排除属水的号码[1]和[6]了。

例 6: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36	—	3	火
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—	28	木
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	—	4	火
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	—	19	火
癸卯	十七(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金
庚戌	廿四(17)	(未开奖,需预测)									金

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(17)(尾数)——位置(6)之前出现一个变化较明显临界点(同一方向的相生关系仅达3次),所以新历(17)与位置(6)就不会再产生同一方向相生关系轨迹对应,即(17)(火) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 木,从而位置(6)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。“3次就是机会点”,这是具体问题具体分析的例子。

例7:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁卯十三(3)	3	5	27	28	30	31	36—34	火
甲戌二十(10)	1	5	6	13	19	21	23—20	火
辛巳廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
乙未十一(31)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应,新历(31)(尾数)——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系仅达3次),所以新历(31)与位置(6)就不会再产生同一方向相克关系轨迹对应,即:(31)(水) $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 火,从而位置(6)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例8:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31—32	金
戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35—8	火
乙未十一(31)	4	8	13	15	16	24	26—28	金
壬寅十八(7)	5	20	22	25	26	32	34—16	金
己酉廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36—17	土
丙辰初三(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(14)(尾数)——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达3次),所以新历(14)与位置(3)就不会再产生同一方向的相克关系,即(14)(金) $\xrightarrow[\text{克}]{\otimes}$ 木,从而位置(3)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

例9:广东7/36某阶段中奖号码第3位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	癸卯 _{十七(10)}	3	14	15	28	32	34	36—2	金
	甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24—10	金
{	庚戌 _{廿四(17)}	6	11	12	18	19	27	30—34	金
	辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36—31	土
{	丁巳 _{初二(24)}	3	8	13	20	25	31	36—26	土
	戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27—7	土
{	甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24—10	金
	乙酉 _{三十(22)}	10	15	18	19	21	26	35—2	水
{	辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36—31	土
	壬辰 _{初七(29)}	7	8	9	16	18	26	34—28	水
{	戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27—7	土
	己亥 _{十四(5)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(15)(尾数)——位置(7)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达4次),所以新历(15)与位置(7)就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应,即(15)(土) $\xleftarrow[\text{克}]{\otimes}$ 木,从而位置(7)就可以排除属木

的号码[3]和[8]了。

例 10:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁卯 _{十三(3)}	3	5	27	28	30	31	36 — 34	火
甲戌 _{二十(10)}	1	5	6	13	19	21	23 — 20	火
辛巳 _{廿七(17)}	8	9	14	20	22	29	31 — 32	金
戊子 _{初四(24)}	3	12	15	16	17	33	35 — 8	火
乙未 _{十一(31)}	4	8	13	15	16	24	26 — 28	金
壬寅 _{十八(7)}	5	20	22	25	26	32	34 — 16	金
己酉 _{廿五(14)}	2	6	9	15	29	32	36 — 17	土
丙辰 _{初三(21)}	13	15	19	21	25	28	32 — 30	土
癸亥 _{初十(28)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) — (8)	水(未开奖,需预测)
	⊗生或克							

——如上述箭头所示的平行对应,新历(28)(尾数)——位置

(1) 之前出现一个变化的明显临界点(对称的方向混合轨迹来回已达 3 次),所以新历(28)与位置(1)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即(28)(木) $\xleftarrow{\text{生}} \text{水}$, (28)(木) $\xleftarrow{\text{克}} \text{金}$,从而位置(1)就可以排除属水的号码[1]和[6]了,以及属金的号码[4]和[9]了。

例 11:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛酉 _{初五(27)}	10	18	19	22	23	26	32 — 30	木
戊辰 _{十二(6)}	1	2	5	7	17	19	23 — 30	木
乙亥 _{十九(13)}	11	14	15	22	28	33	36 — 3	火
壬午 _{廿六(20)}	1	5	6	9	15	33	35 — 28	木

己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	—	4	火
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	—	19	火
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36	—	2	金
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30	—	34	金
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36	—	26	土
甲子	初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	—	10	金
辛未	十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31	土
戊寅	廿三(15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土(未开奖,需预测)
乙酉	三十(22)										水

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(22)(尾数)——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(对称的方向混合轨迹来回竟达5次!),所以位置(4)与新历(22)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即:(22)(火) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 木,(22)(火) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 水,从而位置(4)就可以排除属木的号码[3]和[8],以及属水的号码[1]和[6]了。

[说明]

上述例子出现对称的方向混合轨迹来回达5次才产生一个真正的变化临界点,这在广东7/36的新历(尾数)与各个位置号码间的类似同类“最高记录”是极罕见的;绝大多同类变化的状态是3—4次对称的方向来回对应时就产生一个临界点。若遇上几十期才会偶然出现一次的“意外”情况,就只能作失误计了。所以,抓住绝大多数某种状态下的变化临界点的“次数”作为预测推算的依据,应该灵活与严谨相结合,具体问题具体分析地实施。

例 12:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土
癸亥	初三(4)	7	9 _生	11	14	19	21	32—36	水
庚午	初十(11)	10	17 _克	19	24	27	33	35—7	土
丁丑	十七(18)	3	7 _生	9	12	23	24	36—25	水
甲申	廿四(25)	3	5 _生	12	14	24	28	31—8	水
辛卯	初二(1)	10	18 _生	25	26	32	33	36—2	木
戊戌	初九(8)	6	8 _克	10	13	25	32	36—22	木
乙巳	十六(15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火(未开奖,需预测)
壬子	廿三(22)								

——如上述箭头所示的斜线对应，新历(22)尾数——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹已达6次)，所以位置(4)与新历(22)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应，即：(22)(火) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 水，(22)(火) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 木，从而位置(4)就可以排除属水的号码[1]和[6]，以及属木的号码[3]和[8]了。

例 13: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛丑	十三(10)	12	17	18	22	26	30	33—1	土
戊申	二十(17)	1	3	17 _克	18	28	30	31—36	土
乙卯	廿七(24)	11	14	17 _克	21	22	31	33—35	水
壬戌	初五(31)	3	14	25 _克	28	30	32	34—26	水
己巳	十二(7)	3	4	5 _生	6	7	10	23—33	木

丙子 _{十九(14)}	1	3	14	19	24	28	30—20	水
癸未 _{廿六(21)}	5	8	13	16	17	25	33—18	木
庚寅 _{初三(28)}	8	12	17	18	22	30	32—28	木
丁酉 _{初十(5)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(28)(尾数)——位置(6)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹已达6次),所以位置(6)与新历(28)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应,即:(28)(木) $\xleftarrow{\text{生}} \text{水}$, (28)(木) $\xleftarrow{\text{克}} \text{金}$,从而位置(6)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属金的号码[4]和[9]了。

例 14:广东 7/36 某阶段中奖号码第 3 位的等距离排列系统:

.....

甲子 _{初二(7)}	1	5	6	19	20	23	35—11	金
乙酉 _{廿三(28)}	3	8	11	16	18	20	28—6	水
丙午 _{十四(18)}	1	8	11	15	21	29	35—23	水
丁卯 _{初六(9)}	5	14	18	21	31	34	35—10	火
戊子 _{廿七(30)}	3	14	21	22	23	27	29—32	火
己酉 _{十九(20)}	3	4	6	22	23	33	36—29	土
庚午 _{初十(11)}	10	17	19	24	27	33	35—7	土
辛卯 _{初二(1)}	10	18	25	26	32	33	36—2	木
壬子 _{廿三(22)}	1	3	7	17	18	21	27—20	木
癸酉 _{十五(12)}	6	9	11	15	23	31	36—25	金
甲午 _{初六(3)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应新历(3)尾数——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应竟达8次!),所以新历(3)与位置(1)就不会再产生同一方向的相生或相克关系混合轨迹对应,即:(3)(木) $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 水,(3)(木) $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ 金,从而位置(1)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属金的号码[4]和[9]了。

[说明]

1—12位的等距离排列系统在预测推算过程中是一种十分有用的重要工具。1—12位的等距离排列系统,相当于重新“产生”了12个“中奖号码排列顺序”体系,这对于充分寻找和挖掘各种变化的明显或较明显临界点提供了广泛的基础及其“空间”。当然,在长期的过程中,偶然间出现一次某种同类变化状态最新的、“破记录”的最高记录之次数,在所难免,不必大惊小怪。

坚持 99%, 放弃 1%, 灵活与严谨相结合, 具体问题具体分析, 就是《周易与彩票选号技巧》的预测推算之准则!

如下就是专门以开奖日的相冲岁数(尾数)作为标准参照物,与各个位置号码进行相生或相克或相刑关系,从而识别变化的临界点达到预测目的的例子。

例 1: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

开奖日的相冲资料

癸亥	初三(4)	7	9	11	14	19	21	32—36	水	[土、火]	[丁巳、乙巳](24)
庚午	初十(11)	10	17	19	24	27	33	35—7	土	[金、水]	[甲子、丙子](17)
									↑ 刑 ↑		
丁丑	十七(18)	3	7	9	12	23	24	36—25	水	[土、火]	[辛未、己未](10)
									↑ 刑 ↑		
甲申	廿四(25)	3	5	12	14	24	28	31—8	水	[土、火]	[戊寅、丙寅](63)
									↑ 刑 ↑		
辛卯	初二(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木	[水、土]	[乙酉、己酉](56)
								(未开奖,需预测)	↑ 刑 ↑		

——如上述箭头所示的平行对应，位置 (8) ——相冲岁数 (56) (尾数) 之前出现一个变化的明显临界点 (相刑关系已达 3 次)，所以位置 (8) 与相冲岁数 (56) 就不会再产生相刑关系轨迹对应，即：(56) (水) $\xleftarrow[\text{刑}]{\otimes}$ 水，从而位置 (8) 就可以排除属水的号码 [1] 和 [6] 了。

例 2: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	水	[土、火]	[丁巳、乙巳](25)
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	土	[金、水]	[甲子、丙子](18)
											刑		
丁丑	廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36	—	4	水	[土、火]	[辛未、己未](11)
											刑		
甲申	初二(18)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水	[土、火]	[戊寅、丙寅](64)
											刑		
											刑		

(未开奖, 需预测)

——如上述箭头所示的平行对应，位置 (5) ——相冲岁数 (64) (尾数) 之前出现一个变化的较明显临界点 (相刑关系已达 2 次)，所以位置 (5) 与相冲岁数 (64) 就不会再产生相刑关系轨迹对应，即：(64) (金) $\xleftarrow[\text{刑}]{\otimes}$ 金，从而位置 (5) 就可以排除属金的号码 [4] 和 [9] 了。

[说明]

在广东 7/36 的正常顺序下的总系统中，开奖日的各个位置号码与当日的相冲岁数进行平行对应时，产生变化的临界点往往仅需“2 次”！这是具体问题具体分析和“一方彩票一方特点”的表现。

例 3: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

戊午 _{初一(26)}	1	10	15	21	24	30	35	—	12	火[木、金][壬子、甲子](29)
乙丑 _{初八(2)}	5	13	23	27	28	30	35	—	19	金[火、木][己未、癸未](22)
壬申 _{十五(9)}	3	17	23	26	30	35	36	—	28	土[火、木][丙寅、庚寅](15)
己卯 _{廿二(16)}	6	14	17	24	25	30	33	—	10	土[金、水][癸酉、乙酉](68)
丙戌 _{廿九(23)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土[金、水][庚辰、壬辰](61)
癸巳 _{初七(30)}	(未开奖,需预测)									水[土、火][丁亥、乙亥](54)

——如上述箭头所示的斜线对应,位置(1)——相冲岁数(54)(尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑关系已达3次),所以位置(1)与相冲岁数(54)就不会再产生相刑关系轨迹对应,即(54)(金) $\xleftarrow{\text{刑} \otimes}$ 金,从而位置(1)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例4:广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24	—	10	金[火、木][戊午、壬午](24)
辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36	—	31	土[金、水][乙丑、丁丑](17)
戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27	—	7	土[金、水][壬申、甲申](10)
乙酉 _{三十(22)}	10	15	18	19	21	26	35	—	2	水[土、火][己卯、丁卯](63)
壬辰 _{初七(29)}	7	8	9	16	18	26	34	—	18	水[土、火][丙戌、甲戌](56)
己亥 _{十四(5)}	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木[水、土][癸巳、丁巳](49)
丙午 _{廿一(12)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水[土、火][庚子、戊子](42)
	(未开奖,需预测)									

——如上述箭头所示的斜线对应,位置(2)——相冲岁数(49)(尾数)之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系已达4次),所以位置(2)与相冲岁数(49)就不会再产生相刑关系,即:(49)(金) $\xleftarrow{\text{刑} \otimes}$

金,从而位置(2)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例 5:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸卯 _{十七(10)}	3	14	15	28	32	34	36	— 2	金 [火、木] [丁酉、辛酉] (45)
庚戌 _{廿四(17)}	6	11	12	18	19	27	30	— 34	金 [火、木] [甲辰、戊辰] (38)
丁巳 _{初二(24)}	3	8	13	20	25	31	36	— 26	土 [金、水] [辛亥、癸亥] (31)
甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24	— 10	金 [火、木] [戊午、壬午] (24)
辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36	— 31	土 [金、水] [乙丑、丁丑] (17)
戊寅 _{廿三(15)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	土 [金、水] [壬申、甲申] (10)

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应,位置(3)——相冲岁数(10)(尾数)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生关系已达4次),所以位置(3)与相冲岁数(10)就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应,即:金 $\xleftarrow{\text{生}}(10)$ (土),从而位置(3)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例 6:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑 _{廿八(19)}	3	6	8	20	27	28	35	— 33	木 [水、土] [丁未、辛未] (35)
庚申 _{初六(26)}	4	9	10	29	33	34	35	— 3	木 [水、土] [甲寅、戊寅] (28)
丁卯 _{十三(3)}	3	5	27	28	30	31	36	— 34	火 [木、金] [辛酉、癸酉] (21)
甲戌 _{廿十(10)}	1	5	6	13	19	21	23	— 20	火 [木、金] [戊辰、庚辰] (14)
辛巳 _{廿七(17)}	8	9	14	20	22	29	31	— 32	金 [火、木] [乙亥、己亥] (67)
戊子 _{初四(24)}	3	12	15	16	17	33	35	— 8	火 [木、金] [壬午、丙午] (60)
乙未 _{十一(31)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	金 [火、木] [己丑、癸丑] (53)

——如上述箭头所示斜线对应, 位置 (7) ——相冲岁数 (60) (尾数) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生关系已达 3 次), 所以位置 (7) 与相冲岁数 (60) 就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即: (60) (土) $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{生}}$ 金, 从而位置 (7) 就可以排除属金的号码 [4] 和 [9] 了。

例 7: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....


己亥 _{十四(5)}	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木 [水、土] [癸巳、丁巳] (49)
丙午 _{廿一(12)}	4	12	17	20	22	24	34	—	13	水 [土、火] [庚子、戊子] (42)
癸丑 _{廿八(19)}	3	6	8	20	27	28	35	—	33	木 [水、土] [丁未、辛未] (35)
庚申 _{初六(26)}	4	9	10	29	33	34	35	—	3	木 [水、土] [甲寅、戊寅] (28)
丁卯 _{十三(3)}	3	5	27	28	30	31	36	—	34	火 [木、金] [辛酉、癸酉] (21)
甲戌 _{二十(10)}	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	— (8)								火 [木、金] [戊辰、庚辰] (14)
辛巳 _{廿七(17)}	(未开奖,需预测)								金 [火、木] [乙亥、己亥] (67)	

——如上图箭头所示的斜线对应, 位置 (2) ——相冲岁数 (67) (尾数) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向的相生关系已达 4 次), 所以位置 (2) 与相冲岁数 (67) 就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即: 木 $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{生}}$ (火) (67), 从而位置 (2) 就可以排除属木的号码 [3] 和 [8] 了。

例 8: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....


辛巳廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	金 [火、木] [乙亥、己亥] (67)
戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35	—	8	火 [木、金] [壬午、丙午] (60)
乙未十一(31)	4	8	13	15	16	24	26	—	28	金 [火、木] [己丑、癸丑] (53)



——如上述箭头所示的平行对应，位置 (1) ——相冲岁数 (32) (尾数) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向的相克关系已达 4 次)，所以位置 (1) 与相冲岁数 (32) 就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即：水 $\xrightarrow[\text{⊗克}]{\text{克}}$ (火) (32)，从而位置 (1) 就可以排除属水的号码 [1] 和 [6] 了。

例 9: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....



——如上述箭头所示的斜线对应，位置 (6) ——相冲岁数 (13) (尾数) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向的相克关系已达 4 次)，所以位置 (6) 与相冲岁数 (13) 就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即：土 $\xleftarrow[\text{⊗克}]{\text{克}}$ (木) (13)，从而位置 (6) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0] 了。

例 10: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 3 位的号码等距离环环

相比系统：

.....	相冲岁数	
{ 丙午 廿一(12) 4 12 17 20 22 24 34 — 34	(42)	
{ 丁卯 十三(3) 3 5 27 28 30 31 36 — 36	(21)	
{ 癸丑 廿八(19) 3 6 8 20 27 28 35 — 33	(35)	克
{ 甲戌 二十(10) 1 5 6 13 19 21 23 — 20	(14)	
{ 庚申 初六(26) 4 9 10 29 33 34 35 — 3	(28)	克
{ 辛巳 廿七(17) 8 9 14 20 22 29 31 — 32	(67)	克
{ 丁卯 十三(3) 3 5 27 28 30 31 36 — 34	(21)	
{ 戊子 初四(24) 3 12 15 16 17 33 35 — 8	(60)	克
{ 甲戌 二十(10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8)	(14)	
{ 乙未 十一(31) (未开奖,需预测)	(53)	

——如上述箭头所示的斜线对应，位置 (6) ——相冲岁数 (53) (尾数) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相克关系已达 3 次)，所以位置 (6) 与相冲岁数 (53) 就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即土^克⊗(木) (53)，从而位置 (6) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0] 了。

例 11：广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....	
戊子 初四(24) 3 12 15 16 17 33 35 — 8	(60)
乙未 十一(31) 4 8 13 15 16 24 26 — 28	(53)
壬寅 十八(7) 5 20 22 25 26 32 34 — 16	(46)
己酉 廿五(14) 2 6 9 15 29 32 36 — 17	(39)

丙辰初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	(32)
癸亥初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	(25)
庚午十七(4)	7	21	25	26	28	32	34	—	31	(18)
丁丑廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36	—	4	(11)
甲申初二(18)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	(64)(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应，位置(5)——相冲岁数(11)尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克关系混合轨迹已达6次)，所以位置(5)与相冲岁数(11)就不会再产生同一方向相生或相克关系轨迹对应，即：土 $\xrightarrow{\text{生}}\text{⊗}$ (水)(11)，金 $\xrightarrow{\text{生}}\text{⊗}$ (水)(11)，从而位置(5)就可以排除属土的号码[5]和[0]，以及属金的号码[4]和[9]了。

例 12: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲戌二十(10)	1	5	6	13	19	21	23	—	20	(14)
辛巳廿七(17)	8	9	14	20	22	29	31	—	32	(67)
戊子初四(24)	3	12	15	16	17	33	35	—	8	(60)
乙未十一(31)	4	8	13	15	16	24	26	—	28	(53)
壬寅十八(7)	5	20	22	25	26	32	34	—	16	(46)
己酉廿五(14)	2	6	9	15	29	32	36	—	17	(39)
丙辰初三(21)	13	15	19	21	25	28	32	—	30	(32)
癸亥初十(28)	3	15	18	25	26	27	32	—	8	(25)
庚午十七(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	(18)

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应,位置(1)相冲岁数(18)(尾数)之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克关系混合轨迹已达7次),所以位置(1)与相冲岁数(18)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应,即水 $\xrightarrow{\text{生}}\textcircled{\otimes}$ (木)(18),金 $\xrightarrow{\text{克}}\textcircled{\otimes}$ (木)(18),从而位置(1)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属金的号码[4]和[9]了。

例 13: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛亥	廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27	—	11	(36)	
戊午	初一(26)	1	10	15	21	24	克	30	35	—	12	(29)
乙丑	初八(2)	5	13	23	27	28	生	30	35	—	19	(22)
壬申	十五(9)	3	17	23	26	30	生	35	36	—	28	(15)
己卯	廿二(16)	6	14	17	24	25	生	30	33	—	10	(68)
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	生	30	34	—	8	(61)
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	生	14	27	—	19	(54)
庚子	十四(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	(48)	
丁未	廿一(13)	(未开奖,需预测)								⊗生或克	(41)	

——如上述箭头所示的斜线对应,位置(4)——相冲岁数(41)(尾数)之前出现一个变化的较明显的临界点(同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应已达6次),所以位置(4)与相冲岁数(41)就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹,即金 $\xrightarrow{\text{生}}\textcircled{\otimes}$ (水)(41),土 $\xrightarrow{\text{克}}\textcircled{\otimes}$ (水)(41),从而位置(4)就可以排除属金的号码[4]和[9],以及属土的号码[0]和[5]了。

例 14: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚戌 _{十八(22)}	7	20	22	23	28	30	33—17	[火、木]	[甲辰、戊辰]	(37)
丁巳 _{廿五(29)}	9	14	22	25	27	28	29—26	[金、水]	[辛亥、癸亥]	(30)
甲子 _{初二(7)}	1	5	6	19	20	23	35—11	[火、木]	[戊午、壬午]	(23)
辛未 _{初九(14)}	2	5	9	21	25	28	32—31	[金、水]	[乙丑、丁丑]	(16)
戊寅 _{十六(21)}	6	10	22	23	28	33	34—3	[金、水]	[壬申、甲申]	(69)
乙酉 _{廿三(28)}	3	8	11	16	18	20	28—6	[土、火]	[己卯、丁卯]	(62)
壬辰 _{三十(4)}	1	11	12	15	21	26	28—27	[土、火]	[丙戌、甲戌]	(55)
己亥 _{初七(11)}	2	7	11	13	19	21	22—24	[水、土]	[癸巳、丁巳]	(48)
丙午 _{十四(18)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	[土、火]	[庚子、戊子]	(41)
(未开奖,需预测)								⊗生或克		

——如上述箭头所示的平行对应，位置(5)——相冲岁数(41)(尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向混合轨迹来回达3次)，所以位置(5)与相冲岁数(41)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应，即木 $\xleftarrow{\text{⊗生}}$ (水)(41)，火 $\xleftarrow{\text{⊗克}}$ (水)(41)，从而位置(5)就可以排除属木的号码[3]和[8]，以及属火的号码[2]和[7]了。

例 15: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙辰 _{廿六(27)}	1	8	13	19	20	22	24—32	[金、水]	[庚戌、壬戌]	(31)
癸亥 _{初三(4)}	7	9	11	14	19	21	32—36	[土、火]	[丁巳、乙巳]	(24)
庚午 _{初十(11)}	10	17	19	24	27	33	35—7	[金、水]	[甲子、丙子]	(17)
丁丑 _{十七(18)}	3	7	9	12	23	24	36—25	[土、火]	[辛未、己未]	(10)

甲申 廿四(25) 3 5 12 14 24 28 31 — 8 [土、火] [戌寅、丙寅] (63)

辛卯 初二(1) 10 18 25 26 32 33 36 — 2 [水、土] [乙酉、己酉] (56)

戊戌 初九(8) 6 8 10 13 25 32 36 — 22 [水、土] [壬辰、丙辰] (49)

乙巳 十六(15) 2 6 11 14 21 31 34 — 26 [木、金] [己亥、辛亥] (42)

壬子 廿三(22) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) — (8) [水、土] [丙午、庚午] (35)

己未 初一(29) (未开奖, 需预测) [木、金] [癸丑、乙丑] (28)

——如上述箭头所示的斜线对应，位置(2)——相冲岁数(28)(尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向混合轨迹来回达3次)，所以位置(2)与相冲岁数(28)就不会再生产对称的方向来回混合轨迹对应，即：水 $\xrightarrow[\otimes]{\text{生}}$ (木)(28)，金 $\xrightarrow[\otimes]{\text{克}}$ (木)(28)，从而位置(2)就可以排除属水的号码[1]和[6]，以及属金的号码[4]和[9]了。

例 16:广东 7/36 某阶段中奖号码同名纳音[土]系统:

• • • • •

丙辰 廿六(27) 1 8 13 19 20 22 24—32 [金、水] [庚戌、壬戌] (31)

庚午 初十(11) 10 17 19 24 27 33 35—7 [金、水] [甲子、丙子] (17)

丁亥 廿九(26) 1 6 7 11 17 18 35—33 [金、水] [辛巳、癸巳] (60)

辛丑 十三(10) 12 17 18 22 26 30 33—1 [金、水] [乙未、丁未] (46)

戊申 二十(17) 1 3 17 18 28 30 31—36 [金、水] [壬寅、甲寅] (39)

己卯 廿二(16) 6 14 17 24 25 30 33—10 [金、水] [癸酉、乙酉] (68)

丙戌 廿九(23) 1 4 5 10 26 30 34—8 [金、水] [庚辰、壬辰] (61)

庚子 十四(6) 5 7 10 12 25 32 36—29 [金、水] [甲午、丙午] (48)

丁巳 初二(24) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8) [金、水] [辛亥、癸亥] (31)

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应，位置(3)——相冲岁数(31)(尾数)之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向混合轨迹来回达3次)，所以位置(3)与相冲岁数(31)就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应，即土 $\xrightarrow{\text{克}}(\text{水})(31)$ ，金 $\xrightarrow{\text{生}}(\text{水})(31)$ ，从而位置(3)就可以排除属土的号码[5]和[0]，以及属金的号码[4]和[9]了。

[重要说明]

1. 位置号码的预测推算，就是千方百计地、准确地在各个系统搜索、判断和确认中奖号码变化状态的明显临界点。

2. 在识别中奖号码变化状态的明显临界点上，既要尊重、关注同一类的其他位置的中奖号码变化状态产生明显临界点的共性和普遍性的特点，又要灵活地重视本身位置的中奖号码变化状态产生明显临界点的个性及其特殊性；总之，具体问题具体分析，决不能机械式的死套硬搬，而应灵活变通地去“应变”！

第四节 标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法

标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法，就是在干支数字信息载体总系统(包含其它各个系统)中，已知的、未知的号码与系统内相应的各信息载体[农历尾数、新历尾数、相冲岁数(尾数)]若干对进行同等位置的、逐项的、逐个位置的主题配搭对应，通过记录若干对两者间在对应过程中能共同组成主题的次数，确认该主题变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

衡量两个数字间组成主题配搭者不外乎是五大主题之一：
[1]与[9]；[2]与[8]；[3]与[7]；[4]与[6]；[5]与[0]。当然，每个尾数自身之间也可以组成主题，即[1]与[1]；[2]与

[2]; [3]与[3]; [4]与[4]; [5]与[5]; [6]与[6]; [7]与[7]; [8]与[8]; [9]与[9]; [0]与[0]。前者所组合的主题称为——杂主题, 即[1+9], [2+8], [3+7], [4+6], [5+0]; 后者所组合的主题称为纯主题, 即[1+1], [2+2], [3+3], [4+4], [5+5], [6+6], [7+7], [8+8], [9+9], [0+0]。

同样, 在标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法的应用过程中, 我们也要制定识别主题配搭变化状态的临界点之标准, 包括“最高记录”标准和“次最高记录”标准。这两个标准当然是源自本只彩票的大量的同一类变化状态下的可靠的统计数据。

标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法, 根据标准参照系的信息载体之名称, 可分为:

农历尾数——位置号码主题轨迹对应预测法;

新历尾数——位置号码主题轨迹对应预测法;

相冲岁数(尾数)——位置号码主题轨迹对应预测法。

农历尾数/新历尾数/相冲岁数(尾数)——位置号码主题轨迹对应预测法, 就是指开奖日的农历尾数/新历尾数/相冲岁数(尾数)与系统内各个位置号码间, 若干对在同等位置进行的主题搭配关系对应的预测法。

原则与方法:

(一)选定适用的系统: 总系统、干支系统、纳音系统、主题系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

(二)检索和找出: 识别农历尾数/新历尾数/相冲岁数(尾数)——位置号码主题轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”之标准。

①农历尾数/新历尾数/相冲岁数(尾数)——位置号码进行主题配搭关系对应时, 均是纯主题或杂主题为: 3—4次(极少达

4次)。

②农历尾数/新历尾数/相冲岁数(尾数)——位置号码进行主题配搭关系对应时,纯主题和杂主题混合为:4—5次(很少达5次)。

(三)搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比,当然具体问题还须具体分析。原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码,同一预测内容,必须坚持“事应过三”验证法则,最后综合各项的初步预测结果得出最终的预测结论。原则是:必须保证预测结论是准确的。

[重要说明]

在系统内,可以把开奖日的农历尾数或新历尾数或相冲岁数(尾数)看作成一个已知的、固定的、标准的“号码”。

例 1:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛巳二十(23)	3	6	16	17	18	29	30	—	19	金
戊子廿七(30)	2	14	21	22	23	27	29	—	32	火
乙未初五(6)	6	7	17	27	30	33	34	—	5	金
壬寅十二(13)	7	11	14	15	20	29	31	—	25	金
己酉十九(20)	3	4	6	22	23	33	36	—	29	土
丙辰廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24	—	32	土
癸亥初三(14)	7	9	11	14	19	21	32	—	36	水
庚午初十(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应，农历初三——位置(4)之前出现一个变化的明显临界点(纯主题和杂主题的混合主题配搭对应已达5次)，所以农历初三尾数(即[3])，不会与位置(4)再组成主题配搭关系，即： $[3] \xleftarrow{\text{刑} \otimes} [3] \text{ 或 } [7]$ ，从而位置(4)就可以排除尾数[3]和[7]的号码了。

例2：广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

辛卯	初九(25)	7	12	18	21	28	29	36—14	木	(注：其他资料略)
戊戌	十六(2)	1	6	10	22	28	29	34—35	木	
乙巳	廿三(9)	8	9	13	19	24	25	29—16	火	
壬子	三十(16)	1	3	10	13	15	20	32—25	木	
己未	初七(23)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	火(未开奖，需预测)	

如上述箭头所示的平行对应，农历初七——位置(3)之前出现一次纯主题对应，这是一个“疑点”，还不能明确识别是否临界点，故暂不能作出相应的预测结论。这称为“明显者用之，不明显者弃之。(其它同理类推。)

例3：广东7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33—18	木	(注：其他资料略)
庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32—28	木	
丁酉	初十(5)	2	3	10	18	19	22	30—25	火	
甲辰	十七(12)	8	10	13	19	20	21	36—12	火	
辛亥	廿四(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	金(未开奖，需预测)	

——如上述箭头所示的平行对应，农历廿四——位置 (3) 之前出现一个变化的较明显临界点 (杂主题配搭对应已达 3 次)，所以农历廿四尾数 (即 [4]) 不会与位置 (3) 再组成杂主题配搭关系，即： $[4] \xleftrightarrow{\otimes} [6]$ ，从而位置 (3) 就可以排除尾数为 [6] 的号码了。至于 [4] 能否被排除，还应结合其它预测方式的结果再作最后的取舍。

例 4: 广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸亥初三(4)	7	9	11	14	19	21	32—36	水
庚午初十(11)	10	17	19	24	27	33	35—7	土
丁丑十七(18)	3	7	9	12	23	24	36—25	水
甲申廿四(25)	3	5	12	14	24	28	31—8	水
辛卯初二(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木
戊戌初九(8)	(未开奖,需预测)							木

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应，位置 (6) ——农历初九之前出现一个变化的疑点 (纯主题和杂主题的混合主题仅达 3 次)，所以位置 (6) 和农历初九能不能再组成主题配搭关系，这还应该结合其它预测方式所作出的结论再作最后取舍。

例 5: 广东 7/36 某阶段中奖号码第 2 位的等距离排列系统:

.....

戊辰十二(6)	1	2	5	7	17	19	23—30	木
乙亥十九(13)	11	14	15	22	28	33	36—3	火

壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—	28	木
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35	—	4	火
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23	—	19	火
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36	—	2	金
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30	—	34	金
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36	—	26	土
甲子	初九(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	金
辛未	十六(8)										土
戊寅	廿三(15)										土

(注: 其它资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 位置 (2) ——农历廿三之前出现一个变化的较明显临界点 (杂主题配搭对应已达 3 次), 所以农历廿三与位置 (2) 就不会再组成杂主题配搭关系, 即 [3] $\xleftrightarrow{\text{刑} \otimes}$ [7], 从而位置 (2) 就可以排除尾数为 [7] 的号码了。

例 6: 广东 7/36 某阶段中奖号码第十位的号码等距离环环相比系统:

.....

{	戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23	—	30	木
	戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	—	7	土
{	乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	33	36	—	3	火
	乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2	水
{	壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—	28	木
	壬辰	初七(29)	7	8	9	16	18	26	34	—	28	水

{	己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	火	
	己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31—2	木	
{	丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	火	
	丙午	廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水	
{	癸卯	十七(10)	3	⊗	14	15	28	32	34	36—2	金
	癸丑	廿八(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木(未开奖,需预测)	

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 位置(4)——农历十七之前出现一个变化的明显临界点(纯主题对应已达4次), 所以位置(4)与农历十七(尾数)就不会再组成纯主题配搭关系, 即: [7] ←⊗→ [7], 从而位置(4)就可以排除尾数为[7]的号码了。至于[3]能否被排除, 还应结合其他预测方式的结果再作最后的取舍。

例7: 广东7/36某阶段中奖号码同名纳音[金]系统:

.....

癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36	—	11	金
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33	—	17	金
甲子	初二(7)	1	5	6	19	20	23	35	—	11	金
辛巳	二十(23)	2	6	16	17	18	29	30	—	19	金
乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34	—	5	金
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31	—	25	金
癸酉	十五(12)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)			金

——如上述箭头所示的斜线对应, 位置(5)——农历十二之前出现一个变化的疑点(杂主题和纯主题混合对应达3次), 所以位置(5)与农历十二(尾数)就不会再组成杂主题配搭关系, 即

[2]←[?]→[8]或[2]，位置(5)能否排除尾数为[8]或[2]的号码，还应结合其他预测方式的结果再作最后的取舍。

例 8:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲辰 _{十七(12)}	8	10	13	19	20	21	26	—12	火
辛亥 _{廿四(19)}	1	16	17	18	19	22	27	—11	金
戊午 _{初一(26)}	1	10	15	21	24	30	35	—12	火
乙丑 _{初八(2)}	5	13	23	27	28	30	35	—19	金
壬申 _{十五(9)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	金 (未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上述箭头所示的平行对应,位置(5)——新历(9)之前出现一个变化的较明显临界点(杂主题和纯主题的混合主题配搭已达3次),所以位置(5)与新历(9)就不会再组成杂主题对应,即:(9)←[⊗]→[1],从而位置(5)就可以排除尾数为[1]的号码了。至于能否排除尾数为[9]的号码,则还应该结合其他预测方式的结果再作最后的取舍。例 8 与例 7 互相比对可知,这是具体问题具体分析的结果。

例 9:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24	—10	金
辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36	—31	土
戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27	—7	土
乙酉 _{三十(22)}	10	15	18	19	21	26	35	—2	水
壬辰 _{初七(29)}	7	8	9	16	18	26	34	—28	水
己亥 _{十四(5)}	1	11	12	23	26	28	31	—2	木
丙午 _{廿一(12)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)	水 (未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(5)——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(杂主题和纯主题的混合主题配搭已达4次),所以位置(2)与新历(5)就不会再组成主题对应,即 $(5) \xleftrightarrow{\textcircled{\times}} [0] \text{ 或 } [5]$,从而位置(2)就可以排除尾数为[0]和[5]的号码了。

例 10:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁巳 _{廿五(29)}	9	14	22	25	27	28	29	—	26	土
甲子 _{初二(7)}	1	5	6	19	20	23	35	—	11	金
辛未 _{初九(14)}	2	5	9	21	25	28	32	—	31	土
戊寅 _{十六(21)}	6	10	22	23	28	33	34	—	3	土
乙酉 _{廿三(28)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	水
壬辰 _{三十(4)}										

(注:其他资料略)

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(4)——位置(3)之前出现一个变化的较明显的临界点(杂主题配搭对应达3次),所以位置(3)与新历(4)就不会再组成杂主题对应,即: $(4) \xleftrightarrow{\textcircled{\times}} [6]$,从而位置(3)就可以排除尾数为[6]的号码。至于能否再排除尾数为[4]的号码,则还应结合其它预测方式的结果再作最后的取舍。

例 11:广东 7/36 某阶段中奖号码第 12 位的等距离排列系统:(即地支系统)

.....

壬午 _{十九(25)}	3	7	8	18	24	25	29	—	1	木
丙午 _{十四(18)}	1	8	11	15	21	29	35	—	23	水

(注: 其他资料略)

庚午初十(11)	10	17	19	24	27	33	35—7	土
甲午初六(3)	3	6	7	17	23	24	36—22	金
戊午初一(26)	1	10	15	21	24	30	35—12	金
壬午廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35—28	木
丙午廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34—13	水
庚午十七(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土 (未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的平行对应,新历(4)——位置(5)之前出现一个较明显的临界点(杂主题和纯主题的混合主题配搭对应已达4次),所以位置(5)与新历(4)就不会再组成杂主题或纯主题对应,即:(4)←⊗→[4]或[6],从而位置(5)就可以排除尾数[4]或[6]的号码了。

例 12:广东 7/36 某阶段中奖号码第 12 位的号码等距离环环相比系统:

.....

壬午廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35 — 28
丙午廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34 — 13
己丑初三(27)	5	6	12	21	30	31	35 — 4
癸丑廿八(19)	3	6	8	20	27	28	35 — 33
丙申初十(3)	2	6	7	11	12	17	23 — 19
庚申初六(26)	4	9	10	29	33	34	35 — 3
癸卯十七(10)	3	14	15	28	32	34	36 — 2
丁卯十三(3)	3	5	27	28	30	31	36 — 34
庚戌廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30 — 34
甲戌二十(10)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) — (8)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应,新历(17)——位置(5)之前出现一个变化的较明显临界点(纯主题配搭对应已达3次),所以位置(5)与新历(17)就不会再组成纯主题配搭对应,即:(17)← \otimes →[7],从而位置(5)就可以排除尾数为[7]的号码了。至于能否排除尾数为[3]的号码,则还应结合其它的预测结果再作最后的取舍。

例 13:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

乙未	初五(6)	6	7	17	27	30	33	34—5	金(52)	[火、木]	[己丑、癸丑]
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31—25	金(45)	[火、木]	[丙申、庚申]
己酉	十九(20)	3	4	6	22	23	33	36—29	土(38)	[金、水]	[癸卯、乙卯]
丙辰	廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24—32	土(31)	[金、水]	[庚戌、壬戌]
癸亥	初三(4)	7	9	11	14	19	21	32—36	水(24)	[土、火]	[丁巳、乙巳]
庚午	初十(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	土(17)	[金、水]	[甲子、丙子]
(未开奖,需预测)									↑	⊗	↑

——如上述箭头所示的平行对应,相冲岁数(17)——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(混合主题配搭对应已达4次),所以位置(4)与相冲岁数(17)尾数就不会再组成杂主题或纯主题配搭关系,即:(17)← \otimes →[7]或[3],从而位置(4)就可以排除尾数为[3]和[7]的号码了。

例 14:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸亥	初十(28)	3	15	18	25	26	27	32—8	水(25)	[土、火]	[丁巳、乙巳]
庚午	十七(4)	7	21	25	26	28	32	34—31	土(18)	[金、水]	[甲子、丙子]
丁丑	廿四(11)	10	14	15	18	21	31	36—4	水(11)	[土、火]	[辛未、己未]
甲申	初二(18)	5	7	12	20	22	26	29—3	水(64)	[土、火]	[戊寅、丙寅]
辛卯	初九(25)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木(57)	[水、土]	[乙酉、己酉]
戊戌	十六(2)	(未开奖,需预测)							木(50)	[水、土]	[壬辰、丙辰]

如上述箭头所示的斜线对应,位置(2)——相冲岁数(50)之前出现一个变化的明显临界点(纯主题配搭关系已达3次),所以位置(2)与相冲岁数(50)尾数就不会再产生纯主题配搭对应,即: $[0] \xleftrightarrow{\otimes} [0]$,从而位置(2)就可以排除尾数为[0]的号码了。至于能否再排除尾数为[5]的号码,还应结合其它预测结果再作取舍。

例 15:广东 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛亥	廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27	—	11	金(36)	[火、木][乙巳、己巳]
戊午	初一(26)	1	10	15	21	24	30	35	—	12	火(29)	[木、金][壬子、甲子]
乙丑	初八(2)	5	13	23	27	28	30	35	—	19	金(22)	[火、木][己未、癸未]
壬申	十五(9)	3	17	23	26	30	35	36	—	28	金(15)	[火、木][丙寅、庚寅]
己卯	廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33	—	10	土(68)	[金、水][癸酉、乙酉]
丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	—	8	土(61)	[金、水][庚辰、壬辰]
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	—	19	水(54)	[土、火][丁亥、乙亥]
庚子	十四(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	土(48)	[金、水][甲午、丙午]

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,位置(8)——相冲岁数(54)之前出现一个变化的明显临界点,(混合主题配搭关系已达5次,这种情况很少出现),所以位置(8)与相冲岁数(54)尾数就不会再产生纯主题或杂主题配搭对应,即: $(54) \xleftrightarrow{\otimes} [4]$ 或 $[6]$,从而位置(8)就可以排除尾数为[4]和[6]的号码了。

[重要说明]

1. 相冲岁数(尾数)用于彩票中奖号码预测过程中,只不过是应用其本身有一定变化规律的数字排列体系作为相对标准参照物;相冲岁数(尾数)可以被视作为一个已知的、固定的“标准号

码”，它的五行属性就是该尾数相应的五行属性。

2. 在实际预测应用过程中，无需探究“相冲岁数”这个传统文化的概念到底是怎么回事。

例 16: 广东 7/36 某阶段中奖号码同名纳音[木]系统:

.....

癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	—	18	木(64)	[水、土][丁丑、辛丑]
庚寅	初三(28)	8	12	17	18	22	30	32	—	28	木(57)	[水、土][甲申、戊申]
辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	—	30	木(27)	[水、土][乙卯、己卯]
戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23	—	30	木(20)	[水、土][壬戌、丙戌]
壬午	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35	—	28	木(66)	[水、土][丙子、庚子]
己亥	十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	木(49)	[水、土][癸巳、丁巳]
癸丑	廿八(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木(35)	[水、土][丁未、辛未]
(未开奖,需预测)												

——如上述箭头所示的斜线对应，位置(5)——相冲岁数(49)之前出现一个变化的较明显临界点(纯主题和杂主题的混合主题配搭关系已达4次)，所以位置(5)与相冲岁数(49)尾数就不会再产生纯主题或杂主题配搭对应，即： $[9] \xleftrightarrow{\otimes} [9]$ 或 $[1]$ ，从而位置(5)就可以排除尾数为[9]或[1]的号码了。

例 17: 广东 7/36 某阶段中奖号码第4位的等距离环环相比系统:

.....

{	庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30	—	34	(38)
	戊寅	廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	—	7	(10)
{	丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36	—	26	(31)
	乙酉	三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2	(63)

{	甲子初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	—	10	(24)
	壬辰初七(29)	7	8	9	16	18	26	34	—	28	(56)
{	辛未十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31	(17)
	己亥十四(5)	1	11	12	23	26	28	31	—	2	(49)
{	戊寅廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	—	7	(10)
	丙午廿一(12)	4	12	17	20	22	24	34	—	13	(42)
{	乙酉三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2	(63)
	癸丑廿八(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	(35)

(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应,相冲岁数(63)——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点(杂主题和纯主题的混合主题配搭关系已达4次),所以相冲岁数(63)尾数与位置(4)就不会再产生杂主题或纯主题配搭对应,即: $[3] \xleftrightarrow{\otimes} [3]$ 或 $[7]$,从而位置(4)就可以排除尾数为 $[3]$ 或 $[7]$ 的号码了。

[重要说明]

1. 预测推算的过程就是逐个位置号码按步就班地展开;
2. 依次使用已建立的各个系统:充分搜索和识别各种变化状态的明显或较明显临界点,对于少数能作出肯定预测结论的则抓住“机会”,对于大多数模糊不清的“机会”只能暂时放弃了;
3. 确认某一类系统某一种变化状态就是较明显或明显临界点之标准的功夫一定马虎不得,必须一次性花“力气”对至少一年半的系统号码进行逐个、逐项对比,并在总体趋势上把握住该类变化状态的“最高记录”以及“次最高记录”。
4. 变化状态的过程就是一个“轨迹”,临界点就是产生改变的机会点。

5. 本书所列举的例子大多数是以广东体彩 36 选 7(简称广东 7/36) 作为各种预测方法的说明, 这样以便于大家在学习过程中有一个连贯性; 其实任何一种游戏规则下的彩票, 其预测方式、预测方法均是相通的、一致的! 只不过其区别在于: 同一类变化状态的各种临界点稍微有出入。灵活与严谨地进行“以变应变, 以不变应万变”, 则可以预测推算不同种类彩票的各个位置号码!

第五节 号码——位置号码生克轨迹对应预测法

号码——位置号码生克轨迹对应预测法, 就是指在干支数字信息载体总系统(包含其他各个系统)中, 号码尾数间若干对进行同等位置的、逐项的、逐个位置的五行属性的生克关系对应, 通过记录若干对两者间在对应过程中共同产生的生克关系对应的次数与方向, 确认这种变化状态的临界点, 根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

本预测法与标准参照系各信息载体——位置号码生克轨迹对应预测法的预测程序和预测方法几乎是一致的。

原则与方法:


(一) 选定适用的系统: 总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列演变系统。[注: 号码等距离环环相比系统不太适用]

(二) 检索和找出: 识别号码——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准:

①相刑为 3—4 次, 同一方向相克达或相生达 4—5 次;

②同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为 6—7 次(很少达 7 次);

③混合轨迹对称的方向来回达 3—4 次, 即:



(注:只考虑方向及次数,不考虑是否相生和相克)。

(三)搜索、判断和确认需要预测的位置号码的变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比:当然具体问题还须具体分析。原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码,同一预测内容,必须坚持“事应过三”验证法则,最后综合各项的初步预测结果得出最后的预测结论。原则是:必须保证预测结论是准确的。

[说明]

本书所列举的广东南粤风采中奖号码均是以 2001 年(逢星期一)(第一次)开奖号码作为例子,特别号码与基本号码混在一起考虑。

例 1:广东南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....									
庚午 _{十五(7)}	25	26	27	30	31	33	36	土	(注:其他资料略)
丁丑 _{廿二(14)}	1	3 _刑	7	8	19	26	27	水	
甲申 _{廿九(21)}	8	9 _刑	11	27	31	34	36	水	
辛卯 _{初六(28)}	1	2 _刑	13	25	31	32	34	木	
戊戌 _{十三(4)}	2	11 _刑	16	18	19	22	31	木	
乙巳 _{二十(11)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖,需预测)	

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 2——位置(3)之前出现一个变化的较明显临界点(相刑已达 3 次), 所以号码 2 与位置(3)就不会再产生相刑关系轨迹对应, 即: $2 \leftarrow \textcircled{\times} \rightarrow$ 火, 从而位置(3)就可以排除属火的号码[2]和[7]了。

例 2: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码第 2 位的等距离排列系统:

.....

丁丑	廿二(14)	1	3	7	8	19	26	27	水
甲申	廿九(21)	8	9	11	27	31	34	36	水
辛卯	初六(28)	1	2	13	25	31	32	34	木
戊戌	十三(4)	2	11	16	18	19	22	31	木
乙巳	二十(11)	5	7	11	20	28	31	32	火
壬子	廿七(18)	3	12	19	23	26	33	34	木
己未	初五(25)	2	4	8	20	22	35	36	火
丙寅	十二(2)	2	3	9	27	28	32	35	火
癸酉	十九(9)	11	14	19	20	21	22	29	金
庚辰	廿六(16)	1	4	12	19	20	22	24	金
丁亥	初三(23)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	土

(注: 其他资料略)

↓ 即:

丁丑	廿二(14)	1	3	7	8	19	26	27	水
辛卯	初六(28)	1	2	13	25	31	32	34	木
乙巳	二十(11)	5	7	11	20	28	31	32	火
己未	初五(25)	2	4	8	20	22	35	36	火
癸酉	十九(9)	11	14	19	20	21	22	29	金
丁亥	初三(23)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	土 (未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的垂直对应，号码 20——位置 (4) 之前出现一个变化的较明显临界点（相刑已经达 3 次），所以号码 20 与位置 (4) 就不会再产生相刑关系轨迹对应，即 $20(\text{土}) \xleftrightarrow{\otimes} \text{土}$ ，从而位置 (4) 就可以排除属土的关系轨迹 [0] 和 [5] 了。

例 3: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬辰初六(29)	2	10	13	15	21	27	31	水
己亥十三(5)	10	15	20	26	27	33	34	木
丙午二十(12)	1	12	16	20	21	24	27	水
癸丑廿七(19)	1	2	3	10	11	28	34	木
庚申初四(26)	5	8	10	15	21	26	36	木
丁卯十一(5)	3	16	18	25	30	35	36	火
甲戌十八(12)	2	7	8	11	13	22	24	火
辛巳廿五(19)	1	6	8	15	17	23	32	金
戊子初二(26)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应，号码 1——位置 (4) 之前现一个变化的明显临界点（相刑竟达 5 次），所以号码 1 与位置 (4) 就不会再产生相刑关系轨迹对应，即: $1(\text{水}) \xleftrightarrow{\otimes} \text{水}$ ，从而位置 (4) 就可以排除属水的号码 [1] 和 [6] 了。

[说明]

出现相刑关系竟达 5 次，这种情形极为罕见。遇上这种偶然出现的“最高记录”，可忽略不计。抓住 99%，放弃 1%。

例 4: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙子 _{廿三(10)}	2	5	26	27	32	33	35	水
癸未 _{初一(17)}	10	12	22	29	34	35	36	木
庚寅 _{初八(24)}	1	7	9	15	22	26	32	木
丁酉 _{十五(1)}	6	8	18	25	27	28	33	火
甲辰 _{廿二(8)}	1	3	18	22	23	25	34	火
辛亥 _{廿九(8)}	7	8	18	26	28	34	35	金
戊午 _{初六(22)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 7——位置 (3) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生关系已达 4 次), 所以号码 7 与位置 (3) 就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即 7(火) $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{生}}$ 土, 从而位置 (3) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0] 了。

例 5: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊申 _{廿四(13)}	2	10	12	14	25	27	35	土
乙卯 _{初二(20)}	13	15	16	17	18	31	36	水
壬戌 _{初九(27)}	8	9	11	16	17	24	33	水
己巳 _{十六(3)}	3	7	18	26	28	35	36	木
丙子 _{廿三(10)}	2	5	27	28	32	33	35	水
癸未 _{初一(7)}	10	12	22	29	34	35	36	木
庚寅 _{初八(24)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 22——位置 (1) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生关系已达 4 次),

所以号码 22 与位置 (1) 就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应,即:22(火) $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 土,从而位置(1)就可以排除属土的号码[5]和[0]了。

例 6:南粤风采 7/36 某阶段中奖号码第 2 位的等距离排列系统:

.....

甲戌	十八(12)	2	7	8	11	13	22	24	火
辛巳	廿五(19)	1	6	8	15	17	23	32	金
戊子	初二(26)	4	12	18	19	22	33	35	火
乙未	初九(2)	2	5	9	22	26	27	34	金
壬寅	十六(9)	5	7	13	18	19	25	36	金
己酉	廿三(16)	2	9	10	21	27	29	34	土
丙辰	初一(23)	5	8	17	21	23	28	32	土
癸亥	初八(30)	5	10	13	30	32	35	36	水
庚午	十五(7)	25	26	27	30	31	33	36	土
丁丑	廿二(14)	1	3	7	8	19	26	37	水
甲申	廿九(21)	8	9	11	27	31	34	36	水
辛卯	初六(28)	1	2	13	25	31	32	34	木
戊戌	十三(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木(未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

↓ 即:

甲戌	十八(12)	2	7	8	11	13	22	24	火
戊子	初二(26)	4	12	18	19	22	33	35	火
壬寅	十六(9)	5	7	13	18	19	25	36	金
丙辰	初一(23)	5	8	17	21	23	28	32	土
庚午	十五(7)	25	26	27	30	31	33	36	土
甲申	廿九(21)	8	9	11	27	31	34	36	水
戊戌	十三(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木(未开奖,需预测)

(注:其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 34——位置 (7) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生关系已达 4 次), 所以号码 34 与位置 (7) 就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应, 即 $34(\text{金}) \xleftarrow[\otimes]{\text{生}} \text{土}$, 从而位置 (7) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0] 了。

例 7: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

丙午二十(12)	1	12	16	20	21	24	27	水	(注: 其他资料略)
癸丑廿七(19)	1	3	10	11	20	28	34	木	
庚申初四(26)	5	10	15	18	21	26	36	木	
丁卯十一(5)	3	16	18	25	30	35	36	火	
甲戌十八(12)	2	7	8	11	13	22	24	火	
辛巳廿五(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	金(未开奖, 需预测)	

——如上述箭头所示的垂直对应, 号码 7——位置 (2) 之前出现一个“疑点” (同一方向的相克关系仅达 3 次); 但是根据“具体问题具体分析”的准则, 从南粤风采已有的开奖号码历史数据搜索可知: 正常顺序下的垂直对应, 绝大多数情形的变化状态的临界点往往当同一方向的相克关系轨迹对应达 3 次时就是机会点。这点与广东 7/36 体彩有所区别: 同一方向的相克关系轨迹对应 4—5 次时才是机会点。这就是“一方彩票一方特点”的体现, 也就是预测推算之准则的灵活运用。

所以上例号码 7 与位置 (2) 就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应, 即 $7(\text{火}) \xrightarrow[\otimes]{\text{克}} \text{金}$, 从而位置 (2) 就可以排除属金的号码 [4] 和 [9] 了。

例 8: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

乙卯初二(20)	13	15	16	17	18	31	36	水
壬戌初九(27)	8	9	11	16	17	24	33	水
己巳十六(3)	3	7克	10	18	26	28	35	木
丙子廿三(10)	2	5	26	27	32	33	35	水
癸未初一(17)	10	12	15	22	29	34	36	木
庚寅初八(24)	1	7	9	14	15	22	32	木
丁酉十五(1)	6	8	18	25	27	28	33	火
甲辰廿三(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 27——位置 (7) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相克关系轨迹已达 4 次), 所以号码 27 与位置 (7) 就不会再产生同一方向的相克关系对应, 即: 27(火)← $\begin{smallmatrix} \text{克} \\ \otimes \end{smallmatrix}$ —水, 从而位置 (7) 就可以排除属木的号码 [3] 和 [8] 了。

例 9: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....								
壬寅十六(9)	5	7	13	18	19	25	36	金
己酉廿三(16)	2	9	10	21	27	29	34	土
丙辰初一(23)	5	8	21	23	28	32	35	土
癸亥初八(30)	5	10	13	30	34	35	36	水
庚午十五(7)	25	27	30	31	33	34	36	土
丁丑廿二(14)	1	3	7	8	26	37	29	水
甲申廿九(21)	8	9	11	27	31	34	36	水
辛卯初六(28)	1	2	13	25	31	32	34	木
戊戌十三(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的垂直对应，号码 19——位置 (4) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应已达 6 次)，即 $25(\text{土}) \xrightarrow{\text{生} \otimes} \text{金}$ ，或 $25(\text{土}) \xrightarrow{\text{克} \otimes} \text{水}$ ，从而位置 (4) 就可以排除属水的号码 [1] 和 [6]，以及属金的号码 [4] 和 [9] 了。

例 10：南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

癸酉 _{十九(9)}	11	14	19	20	21	22	29	金
庚辰 _{廿六(16)}	1	4	19	20	22 _克	24	32	金
丁亥 _{初三(23)}	5	13	17	21	24 _生	31	25	土
甲午 _{初十(30)}	2	4	11	17	24 _克	25	26	金
辛丑 _{十七(6)}	1	2	12	15	19 _克	29	33	土
戊申 _{廿四(13)}	2	10	12	14	27 _克	30	35	土
乙卯 _{初二(20)}	13	15	16	18	29 _克	31	36	水
壬戌 _{初九(27)}	8	9	11	15	17 _{⊗生或克}	23	24	水
己巳 _{十六(3)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木(未开奖,需预测)

(注: 其他资料略)

如上述箭头所示的斜线对应，号码 24——位置 (4) 之前出现一个变化的较明显临界点 (同一方向的相生和相克关系混合轨迹对应已达 6 次)，所以号码 24 与位置 (4) 就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应，即： $\text{土} \xrightarrow{\text{生} \otimes} (\text{金}) 24$ ，或 $\text{火} \xrightarrow{\text{克} \otimes} (\text{金}) 24$ ，从而位置 (4) 就可以排除属土的号码 [5] 和 [0]，以及属火的号码 [2] 和 [7] 了。

例 11：南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系

统：

.....

己巳十六(3)	3	6	7	18	26	28	35	木
丙子廿三(10)	2	5	26	27	32	33	35	水
癸未初一(17)	10	12	22	29	34	35	36	木
庚寅初八(24)	1	7	9	15	22	26	32	木
丁酉十五(1)	6	8	18	25	27	28	33	火
甲辰廿二(8)	1	3	18	23	25	29	34	火
辛亥廿九(15)	7	8	18	26	28	34	35	金
戊午初六(22)	1	11	16	23	26	31	36	火
乙丑十三(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	金(未开奖,需预测)

(注：其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应，号码1——位置(5)之前出现一个变化的较明显临界点（对称的方向混合轨迹来回已达3次），所以号码1与位置(5)就不会再产生来回对称的方向之轨迹对应，即1(水) $\xrightarrow{\text{生}} \text{木}$ ，或1(水) $\xrightarrow{\text{克}} \text{火}$ ，从而位置(5)就可以排除属木的号码[3]和[8]，以及属火的号码[2]和[7]了。

例 12：南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

戊寅廿一(15)	5	8	12	14	23	25	35	土
乙酉廿八(22)	4	7	13	23	25	30	35	水
壬辰初六(29)	2	10	13	21	21	27	31	水
己亥十三(5)	10	15	20	26	27	33	34	木
丙午二十(12)	1	12	16	20	21	24	27	水

(注：其他资料略)

癸丑 _{廿七(19)}	1	2	3	10	11	28	34	木
庚申 _{初四(26)}	5	10	15	18	21	26	36	木
丁卯 _{十一(5)}	3	16	18	25	30	35	36	火
甲戌 _{十八(12)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖,需预测)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 3——位置 (2) 之前出现一个变化的较明显临界点 (对称的方向混合轨迹来回已达 3 次), 所以号码 3 与位置 (2) 就不会再产生来回对称的方向的轨迹对应, 即: $3(\text{木}) \xleftarrow{\text{生} \otimes} \text{水}$, 或 $3(\text{木}) \xleftarrow{\text{克} \otimes} \text{金}$, 从而位置 (2) 就可以排除属水的号码 [1] 和 [6], 以及属金的号码 [4] 和 [9] 了。

[重要说明]

1. 号码——位置号码生克轨迹对应预测法与标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测法的预测方式和方法几乎是一致的; 在同等条件下相比较, 前者识别变化的明显临界点之“最高记录”和“次最高记录”往往比后者超过 1—2 次。

2. 每一个位置号码间任意均可以进行垂直对应、平行对应以及斜线对应; 在对应过程中要千方百计搜索和判断出变化状态的明显临界点; 明显者一定不能放过机会, 不明显者决不勉强使用, 以免产生错误!

第六节 号码——位置号码主题轨迹对应预测法

号码——位置号码主题对应预测法, 就是在干支数字信息载体总系统 (包含其他各个系统) 中, 号码与号码间若干对进行同等位置的、逐项的、逐个位置的主题配搭对应, 通过记录若干对两者间在对应过程中能共同组成主题的次数, 确认该主题变化状态的临界点, 根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

的。

本预测法与标准参照系（各信息载体）——位置号码主题轨迹对应预测法的预测程序和预测方法几乎是一致的。

原则与方法：

（一）选定适用的系统：总系统、干支系统、纳音系统、主题系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

（二）检索和找出：识别号码——位置号码主题轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”之标准。

①均是纯主题或杂主题为：3—4次；

②纯主题和杂主题混合配搭为：4—5次。

（三）搜索、判断和确认需要预测的位置号码的变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比，当然具体问题还须具体分析。原则是：明显者用之，不明显者弃之。

（四）作出初步预测结果：根据识别出的变化明显临界点作出相应的排除和舍弃。

（五）同一位置号码，同一预测内容，必须坚持“事应过三”验证法则，最后综合各项的初步预测结果得出最终的预测结论。原则是：必须保证预测结论是准确的。

例 1：南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

乙未初九(2)	2	5	9	22	26	27	34	金
壬寅十六(9)	5	7	13	18	19	25	36	金
己酉廿三(16)	2	10	19	21	27	29	34	土
丙辰初一(23)	5	8	17	21	23	28	32	土
癸亥初八(30)	5	10	13	30	32	35	36	水
庚午十五(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	土(未开奖,需预测)

（注：其他资料略）

如上述箭头所示的斜线对应, 号码 5——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点 (杂主题配搭对应已达 3 次), 所以号码 5 与位置(2)就不会再产生杂主题对应, 即: $5 \leftarrow \otimes \rightarrow [0]$, 从而位置(2)就可以排除尾数为 [0] 的号码, 至于尾数为 [5] 的号码能否被排除, 还应结合其他预测方式的结果再作取舍。

例 2: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丁丑	廿二(14)	1	3	7	8	19	26	27	水
甲申	廿九(21)	8	9	11	27	31	34	36	水
辛卯	初六(28)	1	2	13	25	31	32	34	木
戊戌	十三(4)	2	11	16	19	22	25	31	木
乙巳	二十(11)	5	7	11	20	31	32	35	火
壬子	廿七(18)	12	19	23	\otimes 26	33	34	36	木
己未	初五(25)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火(未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的斜线对应, 号码 19——位置(5)之前出现一个变化的较明显临界点 (杂主题和纯主题混合配搭已达 4 次), 所以号码 19 与位置(5)就不会再产生杂主题或纯主题配搭对应, 即 $19 \leftarrow \otimes \rightarrow [9]$ 或 [1], 从而位置(5)就可以排除尾数为 [9] 和 [1] 的号码了。

例 3: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙午	廿十(12)	1	12	16	20	21	24	27	水
癸丑	廿七(19)	1	2	3	10	11	28	34	木
庚申	初四(26)	5	8	10	15	21	26	36	木
丁卯	十一(5)	3	16	18	25	30	35	36	火
甲戌	十八(12)	2	7	8	11	13	22	\otimes 24	火
辛巳	廿五(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	金(未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述箭头所示的垂直对应, 号码 24——位置 (7) 之前出现一个变化的疑点 (垂直方向的混合主题配搭对应达 3 次), 依一般情况而言, 这种“疑点”还不能视作较明显临界点, 能否断定或排除尾数 [4] 或 [6] 的号码, 可以结合其他预测方式的结果再作最终取舍。

若从“具体问题具体分析”的准则来说, 搜索目前已开奖的南粤风采的历史数据, 号码间垂直对应时, 若混合主题配搭对应达 3 次者则几乎可以认定就是一个临界点。

例 4: 南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬辰初六(29)	2	10	13	15	21	27	31	水
己亥十三(5)	10	15	20	26	27	33	34	木
丙午二十(12)	1	12	16	20	21	24	27	水
癸丑廿七(19)	1	2	3	10	11	28	34	木
庚申初四(26)	5	8	10	15	21	26	36	木
丁卯十一(5)	3	16	18	25	30	35	36	火
甲戌十八(12)	2	7	8	⊗ 11	13	22	24	火
辛巳廿五(19)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	金(未开奖, 需预测)

(注: 其他资料略)

——如上述所示的斜线对应, 号码 2——位置 (5) 之前出现一个变化的较明显临界点 (纯主题和杂主题的混合配搭对应已达 4 次), 所以号码 2 与号位置 (5) 就不会再产生杂主题或纯主题配搭对应, 即: $2 \xleftrightarrow{\otimes} [8]$ 或 $[2]$, 从而位置 (5) 就可以排除尾数为 [2] 和 [8] 的号码了。

[重要说明]

不仅号码间的主题配搭产生若干次的“最高记录”和“次最高

记录”可以用来识别变化状态的临界点，而且号码间在很多时候两者间并不容易产生主题配搭，这种现象完全可以用来识别该种变化状态的临界点同样可以达到预测目的。

总之，具体问题必须具体分析，以“变”应“变”才是正确的上策。这种预测技巧只能通过长期的实践去提升。

作出最后的预测结论时，必须把同一个位置号码的所有预测推算过程（内容）进行一次综合（注：在预测推算时，必须一边推算，一边作相应的记录）。排除有充分的、足够的“依据”、“理由”的位置号码（尾数或五行属性）。

第七节 九宫星——位置号码生克轨迹对应预测法

所谓九宫星即——白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫，是指天体辐射在地球上所造成的九种情况，这九种情况依节气时刻不同而有所变更，但其移动顺序是按固定路线而动的。所以九宫星图又称九气图，根据九个方位，标上各自的色彩名称，其图为：

方位	北	西南	东	东南	中央	西北	西	东北	南
九星	一白	二黑	三碧	四绿	五黄	六白	七赤	八白	九紫
对应的五行	水	土	木	木	土	金	金	土	火

在阴阳合历（或通胜日历）中，每日均有不同的九宫星；在日历中，九宫星依新历日子按顺序排列，每天依次序移动：一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫、一白、二黑、……，这种固定顺序循环不变。所以在同一种、同一类的日历只要查到某日的九宫星是什么，自己就可以每日依顺序推算出其相应的九宫星了。当然，正宗的通胜日历每日都有记载当日的九宫星，一查便

知开奖日的九宫星。

为了避免由于每年更换日历而导致每日的“九宫星”记载因日历不同版本而出现前后不一的错误,更换日历前,新、旧日历必须进行核对每日“九宫星”的排列顺序是否一致、衔接。若新日历与旧日历的“九宫星”排列顺序有出入,则还是依旧日历的顺序来循环推算出今后开奖日所对应的“九宫星”。因为彩票中奖号码预测对“九宫星”这个“标准参照物”的使用一是其排列的规律性,二是其相对应的五行属性,所以,开奖日的“九宫里”的排列必须是长期地要前后一致。

九宫星图(即九气图)是中国古代先贤们在功能状态下所感知的宇宙背景能量辐射的九种不同颜色在不同方位上的反映,这是一种客观自然规律的描述。

在彩票中奖号码的预测过程中,我们只是应用九宫星作为“标准参照系”,通过它与开奖日的中奖号码进行生克关系对应,反映出该种变化状态的临界点。所以,我们不必要去深入探究“九宫星”到底是怎样的一回事。

九宫星——位置号码生克轨迹对应预测法,就是指开奖日的九宫星与系统各个位置号码间,若干对在同等位置进行的生克关系对应的预测法。通过记录若干对两者间在对应过程中其产生的生克关系的次数与方向,确认这种变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

原则与方法:

(一)选定适用的系统:总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。


(二)检索和找出:识别九宫星——位置号码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准:

①九宫星——位置号码进行相生、相克(相刑)关系对应时,

同一方向的相生或相克或相刑为：相刑 2—3 次（很少达 3 次）；同一方向相生或相克为 3—4 次（很少达 4 次）。

②九宫星——位置号码进行相生、相克（不含相刑）关系对应时，同一方向的相生和相克的混合轨迹为：4—5 次（偶然达 6 次）。

③九宫星——位置进行相生或相克（不含相刑）混合轨迹对应，对称的方向来回混合轨迹达 3—4 次时。即：



（三）搜索、判断和确认需要预测的位置号码的变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比；具体问题具体分析。原则是：明显者用之，不明显者弃之。

（四）作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

例 1：某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

开奖当日所对应的九宫星									
壬辛	廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35—28	七赤
己丑	初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	九紫
丙申	初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	二黑
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	四绿
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30—34	六白
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—26	八白

（其他资料省略）

甲子初九(1) 1 8 11 15 17 20 24—10 九紫
辛未十六(8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 七赤(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应,位置(5)——七赤之前出现一个变化的明显临界点(相刑已达3次),所以位置(5)与七赤就不会再发生相刑的关系;即金 $\xrightarrow{\otimes}$ 七赤,从而位置(5)就可以排除属金的[4]、[9]号码了。

例2:某地36选7某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬午廿六(20)	1	5	6	9	15	33	35—28	七赤
己丑初三(27)	5	6	12	21	30	31	35—4	九紫
丙申初十(3)	2	6	7	11	12	17	23—19	二黑
癸卯十七(10)	3	14	15	28	32	34	36—2	四绿
庚戌廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30—34	六白
丁巳初二(24)	2	8	13	20	25	31	36—26	八白
甲子初九(1)	7	8	11	15	17	20	24—10	九紫
辛未十六(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	七赤(未开奖,需预测)

(其他资料省略)

——如上图箭头所示的斜线对应,位置(1)——九紫之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的生克混合轨迹已达4次),所以位置(1)与九紫之间就不会再产生同一方向的相生或相克关系的对应,即:水 $\xrightarrow{\otimes}$ 九紫(火),木 $\xrightarrow{\otimes}$ 九紫(火),从而位置(1)就可以排除属水、属木的号码[1]、[6]、[3]、[8]了。

例3:香港47选6某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

癸丑	廿八(19)	1	8	14	29	33	44—5	四绿
庚申	初六(26)	14	15	19	24	32	39—47	二黑
丁卯	十三(3)	4	11	15	28	29	40—16	九紫
甲戌	二十(10)	9	15	31	33	38	41—44	七赤
辛巳	廿七(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(8)	七赤(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，位置(3)——五黄之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生轨迹已达3次)，所以位置(3)与五黄就不会再产生同一方向的相生关系对应，即金 $\xleftarrow{\text{生}}\text{五黄}$ (土)，从而位置(3)就可以排除属金的号码[4]和[9]了。

例 4:南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

● ● ● ● ● ●

								纳音	开奖日的九宫星
辛未 _{十四(8)}	5	9	10	13	30	31	36	土	六白
戊寅 _{廿一(15)}	5	8	12	14	23 _生	25	35	土	八白
乙酉 _{廿八(22)}	4	7	13	23	25 _克	30	35	水	一白
壬辰 _{初六(29)}	2	10	13	15	21 _克	27	31	水	三碧
己亥 _{十三(5)}	10	15	20	26	27 _克	33	34	木	五黄
丙午 _{二十(12)}	1	12	16	20	21 _生	24	27	水	七赤
癸丑 _{廿七(19)}	1	2	3	10	11 _生	28	34	木	九紫
庚申 _{初四(26)}	5	8	10	15	21 _{生或克}	26	36	木	二黑
丁卯 _{十一(5)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火	四绿

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，位置(1)——九宫星“二黑”之前出现一个变化的明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹对应竟达6次)，所以位置(1)与九宫星二黑就不会再产生同一方向的相生或相克轨迹对应，即：二黑(土) $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ 金，二黑(土) $\xrightarrow{\text{克}\otimes}$ 水，从而位置(1)就可以排除属金的号码[4]和[9]，以及属水的号码[1]和[6]了。

[说明]

开奖日的其它各个标准参照系的信息载体与位置号码进行生克关系混合轨迹对应时，产生变化的明显临界点的次数可达6—7次，而九宫星这个信息载体与位置号码进行生克关系混合轨迹对应，产生变化的明显临界点极少达6次，绝大多数的机会点为4—5次。

例5：南粤风采7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

壬子 廿七(18)	3	12	19	23	26	33	34	木	三碧
己未 初五(25)	2	4	8	20	22	35	36	火 刑	一白
丙寅 十二(2)	2	3	9	27	28	32	35	火 刑	八白
癸酉 十九(9)	11	14	19	20	21	22	29	金 刑	六白
庚辰 廿六(16)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	金 刑	四绿

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的平行对应，位置(7)——九宫星“四绿”之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系已经达3次)，所以位置(7)与九宫星四绿就不会再产生相刑关系的轨迹对应，即：木 $\xleftrightarrow{\otimes}$ (木)四绿，从而位置(7)就可能排除属木的号码[3]和[8]了。

例6：南粤风采7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丁亥初三(23)	5	13	17	20	21	24	31	土	二黑
甲午初十(30)	2	4	11	17	24	25	26	金	九紫
辛丑十七(6)	1	2	8	12	15	19	29	土	七赤
戊申廿四(13)	2	10	12	14	25	27	35	土	五黄
乙卯初二(20)	13	15	16	17	18	31	36	水	三碧
壬戌初九(27)	8	9	11	16	17	24	33	水	一白
己巳十六(3)	3	6	7	18	26	28	35	木	八白
丙子廿三(10)	2	5	26	27	32	33	35	水	六白
癸未初一(17)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	木	四绿 (未开奖,需预测)

——如上图所示的斜线对应,位置(6)——九宫星六白之前出现一个变化的较明显临界点(对称的方向来回混合轨迹已达3次),所以位置(6)与九宫星六白就不会再产生对称的方向来回混合轨迹对应,即六白(金) $\xrightarrow{\text{生}} \text{水}$,六白(金) $\xrightarrow{\text{克}} \text{木}$,从而位置(6)就可以排除属水的号码[1]和[6],以及属木的号码的[3]和[8]了。

[重要说明]

1. 九宫星与位置号码间进行的相生相克(相刑)关系对应,其过程比较容易产生变化状态的明显临界点,所以应高度重视“九宫星”这个标准参照物的预测功能!

2. 九宫星——位置号码行克轨迹对应预测法,与前面章节所介绍的标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测的预测方式和方法是一致的。

3. 本节的预测法在实际应用过程中,可选用或不用。当然“选用”则更能识别出更多的隐蔽的变化临界点。

第八节 九宫星——位置号码主题轨迹对应预测法

所谓九宫星数字,系指一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫中一至九这些数字。

九宫星数字一位置号码主题轨迹对应预测法,就是指开奖日的九宫星数字与系统内各个位置号码间,若干对在同等位置进行的主题搭配关系对应的预测法。通过记录若干对两者间在对应过程中能共同组成主题的次数,确认该主题变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测推算的目的。

原则与方法:

(一) 选定适用的系统;总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

(二) 检索和找出:识别九宫星数字——位置号码主题配搭对应过程中产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”之标准:

①均是纯主题或杂主题为:2—3次(很少达3次)

②纯主题和杂主题的混合主题为:4—5次(很少达5次)

(三) 搜索:判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比,当然具体问题还须具体分析,原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四) 作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

例1:香港47选6某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛酉初五(27)	1	10	24	25	43	47—34	一白
戊辰十二(6)	9	19	20	28	29	35—15	三碧
乙亥十九(13)	7	19	26	36	37	42—33	五黄

壬午 _{廿六(20)}	11	18	20	26	28	47—10	七赤
己丑 _{初三(27)}	5	9	19	32	39	45—13	九紫
丙申 _{初十(3)}	7	10	25	27	33	41—19	二黑
癸卯 _{十七(10)}	3	12	15	18	23	34—42	四绿
庚戌 _{廿四(17)}	4	6	27	30	36	39—10	六白
丁巳 _{初二(24)}	14	18	26	27	33	41—35	八白
甲子 _{初九(1)}	8	19	25	32	41	46—27	九紫
辛未 _{十六(8)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(7)	七赤

——如上图箭头所示的平行对应，位置(2)——七赤之前出现一个变化的明显临界点(纯主题配搭关系已达3次)，所以位置(2)与“七”赤之间就不会再构成纯主题配搭关系，再构成杂主题配搭关系的机会也不大，即“七” $\xrightarrow{\otimes}$ $\begin{cases} [7] \\ [3] \end{cases}$ ，从而位置(2)就可以排除尾数为[7]的号码了，至于能否进一步排除尾数为[3]的号码，还应结合其它不同方式的预测结果如何再作最后的结论。事实证明，位置(2)的开奖号码为“5”。

——又如上图箭头所示的斜线对应，出现很少见的五次混合主题配搭关系对应！

例2：广东36选7某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

甲子 _{初九(1)}	1	8	11	15	17	20	24—10	九紫
辛未 _{十六(8)}	4	8	10	12	23	29	36—31	七赤
戊寅 _{廿三(15)}	8	12	16	17	20	25	27—7	五黄
乙酉 _{三十(22)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	三碧

——如上图箭头所示的平行对应,位置(5)——“三碧”之前出现一个变化的较明显临界点,所以,位置(5)与“三碧”之间就不会再构成杂主题配搭关系对应(但有可能出现纯主题配搭关系对应),即“三” $\leftarrow \otimes \rightarrow$ [7],从而位置(5)就可以排除尾数为[7]的号码了。

[顺注]

本节的预测法在实际应用过程中,可选用或不用。当然“选用”则更能识别出更多的隐蔽的变化临界点。

[重要说明]

1. 标准参照系的各个载体[包括:开奖日的天干、地支、纳音(含相冲资料的天干、地支、纳音)、九宫星和农历尾数、新历尾数、相冲岁数]与各个位置号码间,以及位置号码间的“易理”关系要么是相生,要么是相克,要么是相刑。

标准参照系——位置号码生克轨迹对应以及号码——位置号码生克轨迹对应就是《周易与彩票选号》的预测推算一项关键内容。通过易理与数量的变换衔接,就能把复杂的号码数字简单化、规范化和预测目标化。

其中开奖日的天干、地支、纳音、农历尾数、新历尾数与各个位置号码间,以及位置号码间的生克轨迹对应的预测推算是彩民们必须要熟练掌握的技巧,其他几种特定关系预测方法可选用或不用。当然,选用更多的预测方式和方法则能挖掘出更多的隐蔽的变化临界点,从而排除更多的不可能出现的位置号码。

号码数字主题的建立与设置,则能把尾数为0—9的号码科学地、互相地挂钩对应,为预测推算提供了极大的方便。可以说,善于利用号码数字“主题”的配搭关系能大幅度地排除各个位置号码不可能出没的范围!

第九节 数字——位置号码加法轨迹对应预测法

数字——位置号码加法轨迹对应预测法包括两种：

第一，数字——位置号码等距加法轨迹对应预测法；

第二，数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法。

所谓“数字”，是指干支数字信息载体总系统内标准参照系中的农历尾数，新历尾数、相冲岁数（尾数）、九宫星数字、以及各期的中奖号码尾数。

一、数字——位置号码等距加法轨迹对应预测法

指在干支数字信息载体总系统中（包括各个分系统），若干对的数字与数字间进行位置等距对称相加，所得之和的尾数是一致时，通过记录它们所得之和的尾数是一致的次数，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

原则与方法：

（一）选定适用的系统：总系统、干支系统、纳音系统、主题系统、等距离排列系统、农历系统、新历系统。

（二）检索和找出：识别数字——位置号码等距加法轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

①在正常顺序下的总系统中，数字——位置号码进行等距加法轨迹平行或斜线对应时，若干对相加所得之和的尾数是一致的次数为：2—3次；

②在其它各个分系统中，数字——位置号码间进行平行或斜线对应时，若干对相加所得之和的尾数是一致的，次数为：3—4次（很少达4次）。

③数字——位置号码间进行垂直对应时，正常顺序下，总系统内相加之和的尾数是一致的次数为3—4次（极少达4次）。

[顺注]

每一个需要预测的位置号码可以与各个已知的号码进行“联线配对”以找寻“等值对应”。

在实际预测推算过程中，可用铅笔进行“描绘”轨迹对应过程，事毕后则可擦掉笔迹；当然，预测技巧十分娴熟时则直接“目算”即可，或者可依个人喜好而定，目的只有一个“便于预测推算”。

(三) 搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比；具体问题还须具体分析，原则是：明显者用之，不明显者弃之。

(四) 作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五) 同一位置号码，同一预测内容，必须坚持“事应过三”验证法则，最后综合各项的初步预测结果得出最终的结论。

例 1：广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：
.....

丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35	—	33
甲午初六(3)	3	6	7	17	23	24	36	—	22
辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33	—	8
戊申二十(17)	1	3	17	18	28	30	31	—	36
乙卯廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33	—	35
壬戌初五(31)	3	14	25	28	30	32	34	—	26
己巳十二(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)

(其他资料省略)

——如上图的连线所示的斜线对应, 号码“3”——位置(2)之前出现一个变化的明显临界点, $\begin{cases} 12 + 3 = [5] \\ 1 + 14 = [5] \\ 11 + 14 = [5] \end{cases}$ 相加所得之和的尾数是一致的次数为 3 次, 所以号码“3”与位置(2)相加之和的尾数就不会再等于[5], 即 $3 + \text{位置}(2) \neq [5]$, 从而位置(2)就可以排除尾数为[2]的号码了。

——又如上图的连线所示的斜线对应, 号码“26”——位置(7)之前出现一个变化的明显临界点, $\begin{cases} 8 + 31 = [9] \\ 36 + 33 = [9] \\ 35 + 34 = [9] \end{cases}$ 相加所得之和的尾数是一致的次数为 3 次, 所以号码“26”与位置(7)相加之和的尾数就不会再等于[9], 即 $26 + \text{位置}(7) \neq [9]$ 。从而位置(7)就可以排除尾数为[3]的号码了。

例 2: 广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

										相冲岁数
癸卯	十七(10)	3	14	15	28	32	34	36	— 2	(45)
庚戌	廿四(17)	6	11	12	18	19	27	30	— 34	(38)
丁巳	初二(24)	3	8	13	20	21	26	27	— 35	(31)
甲子	初九(1)	1	9	11	15	17	20	34	— 10	(24)
辛未	十六(8)	4	8	10	18	23	28	36	— 31	(17)
戊寅	廿三(15)	8	12	16	21	22	25	27	— 9	(10)
乙酉	三十(22)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	(63)
										(未开奖, 需预测)

(其他资料省略)

——如上图的连线所示的斜线对应, 位置(4)——农历廿三之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} \text{初二} + 15 = [7] \\ \text{初九} + 18 = [7] \\ \text{十六} + 21 = [7] \end{cases}$, 相加所得

之和的尾数是一致的次数已达 3 次，所以位置 <4> + 廿三 ≠ [7]，从而位置 (4) 就可以排除了尾数为 [4] 的号码。

——又如上图的联线所示的第 7 位置的号码与相冲岁数（尾数）的斜线对应，出现三次的相加之和的尾数是一致的变化明显

临界点 $\begin{cases} 30 + (31) = [1] \\ 27 + (24) = [1] \\ 34 + (17) = [1] \end{cases}$ ，相应的第四次两者间相加之和就未曾

再出现等值尾数。

例 3：广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统

.....


辛未_{十六(8)} 4 8 10 18 23 28 36 — 31

戊寅_{廿三(15)} 8 12 16 21 22 25 27 — 9

乙酉_{三十(22)} 10 15 18 19 21 22 35 — 2

壬辰_{初七(29)} 7 8 9 16 18 27 34 — 28

己亥_{十四(5)} (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) — (8)



(未开奖，需预测)

(其他资料省略)

——如上图的联线所示，第 2 位置的号码与农历尾数的平行对应过程中，位置 (2) ——农历十四之前出现一个变化的明显临界点

界点 $\begin{cases} \text{“廿三”} + 12 = [5] \\ \text{“三十”} + 15 = [5] \\ \text{“初七”} + 8 = [5] \end{cases}$ ，相加所得之和的尾数是一致的次数已

达 3 次，所以位置 (2) 与 “十四” 相加之和的尾数就不会再等于 [5]，即位置 (2) + “十四” ≠ [5]，从而位置 (2) 就可以排除了尾数为 [1] 的号码。

——又如上图的联线所示，第 2 位置的号码与新历尾数的平行对应过程中，位置 (5) ——新历 (5) 之前出现一个变化的明显临界点

点： $\begin{cases} (15) + 12 = [7] \\ (22) + 15 = [7] \\ (29) + 8 = [7] \end{cases}$ ，相加所得之和的尾数是一致的次数已达

3次,所以位置 <2> + (5) \neq [7],从而位置 <2> 就可以再排除尾数为[2]的号码了。

例 4:某地传统型彩票某阶段中奖号码的总系统:

.....

辛丑初七(17)	3	6	4	8	0	4	— 5	(注:其他资料省略)
					+			
戊申十四(24)	9	8	9	6	9	0	— 9	
		+			+			
乙卯廿一(31)	5	1	2	6	6	5	— 8	
		+			+			
壬戌廿八(7)	7	4	8	7	9	2	— 6	
		+			⊗			
己巳初五(14)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	— (7)	(未开奖,需预测)
		⊗						
丙子十二(21)								

——如上图的虚线所示,第2位置的号码与新历尾数的斜线对应过程中,位置(2)——新历(21)之前出现一个变化的较明显临界点 $\begin{cases} 1 + (7) = [8] \\ 4 + (14) = [8] \end{cases}$,相加所得之和的尾数是一致的次数达2次,所以位置(2)与新历(21)的相加之和的尾数就几乎不会等于[8],即位置(2) + (21) \neq [8],从而位置 <2> 就初步可以排除尾数为[7]的号码了。

——又如上图的联线所示,第2位置的号码与农历尾数的斜线对应过程中,位置(2)——农历十二之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 8 + \text{“廿一”} = [9] \\ 1 + \text{“廿八”} = [9] \\ 4 + \text{“初五”} = [9] \end{cases}$,相加所得之和的尾数是一致的次数已达3次,所以位置 <2> + “十二” \neq [9],从而位置 <2> 就肯定可以排除尾数为[7]的号码了。

——如上图所示,第3位置与第6位置之斜线对应过程中,号码“8”——位置 <6> 之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 4 + 0 = [4] \\ 9 + 5 = [4] \\ 2 + 2 = [4] \end{cases}$

相加之和的尾数是一致的次数已达 3 次,所以位置 (6) 与号码“8”的相加之和的尾数就不会再等于 [4], 即位置 (6) + 8 ≠ [4], 从而位置 (6) 就可以排除尾数为 [6] 的号码了。

例 5:某地 36 选 7 某阶段中奖号码的同名纳音[土]系统:
.....

己酉十九(20)	3	4	6	22	23	33	36 — 29	土	(其他资料省略)
丙辰廿六(27)	1	8	13	19	20	22	24 — 32	土	
庚午初十(11)	10	17	19	24	27	33	35 — 7	土	
丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35 — 33	土	
辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33 — 1	土	
戊申廿十(17)	1	3	17	18	28	30	31 — 36	土	
己卯廿二(16)	(1)(2)(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	—(8)	土	
(未开奖,需预测)									

——如上图联线所示的斜线对应,位置 <1> ——号码“3”之前出现一个变化的明显临界点

$$\left\{ \begin{array}{l} 8 + 10 = [8] \\ 17 + 1 = [8] \\ 6 + 12 = [8] \\ 17 + 1 = [8] \end{array} \right.$$

相加所得之和的

尾数是一致的次数已达 4 次,所以位置 (1) 与号码“3”相加之和的尾数就不会再等于 [8], 即位置 (1) + 3 ≠ [8], 从而位置 (1) 就可以排除尾数为 [5] 的号码了。

[重要说明]

1. 在正常顺序下的总系统中,许多情况下,数字与数字间相加所得之和的尾数是一致的次数已达 2 次时就会产生一个变化的明显临界点,所以,在应用数字一位置号码等距加法轨迹对应预测法时就应灵活地变通地综合当时的具体变化状态对选用识别临界点的标准作出选择。

2. 本章节的预测法十分重要,必须熟练掌握。在实际预测应用过程中,必须逐个位置号码、逐项地进行“等距加法”对应以寻找出变化轨迹的临界点。

例 6:某地四花选 4 某阶段中奖号码的总系统:

.....

丁丑廿二(14)	1	12	7	3	四绿	(其他资料省略)
甲申廿九(21)	5	1	13	+	4	二黑
辛卯初六(28)	10	4	1	+	5	九紫
戊戌十三(4)	1	7	13	+	4	七赤
乙巳二十(11)	(1)	(2)	(3)	(4)	五黄	(未开奖,需预测)

——如上图联线所示的斜线对应,位置(2)——“七赤”之前出现一个变化明显的临界点 $\begin{cases} 4 + \text{二黑} = [6] \\ 7 + \text{九紫} = [6] \end{cases}$,相加之和的尾数是一致的次数已达 2 次,所以位置(2)与九宫星数字“七赤”相加之和的尾数就不会再等于[6],即位置(2) + “七赤” $\neq [6]$,从而位置(2)就可以排除尾数为[9]的号码了。事实证明,位置(2)的开奖号码是“3”。

具体问题具体分析:在正常顺序下的总系统中,位置号码与开奖日的九宫星数字进行等距加法轨迹对应时,往往两者相加之和的尾数是一致的次数为 2 次时就会产生一个变化的明显临界点(极少时候出现 3 次)。

例 7:某地 36 选 7 某阶段中奖号码的同名纳音[土]系统:

.....

丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35—33	土	(注:其他
辛丑十三(10)	10	17	18	22	26	30	33—1	土	资料省略)
戊申二十(17)	2	3	17	18	28	30	31—36	土	
己卯廿二(16)	6	14	17	24	25	30	33—10	土	

丙戌廿九(23) 2 4 5 10 26 30 34—8 土

庚子十四(6) (1)(2)(3)(3)(4)(5)(6)—(7)(未开奖,需预测)

——如上图联线所示的垂直对应,位置(6)——号码“30”之

前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 30 + 30 = [0] \\ 30 + 30 = [0] \\ 30 + 30 = [0] \end{cases}$, 相加之和的尾数

是一致的次数已达3次,所以位(6)与号码“30”相加之和的尾数就不会再等于[0],即位置(6)+30 \neq [0],从而位置(6)就可以排除尾数为[0]的号码了。

——又如上图联线所示的垂直对应,位置<1>-号码“2”之

前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 2 + 6 = [8] \\ 6 + 2 = [8] \end{cases}$, 相加之和的尾数是

一致的次数已达2次,所以位置(1)与号码“2”相加之和的尾数就不会再等于[8],即:2+位置(1) \neq [8],从而位置(1)就可以排除尾数为[6]的号码了。

二、数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法

指在干支数字信息载体总系统中(包括各个分系统),若干个数字与数字之间进行位置对称相加,所得之和的尾数恰好与分别对应的某一位置的号码尾数相同,通过记录它们所得之和的尾数分别对应位置号码尾数的次数,确认这种变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法根据数字与数字间相加所处的“位置”以及所得之和尾数找到对应的“位置”可分为如下四种:

- 三角等值加法轨迹对应预测法;
- 夹心等值加法轨迹对应预测法;
- 不规则等值加法轨迹对应预测法;
- 直线等值加法轨迹对应预测法;

(一)选定适用的系统:所有系统均适用。

(二)检索和找出:识别数字——位置号码等值加法对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准:

1. 三角等值加法轨迹对应预测法:

①正常顺序下总系统内,若干对等距数字与数字间等边三角形形式的相加之和的尾数值恰好与分别对应的位置号码尾数相同的次数为:1—2次。

——对于相加的数字与另一数字以及这两者相加之和的尾数得到对应的位置号码,它们三者若用直线连接起来,则形成一个等边三角形,所以本对应法形象地称为三角等值加法轨迹对应。其对应的具体过程模式为:系统顺序下的连续三期干支数字信息载体资料齐全的中奖号码, $\begin{matrix} A \\ \nearrow \\ C \\ \searrow \\ B \end{matrix}$,A和B分别是第三期和第一期的同一位置之号码,C则是第二期中的任何一个位置号码或标准参照系数字的尾数,当 $A + \begin{cases} = B \\ \neq B \end{cases}$,即A+C之和的尾数若与号码B的尾数是一致的,则称作A、C两者相加之和的尾数在号码B中找到对应。

②在其他各个分系统中,数字与数字间等边三角形形式的相加之和的尾数与分别对应的位置号码尾数相同的次数为:2—3次。

2. 夹心等值加法轨迹对应预测法:

①正常顺序下的总系统内,若干对等距数字与数字间夹心式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同的次数为1—2次(极少达到2次)。

——对于相加的数字与另一数字以及这两者相加之和的尾数得到对应的位置号码,它们三者实质上是垂直方向的同一位置号码,其对应的具体过程模式为:系统顺序下的连续三期中奖号码中:

$\begin{cases} A \\ B, A \text{ 和 } C \text{ 以及 } B \text{ 分别是第一期和第三期以及第二期的同一位置} \\ C \end{cases}$
 号码, 当 $A + C \begin{cases} = B \\ \neq B \end{cases}$, 即 $A + C$ 之和的尾数若与号码 B 的尾数是一

致的, 则称作 A 、 C 两者相加之和的尾数在号码 B 中找到对应。因为这种三者间的对应关系恰似“夹心”现象, 故称为夹心等值加法轨迹对应。

②在其它各个分系统中, 数字与数字间夹心式相加之和的尾数与分别对应的位置号码尾数相同中的次数为 1—2 次 (很少达到 2 次)。

3. 不规则等值加法轨迹对应预测法:

①正常顺序下的 (1—12 期) 总系统内, 若干对等距数字与另一数字间随意的不规则式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同的次数为 2—3 次。

②各个分系统中, 若干对等距数字与另一数字间随意的、不规则式的相加之和的尾数与分别对应的位置号码尾数相同的次数为: 3—4 (极少达到 4 次)。

——对于相加的数字与另一数字, 这两个数字是 (1—12 期内) 任意两个尾数, 其相加之和的尾数找到对应的位置号码后, 那么若干对再进行相加的两个数字均应是第一次相加的数字的同一位置的下一期之数字, 所得之和的尾数也是在第一次找到对应的位置号码之下一期同样位置, 如此若干个对称位置循环, 因为这种三者间的对应关系在位置方位上是不规则的、随意的, 故称为不规则等值加法轨迹对应。


4. 直线等值加法轨迹对应预测法:

①正常顺序下的总系统内, 若干对数字与数字间直线式的相

加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同的次数为 1—2 次。

②其他各个系统中，数字与数字间直线式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同的次数为 1—2 次。

——对于相加的数字与另一数字，以及这两者相加之和的尾数得到对应的位置号码，它们三者必须在同一直线上，其对应的具体过程模式为：系统顺序下的连续四期中奖号码中



尾数若与号码 C 的尾数是一致的，则称作 A、B 两者相加之和的尾数在号码 C 中找到对应；同理 B + C 之和的尾数若与号码 D 的尾数是一致的，则称作 B、C 两者相加之和的尾数在号码 D 中找到对应。请注意，直线等值加法轨迹对应中的数字间相加，可以是 2 个数字，也可以是 3 个，也可以是若干个，但最好不应超过 10 个。

(三) 搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比；具体问题还须具体分析，原则是：明显者用之，不明显者弃之。


(四) 作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五) 同一位置号码，同一预测内容，必须坚持“事应过三”验证法则，最后综合各项的初步预测结果得出最终的结论。原则：必须保证预测结论是准确的。

下面就逐一举例介绍四种等值加法轨迹对应预测法。

a. 三角等值加法轨迹对应预测法：

例 1:广东体彩 7/36 某阶段正常顺序下中奖号码的总系统:
.....



——如上图的箭头所示的三角对应, 2—(10)——位置(2)
之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 5+(27)=[2] \xrightarrow{\text{对应}} 2 \\ 6+(3)=[9] \xrightarrow{\text{对应}} 9 \end{cases}$, 所以
2+(10)之和的尾数就不会在位置(2)再找到对应, 即: 2+(10)=[2] $\xrightarrow{\otimes}$ 位置(2), 从而位置(2)就可以排除尾数为[2]的号码了。

——又如上图的箭头所示的三角对应, 11—15——位置(4)
之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 9+12=[1] \xrightarrow{\text{对应}} 11 \\ 21+7=[8] \xrightarrow{\text{对应}} 28 \end{cases}$, 所以
11+15之和的尾数就不会在位置(4)再找到对应, 即: 11+15=[6]? 位置(4), 从而位置(4)就可以排除尾数为[6]的号码了。

——又如上图的箭头所示的三角对应, 19—2——位置(5)
之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 15+4=[9] \xrightarrow{\text{对应}} 19 \\ 30+29=[9] \xrightarrow{\text{对应}} 29 \end{cases}$, 所以 19+2
之和的尾数就不会在位置(5)再找到对应, 即 19+2=[1]? 位置(5), 从而位置(5)就可以排除尾数为[1]的号码了。

例 2:广东体彩 36 选 7 某阶段中奖号码的农历主题系统:
.....

庚戌 _{十八(22)}	7	20	22	23	28	30	33—17
甲子 _{初二(7)}	1	5	6	19	20	23	35—11
庚申 _{廿八(2)}	10	13	16	20	28	29	34—25
壬寅 _{十二(13)}	7	11	14	15	20	29	31—25
辛卯 _{初二(1)}	10	18	25	26	32	33	36—2
丙寅 _{初八(5)}	15	18	20	25	27	34	36—7
庚辰 _{廿二(19)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的三角对应, 33—20——位置(6)之前
 出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 23 + 16 = [9] \longrightarrow 29 \\ 29 + 14 = [3] \longrightarrow 33, \text{ 所以 } 33 + \\ 29 + 25 = [4] \longrightarrow 34 \end{cases}$
 20 = [3]位置(6), 从而位置(6)就可以排除尾数为[3]的号码了。

[重要说明]

在系统内顺序下的各期次的位置号码, 很多时候, 号码与号码间进行三角等值加法轨迹对应时, 它们相加之和不容易在相应的位置号码找到对应, 即是说: 连一次尾数相同对应均没有, 所以, 有时候可以灵活地“见机行事”, 利用这点变化的明显临界点也能达到预测之目的。

b. 夹心等值加法轨迹对应预测法:

例 1: 广东体彩 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

乙酉 _{廿三(28)}	3	8	11	16	18	20	28	— 6
壬辰 _{三十(4)}	1	11	12	15	21	26	28	— 27
己亥 _{初七(11)}	2	7	11	13	19	21	22	— 24
丙午 _{十四(18)}	1	8	11	15	21	29	35	— 23
癸丑 _{廿一(25)}	8	16	17	22	27	31	33	— 23
庚申 _{廿八(2)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—(8)(未开奖,需预测)

(其他资料省略)

——如上图箭头所示的夹心对应，号码 15 + 位置 (4) 之前出现一个变化的明显临界点 $13 + 22 = [5]$ $\xrightarrow{\text{对应}}$ 15，所以，15 + 位置 (4) 的夹心对应就不会再出现等值对应，即：15 + 位置 (4) \neq 22，从而位置 (4) 就可以排除尾数为 [7] 的号码了。

——又如上图箭头所示的夹心对应，号码 35 + 位置 (7) 之前出现一个变化的明显临界点： $22 + 33 = [5]$ 对应 35，所以，35 + 位置 (7) \neq 33，从而位置 (7) 就可以排除尾数为 [8] 的号码了。

[顺注]

在乐透型的彩票中，垂直方向的两个号码间进行夹心对应时，连续出现两个等值的夹心对应是极少见的。

例如：香港 47 选 6 某阶段中奖号码的正常顺序下的总系统：
.....

辛酉初五(27)	1	10	24	25	43	47	— 34
戊辰十二(6)	9	19	20	28	29	35	— 15
乙亥十九(13)	7	19	26	36	37	42	— 33
壬午廿六(20)	11	18	20	26	28	47	— 10
己丑初三(27)	5	9	19	32	39	45	— 13
丙申初十(3)	7	10	25	27	33	41	— 19

(其他资料省略)

[重要说明]

在系统内顺序下的各期次之位置号码间进行夹心等值加法轨迹对应时，很多时候它们连一次夹心等值的对应都没有，所以，有时完全可以利用这点变化的明显临界点去达到预测目的。当然，具体问题必须具体分析。

c. 直线等值加法轨迹对应预测法：

例 1：某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：
.....

丙寅初—(13) 9 4 9 6 3 8 — 6 (注:其他资料省略)

癸酉初八(20) 9 5 5 5 4 9 — 5

庚辰十五(27) 8 7 9 9 2 9 — 4

丁亥廿二(3) 2 4 9 1 2 4 — 0

甲午廿九(10) 5 2 3 1 2 7 — 3

辛丑初七(17) (1)(2)(3)(4)(5)(6) — (7) (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的直线对应, 1—3——位置 (2) 之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 9+2=[1] \xrightarrow{\text{对应}} 1 \\ 2+1=[3] \xrightarrow{\text{对应}} 3 \end{cases}$, 所以号码“1”+ 号码“3”之和就不会再在位置 (2) 中找到等值对应, 即; $1+3=4 \xrightarrow{\text{对应}}$ 位置(2), 从而位置(2)就可以排除尾数为[4]的号码了。

例 2: 某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊辰初五(11) 3 11 16 21 22 29 33 — 19 (注:其他资料

乙亥十二(18) 8 9 10 11 18 19 24 — 1 省略)

壬午十九(25) 3 7 8 18 24 25 29 — 1

己丑廿六(1) 1 2 4 14 15 17 23 — 34

丙申初四(8) 4 10 17 22 25 28 34 — 9

癸卯十一(15) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) — (8) (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的直线对应, 1—4——位置 (1) 之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 8+3=1 \xrightarrow{\text{对应}} [1] \\ 3+1=4 \xrightarrow{\text{对应}} [4] \end{cases}$, 所以号码 1 + 号码 4 之和就不会再在位置 (1) 中找到等值对应, 即 $1+4=5 \xrightarrow{\otimes}$ 位置(1), 从而位置(1)就可以排除尾数为[5]的号码了。

——又如上图所示的直线对应, 14—22——位置(4)之前出现一个变化的较明显临界点 $18 + 14 = [2] \xrightarrow{\text{对应}} 22$, 所以, 号码 14 + 号码 22 之和就不会再在位置(4)中找到等值对应, 即 $14 + 22 = 6 \xrightarrow{\otimes} \text{位置}(4)$, 从而位置(4)就可以初步排除尾数为[6]的号码了, 至于能否确切排除, 则还应综合其它不同方式的预测结果再作最终的裁定。

[顺注]

在系统内顺序下的各期次的位置号码, 号码间进行直线等值加法轨迹对应时, 大多数情况是产生一次的直线等值对应时就会出现一个变化的明显临界点, 所以, 应充分发挥这点变化的趋势的特点去达到相应的预测目的。

[重要说明]

广东体彩 7/36、四花选 4、南粤风采(6+1)型 7/36、深圳风采 7/35 等由于游戏规则的不同以及由不同摇奖机摇出的开奖号码, 每只彩票在应用数字方法(如加法和乘法)上虽然一致, 但具体产生明显临界点的“变化状态”是有区别的, 其特征或特点只能够对该只彩票的同一系统进行细致的统计分析, 待准确的总体结论出来后(并作好记录, 以便查阅), 则在预测推算过程中就能“挥洒自如”, “受益无穷”。

例 3: 某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲辰十七(12)	8	10	12	19	20	25	36	—	12	(注: 其他 资料略)
辛亥廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27	—	11	
戊午初一(26)	1	10	15	21	24	28	35	—	12	
乙丑初八(2)	5	13	20	27	28	30	35	—	9	
壬申十五(9)	3	17	19	26	30	35	36	—	28	
己卯廿二(16)	8	14	17	24	25	30	33	—	10	

丙戌廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	— 8
癸巳初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	— 19
庚子十四(6)	8	9	10	12	25	32	36	— 29
丁未廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	— 26
甲寅廿八(20)	14	23	25	27	29	34	35	— 8
辛酉初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	— 30
戊辰十二(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)(未开奖,需预测)

——如上图 (1) 位置的垂直方向的直线对应中, 14—10——
位置(1)之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 8 + 6 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 14 \\ 6 + 14 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 10 \end{cases}$
(2 个号码相加) 所以, 号码 14 + 号码 10 之和就不会再在位置 (1)
中找到等值对应, 即 $14 + 10 = [4] \xrightarrow{\otimes} \text{位置 (1)}$, 从而位置 (1) 就
可以排除了尾数为 [4] 的号码。接着在位置 (1) 的垂直方向我们又
发现: (5 个号码相加), 这可以认为出现了一个变化的明显临界点
 $\begin{cases} 8 + 1 + 1 + 8 + 6 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 14 \\ 1 + 1 + 8 + 6 + 14 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 10 \\ 1 + 8 + 6 + 14 + 10 = [9] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置 (1)} \end{cases}$ (已出现两次直线等值对
应), 所以 $1 + 8 + 6 + 14 + 10 = [9] \xrightarrow{\otimes} \text{位置 (1)}$, 即位置 (1) 就可以
排除尾数为 [9] 的号码了。位置 (1) 的垂直方向进行同样的直线
对应时又找到: (8 个号码相加)

$\begin{cases} 8 + 1 + 1 + 5 + 3 + 8 + 1 + 1 + 8 = [6] \xrightarrow{\text{对应}} 6 \\ 1 + 1 + 5 + 3 + 8 + 1 + 1 + 8 + 6 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 14 \\ 1 + 5 + 3 + 8 + 1 + 1 + 8 + 6 + 14 = [7] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置 (1)} \end{cases}$ 这同样可
认为出现一个变化的明显临界点 (已出现两次直线等值对应), 所
以 $1 + 5 + 3 + 8 + 1 + 1 + 8 + 6 + 14$ 之和就不会再在位置 (1) 中找
到等值对应, 即 $1 + 5 + 3 + 8 + 1 + 1 + 8 + 6 + 14 = [7] \xrightarrow{\otimes} \text{位置 (1)}$, 从而位置 (1) 就可以排除尾数为 [7] 的号码了。

[重要说明]

1. 在预测过程中,应用直线等值轨迹对应时,尽量能够找出号码间直线相加之和得到等值对应的变化之临界点则最好不过。有时候,为了节省时间,仅考虑两个号码间及三个号码间相加之和有无找到等值对应从而去识别产生变化的明显临界点。

2. 直线等值加法轨迹对应包括垂直方向、左斜和右斜方向的直线相加之和这三种方式。要点:以需要预测的位置号码垂直方向的连续 2—3 个号码(尾数)作为寻找“等值”的导向,在系统内随意选定若干对号码等位置相加,两者进行对应是否能找到“尾数等值对应”从而确认这种轨迹过程的变化机会点。

d. 不规则等值加法轨迹对应预测法:

例 1: 某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚辰 廿二(19)	5	17	20	21	26	29	31	— 6	(注:其他资料省略)
丁亥 廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35	— 33	
甲午 初六(3)	3	6	7	17	23	24	36	— 22	
辛丑 十三(10)	12	17	18	22	26	30	33	— 1	
戊申 二十(17)	1	3	17	18	28	30	31	— 36	
乙卯 廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33	— 35	
壬戌 初五(31)	9	10	25	28	30	32	34	— 26	
己巳 十二(7)	3	4	5	6	7	10	29	— 33	
丙子 十九(14)	2	3	14	19	24	28	30	— 20	
癸未 廿六(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)	(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的不规则对应中, 1—22——位置 <7>

之前出现一个变化的明显临界点： $\begin{cases} 1 + 23 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 34 \\ 3 + 26 = [9] \xrightarrow{\text{对应}} 29 \\ 12 + 28 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 30 \end{cases}$ ，所以号码 $1 + 22$ 之和就不会再在相应的位置 $\langle 7 \rangle$ 中找到等值对应，即 $1 + 22 = [3] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置}(7)$ ，从而位置(7)就可以排除尾数为[3]的号码了。

例 2: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚辰廿二(19)	5	17	20	21	26	29	31	—	6	(注:其他
丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35	—	33	资料省略)
甲午初六(3)	3	10	16	17	23	24	36	—	22	
辛丑十三(10)	12	19	20	22	26	30	33	—	1	
戊申二十(17)	1	5	17	18	28	30	31	—	35	
乙卯廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33	—	35	
壬戌初五(31)	9	10	25	28	30	32	34	—	26	
己巳十二(7)	3	4	5	6	7	10	29	—	33	
丙子十九(14)	2	3	14	19	24	28	30	—	20	
癸未廿六(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的不规则对应中, 10—28——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点： $\begin{cases} 31 + 32 = [3] \xrightarrow{\text{对应}} 3 \\ 32 + 10 = [2] \xrightarrow{\text{对应}} 2 \end{cases}$ ，所以号码 $10 + \text{号码} 28$ 之和就不会在位置(1)中找到等值对应，即： $10 + 28 = [8] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置}(1)$ ，从而位置(1)就可以排除尾数为[8]的号码了。

——又如上图所示的不规则对应中，出现一个变化的明显临界点过程： $\begin{cases} \text{“廿九”} + 1 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 10 \\ \text{“初六”} + 3 = [9] \xrightarrow{\text{对应}} 19 \\ \text{“十三”} + 12 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 5 \end{cases}$ ，所以，相应的第四次加法轨

迹对应就没有出现等值对应。

例 3:广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

	相冲岁数									
甲午初六(3)	3	6	7	17	23	24	36	—	22	(53)
辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33	—	1	(46)
戊申二十(17)	1	3	16	18	28	30	31	—	36	(39)
乙卯廿七(24)	11	14	19	21	22	31	33	—	35	(32)
壬戌初五(31)	9	10	23	28	30	32	34	—	26	(25)
己巳十二(7)	3	4	5	6	7	10	29	—	33	(18)
丙子十九(14)	2	3	14	19	24	28	30	—	20	(11)
癸未廿六(21)	⊗→(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8)(64)(未开奖,需预测)									

——如上图箭头所示的不规则对应中,11—9——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点 $\begin{cases} 12+1=[3] \xrightarrow{\text{对应}} 3 \\ 1+11=[2] \xrightarrow{\text{对应}} 2 \end{cases}$,所以号码 11+号码 9 之和就不会在位置(1)中找到等值对应,即:11+9=[0]—⊗→位置(1),从而位置(1)就可以排除尾数为[0]的号码了。

——又如上图所示的不规则对应中,出现一个变化的明显临界点过程: $\begin{cases} 30+(46)=[6] \xrightarrow{\text{对应}} 16 \\ 30+(39)=[9] \xrightarrow{\text{对应}} 19 \\ 31+(32)=[3] \xrightarrow{\text{对应}} 23 \end{cases}$,所以,相应的第四次加法轨迹对应就不会再产生等值对应。

[重要说明]

开奖日的农历尾数、新历尾数、相冲岁数(尾数)和九宫星数字均可以被看成一个已知的、固定的“标准号码”,从而它们与各个位置号码开展各种形式的等值加法对应。

例 4: 某地区 36 选 7 某阶段第五位的号码等距环环相比系统:

.....

辛酉廿八(4)	6	16	18	23	27	29	32	—	33
丙申初四(8)	4	10	17	22	25	28	34	—	9
戊辰初五(11)	3	11	16	21	22	29	33	—	19
癸卯十一(15)	3	4	15	16	23	30	36	—	11
乙亥十二(18)	8	9	10	11	18	19	24	—	1
庚戌十八(22)	7	20	22	23	28	30	33	—	17
壬午十九(25)	3	7	8	18	24	25	29	—	1
丁巳廿五(29)	9	14	23	25	27	28	29	—	26
己丑廿六(1)	1	2	4	14	15	17	23	—	34
甲子初二(7)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的不规则对应中, 23—15——位置 (3)

之前出现一个变化的临界点: $\begin{cases} 22 + 33 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 15 \\ 18 + 24 = [2] \xrightarrow{\text{对应}} 22 \\ 24 + 29 = [3] \xrightarrow{\text{对应}} 23 \end{cases}$, 所以号码

15 + 号码 23 之和就不会在位置 (3) 中再找到等值对应, 即 $15 + 23 = [8] \xrightarrow{\otimes} \text{位置}(3)$, 从而位置 (3) 就可以排除尾数为 [8] 的号码了。

例 5: 南粤风采 7/36 某阶段第二位等距离排列系统:

.....

甲午	初十(30)	1	2	8	12	15	19	29	金
戊申	廿四(13)	2	10	12	14	25	27	35	土
壬戌	初九(27)	8	9	11	16	17	24	33	水
丙子	廿三(10)	2	5	26	27	32	33	35	水
庚寅	初八(24)	1	7	9	15	22	26	32	木
甲辰	廿二(8)	1	3	18	22	23	25	34	火
戊午	初六(22)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	火 (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的不规则对应,新历(24)——号码 7——
位置(6)之前出现一个变化的明显临界点:
$$\begin{cases} (13) + 10 = [3] \xrightarrow{\text{对应}} 33 \\ (27) + 9 = [6] \xrightarrow{\text{对应}} 26 \\ (10) + 5 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 25 \end{cases}$$

所以号码 7 与新历(24)之和的尾数就不会在位置(6)中再找到等值对应,即 $(24) + 7 = [1] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置}(6)$, 从而位置(6)就可以排除尾数为[1]的号码了。

[重要说明]

不论进行等距加法轨迹对应, 还是进行不规则等值加法对应, 标准参照系中的农历尾数、新历尾数、相冲岁数(尾数)、九宫星数字均可以视作为一个已知的“标准号码”, 它们同样可以任意地与开奖号码进行相加以找寻产生明显临界点的轨迹对应。

若干对的两者相加的形式, 可以是垂直方向的, 也可以是左斜方向、右斜方向、平行方向的, 只是若干对的两者必须遵守“同等位置的、对称的”原则就可以展开。1—12 位的等距离排列系统, 就能产生 12 个重新排列中奖号码的系统, 可以充分发挥不规则等值加法的预测作用。

例 6: 某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:
.....

辛巳十三(30) 3 6 6 0 4 3—7 (注:其他资料省略)

戊子二十(6) 7 7 1 7 8 8—7

乙未廿七(13) 6 8 0 9 5 5—1

壬寅初五(20) 6 6 8 1 3 3—0

己酉十二(27) 2 4 9 4 0 2—4

丙辰十九(4) 6 9 9 1 0 9—2

癸亥廿六(11) 4 9 9 1 0 9—1

庚午初四(18) 2 6 2 4 6 2—9

丁丑十一(25) (1) (2) (3) (4) (5) (6)—(7) (未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的不规则对应中,9—4—0——位置(1)

之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 1+7+8=[6] \xrightarrow{\text{对应}} 6 \\ 0+9+5=[4] \xrightarrow{\text{对应}} 4 \\ 8+1+3=[2] \xrightarrow{\text{对应}} 2 \end{cases}$, 所以号

码9+号码4+号码0之和就不会在位置(1)中再找到等值对应, 即: $9+4+0=[3] \xrightarrow{\text{对应}} ?$ 位置(1), 从而位置(1)就可以排除尾数为[3]的号码了。

[重要说明]

1. 在应用不规则等值加法轨迹对应时, 正因为是“不规则”, 所以只要在1—12期内能任意地、随便地找到若干对的若干个数字间相加之和的尾数能在任何的对应位置分别得到3次的连续的等值对应, 就可以认为出现一个变化的明显临界点, 据此就可以作出相应的预测结论。

2. 为了提高使用不规则等值加法轨迹对应法的效率和充分利用每一个变化状态的特点, 应依顺序逐期地、逐个位置地由一个号码到另一个号码, 由近到远, 层层扩展, 有条不紊地进行相加, 在寻找变化的明显临界点之前, 首先“心中有数”只要看清楚

需要预测的位置之同一垂直方向的最近连续三期的位置号码，以这三个位置号码的尾数去与“不规则”的其他号码间相加之和分别对比，看能否依顺序得到等值对应，这样的位置号码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去做就比较简便。

3. 在预测推算过程中，基本上只考虑两个号码间的相加之和（尾数）去寻找等值“对应”。

4. 本章节和下一节的预测十分重要，必须熟练掌握。

第十节 数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法

数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法，就是指在干支数字信息载体总系统中（包括其他系统），若干对数字与数字间进行相乘，所得之积的尾数在相应位置号码中找到等值对应，通过记录它们所得之积的尾数分别对应位置号码尾数的次数，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法与数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法中关于号码间对应的“手法”几乎是一致的，它也可分为：

- 等距乘法轨迹对应预测法，
- 三角等值乘法轨迹对应预测法，
- 直线等值乘法轨迹对应预测法，
- 不规则等值乘法轨迹对应预测法。

（一）选定适用的系统：所有系统均适用。

（二）检索和找出：识别数字——位置号码等距乘法或等值乘法对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

只要在 1—12 期内，任意地、随便地找出若干对的两个数字间相乘之积的尾数能在任何的相应位置分别得到 2—3 次的连续

的等值对应,就可以认为出现一个变化的较明显或明显临界点。

(三)搜索、判断和确认需要预测衡量、对比;具体问题具体分析,原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

例 1:广东体彩 36 选 7 某阶段落中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

庚申廿八(2) 10 13 16 20 28 29 34 — 25

丁卯初六(9) 5 14 18 21 31 34 35 — 10

甲戌十三(16) 6 12 19 20 25 26 28 — 35

辛巳二十(23) 2 6 16 17 25 29 30 — 19

戊子廿七(30) 3 14 21 22 23 27 29 — 33

乙未初五(6) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)—(8)(未开奖,需预测)

——如上图的连线所示的等距乘法轨迹对应, $21 \times$ 位置 (1)

之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 18 \times 6 = [8] \\ 19 \times 2 = [8] \\ 16 \times 3 = [8] \end{cases}$, 所以, 号码 21

与位置 (1) 之积就不会再在位置 (1) 中找到等值对应, 即 $21 \times$ 位置 (1) $\neq [8]$, 从而位置 (1) 就可以排除尾数为 [8] 的号码了。

——又如上图的连线所示的等距乘法轨迹对应, $23 \times$ 位置

(8) 之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 31 \times 35 = [5] \\ 25 \times 19 = [5] \\ 25 \times 33 = [5] \end{cases}$, 所以, 号

码 23 与位置 (8) 之积就不会再在位置 (8) 中找到等值对应, 即 $23 \times$ 位置 (8) $\neq [5]$, 从而位置 (8) 就可以排除尾数为 [5] 的号码了。

例 2：广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丙戌廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34	— 8
癸巳初七(30)	1	4	6	11	13	14	27	— 19
庚子十四(6)	5	7	10	12	25	32	36	— 29
丁未廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	— 26
甲寅廿八(20)	14	22	24	27	29	34	35	— 8
辛酉初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	— 30
戊辰十二(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8) (未开奖,需预测)

——如上图联线所示的三角等值乘法轨迹对应，22—30——
位置(2)之前出现一个变化的明显临界点： $\begin{cases} 4 \times 29 = [6] \xrightarrow{\text{对应}} 16 \\ 7 \times 26 = [2] \xrightarrow{\text{对应}} 22 \\ 16 \times 8 = [8] \xrightarrow{\text{对应}} 18 \end{cases}$ ，
所以，号码 22 与号码 30 之积不会再在位置(2)中找到等值对应，
即 $22 \times 30 = [0] \xrightarrow{\otimes} \text{位置}(2)$ ，从而位置(2)就可以排除尾数为[0]
的号码了。

[重要说明]
数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法与数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法的预测方式和方法是一样的，具体方法只不过是把“加法”改为“乘法”而已。具体操作过程的原理是共通的。

例 3：某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：
.....

辛丑初七(17)	3	6	4	5	0	4—5	(注:其他资料省略)
戊申十四(24)	9	8	9	6	9	0—9	
乙卯廿一(31)	5	1	2	6	6	6—8	
壬戌廿八(7)	7	4	8	7	2	2—6	
己巳初五(14)	5	4	6	2	8	6—5	
丙子十二(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(7)	(未开奖,需预测)

——如上图联线所示的直线等值乘法轨迹对应, 8—6——位置 (3) 之前出现一个变化的较明显临界点: $\begin{cases} 9 \times 2 = [8] \xrightarrow{\text{对应}} 8 \\ 2 \times 8 = [6] \xrightarrow{\text{对应}} 6 \end{cases}$, 所以号码 8 与号码 6 之积就不会在位置 (3) 中找到等值对应, 即 $8 \times 6 = [8] \xrightarrow{\text{对应}}$ 位置 (3), 从而位置 (3) 就可以排除尾数为 [8] 的号码了。

——又如上图联线所示的不规则等值乘法轨迹对应, 6—5——位置 (5) 之前出现一个变化的较明显临界点 $\begin{cases} 9 \times 8 = [2] \xrightarrow{\text{对应}} 2 \\ 8 \times 6 = [8] \xrightarrow{\text{对应}} 8 \end{cases}$, 所以号码 6 与号码 5 之积就不会在位置 (5) 中找到对应, 即 $6 \times 5 = [0] \xrightarrow{\otimes}$ 位置 (5), 从而位置 (5) 就可以排除尾数为 [0] 的号码了。

例 4: 广东体彩 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:
.....

丁巳初二(24)	3	8	13	20	25	31	36—26
甲子初九(1)	1	8	11	15	17	20	24—10
辛未十六(8)	4	8	10	12	23	29	36—31
戊寅廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27—7
乙酉初十(22)	10	15	18	19	21	26	35—2
壬辰初七(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8) (未开奖,需预测)

(其他资料省略)

——如上图联线所示的直线等值乘法轨迹对应，25—35——
位置(8)之前出现一个变化的明显临界点： $\begin{cases} 15 \times 23 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 25 \\ 23 \times 25 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 35 \end{cases}$ ，
所以号码 25 与号码 35 之积就不会在位置 (8) 中找到等值对应，
即： $25 \times 35 = [5] \xrightarrow{\otimes}$ 位置 (8)，从而位置 (8) 就可以排除尾数为 [5] 的号码了。

——又如上图联线所示的不规则等值乘法轨迹对应，12—
16——位置(1)前出现一个变化的明显临界点： $\begin{cases} 8 \times 13 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 4 \\ 8 \times 11 = [8] \xrightarrow{\text{对应}} 8 \\ 8 \times 10 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 10 \end{cases}$ ，
所以号码 12 与号码 16 之积就不会再在位置 (1) 中得到等值对
应，即 $12 \times 16 = [2] \xrightarrow{\text{对应}}$ 位置 (1)，从而位置 (1) 就可以排除尾数
为[2]的号码了。

例 5:某地区传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系
统:

.....

丁亥廿二(3)	2	4	9	1	2	4—0
甲午廿九(10)	5	2	4	1	2	7—3
辛丑初七(17)	3	6	4	5	0	4—5
戊申十四(24)	9	8	9	6	9	0—9
乙卯廿一(31)	5	1	2	6	6	6—8
壬戌廿八(7)	7	4	8	7	9	2—6
己巳初五(14)	5	4	6	2	1	6—5
丙子十二(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(7)(未开奖,需预测)

(其他资料省略)

——如上图连线所示的不规则等值乘法轨迹对应, 5—7——位置(1)之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 5 \times 3 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 5 \\ 3 \times 9 = [7] \xrightarrow{\text{对应}} 7, \text{所以,} \\ 9 \times 5 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 5 \end{cases}$
 号码5与号码7之积就不会在位置(1)中再找到等值对应, 即 $5 \times 7 = [5] \xrightarrow{\text{对应}}$ 位置(1), 从而位置(1)就可以排除尾数为[5]的号码了。

例6: 广东体彩36选7某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

甲子初九(1)	1	8	11	15	17	20	24	—	10
辛未十六(8)	4	8	10	12	23	29	36	—	31
戊寅廿三(15)	8	12	16	17	20	25	27	—	7
乙酉三十(22)	10	15	18	19	21	26	35	—	2
壬辰初七(29)	7	8	9	16	18	26	34	—	13
己亥十四(5)	1	11	12	23	24	28	31	—	2
丙午廿一(12)	4	12	17	20	24	31	34	—	13
癸丑廿八(19)	3	6	8	11	20	28	35	—	33
庚申初六(26)	(1)	(2)	(3)⊗	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)(未开奖, 需预测)

——如上图连线所示的不规则等值乘法轨迹对应, 7—12——位置(5)之前出现一个变化的明显临界点: $\begin{cases} 4 \times 16 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 24 \\ 8 \times 18 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 24, \text{所以,} \\ 10 \times 9 = [0] \xrightarrow{\text{对应}} 20 \end{cases}$
 号码7与号码12之积就不会在位置(5)中再找到等值对应, 即 $7 \times 12 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} \text{位置(5)}$, 从而位置(5)就可以排除尾数为[4]的号码了。

例7: 某地36选7某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

辛丑	十三(10)	12	17	18	22	26	30	33	— 1
戊申	二十(17)	1	3	17	18	28	30	31	— 16
乙卯	廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33	— 35
壬戌	初五(31)	3	14	25	28	30	32	34	— 26
己巳	十二(7)	3	4	5	6	7	10	23	— 33
丙子	十九(14)	1	3	14	19	24	28	30	— 20
癸未	廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33	— 18
庚寅	初三(28)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)(未开奖,需预测)

.....
——如上图连线所示的不规则等值乘法轨迹对应,新历(7)
——号码 20——位置(3)之前出现一个变化的明显临界点:

$$\left\{ \begin{array}{l} (17) \times 35 = [5] \xrightarrow{\text{对应}} 5 \\ (24) \times 26 = [4] \xrightarrow{\text{对应}} 14 \\ (31) \times 33 = [3] \xrightarrow{\text{对应}} 13 \end{array} \right. , \text{ 所以新历 (7) 尾数与号码 20 之积就不}$$

会再在位置(3)中得到等值对应,即 $(7) \times 20 = [0] \xrightarrow{\text{对应}}$ 位置(3),
从而位置(3)就可以排除尾数为[0]的号码了。

[重要说明]

1. 无论是加法等值轨迹对应还是乘法等值轨迹对应,目的是
通过这种数学手段去挖掘出处于该种变化状态的临界点,在识别
变化的临界点过程中,对于一些偶然间或极少机会才产生的某种
连续“次数”,我们可以采取抓住 99%,放弃 1%的态度和方法处
理,不应该为了那 1%而去放弃正常情况下绝大多数的普遍性现
象。站在某种立场而言,预测中奖号码并不是要求期期能中大奖,
所以有时候偶然碰上“失误”也属正常,但只要坚持绝大多数情形
下的正确原则与方法,就一定会达到“全中”或“几乎全中”的效
果。

2. 对于加法等值轨迹对应以及乘法等值轨迹对应，这里的等值是指两者间的尾数等值，并不是指实际数值；在识别变化的临界点过程中，能够连续出现 2—3 次等值对应在实际应用过程其机会并不是很多，只占少数，真正大多数的是连一次的等值对应都没有，如何“见机行事”，具体问题具体分析，充分利用和发挥这大多数变化状态之趋势和特点，的确应令大家格外重视！其应用的技巧与时机就只能够靠大家在长期的实践中去摸索，正如古语云：熟能生巧，功夫不负有心人。

3. 同一个需要预测的位置号码，各种各样的对应及其相应的预测方法均可以同时使用，其宗旨就是：只要能准确地挖掘和识别出该种变化状态的临界点就行！

通过准确地识别出各式各样的变化状态的临界点后，根据临界点的前后变化不一样性，能排除多少就算多少。既不能轻易地放过稍纵即逝的机会，也不能侥幸地勉强去排除！

4. 在干支数字信息载体总系统（包括其他各个分系统）的“时空”中，每一个位置号码，距离其越近者，各种关系就越密切，互相映射、互相联系、相互影响的能力也就越强，两者间进行各种对应而产生变化明显临界点的连续“次数”也就相应较少；反之，距离其越远者，各种关系就越松懈，互相映射、互相联系、相互影响的能力也就相对较弱，两者间进行各种对应而产生变化明显临界点的连续“次数”也就相应较多；这是彩票中奖号码经过人工重新排列后的一个重要变化特点。每个位置号码在特定的“时空”中已具有新的“涵义”。

所以我们在预测过程中，最近连续的期次之各个中奖号码的出没变化特点对即将开奖期次的各个中奖号码影响最大！因而在应用各种对应方式、各种预测方法时，应该特别重视正常顺序下最近五期的中奖号码的总体结构、局部个体特点的趋势；又因为 12 期是一个小周期（地支开始循环），所以进行等距离排列对比以

及等距离环环相比就最好不应超过一个小周期，以免各种变化状态的趋势产生较大变异。

5. 在具体应用等距加法轨迹对应、等值加法轨迹对应时，其中之一的数字尾数是“0”时，则应特别小心，因为“0”与任何尾数相加均等于原来的尾数，即经过加法处理后未曾产生新的数值变化，这就往往容易产生等值对应，从而产生明显临界点的“次数”就会容易多一次；同理，在具体应用等值和轨迹对应时，其中之一的数字尾数是“0”或“1”时，则应特别留意，因为“0”乘以任何数均等于“0”，“1”乘以任何数之尾数均等于该原来的尾数，即经乘法处理后未曾产生新的倍数关系，这种情形就容易出现等值对应，从而产生明显临界点的“次数”就会容易相应多1—2次。

记住：设置和使用加法、乘法轨迹对应，是专门针对彩票中奖号码多变、快变、不容易产生固定现象的特点来进行开展的，搜索、判断和识别各种变化状态的临界点就是“以不变应万变，以变应变”的具体实践。等距加法、等值加法、等距乘法和等值乘法的建立和灵活运用，就是《周易与彩票选号》的预测推算一项关键内容。看似简单，实则其妙无穷；看似复杂，实则简便易用。

6. 对于正常顺序下的干支数字信息载体总系统中的标准参照系之各个数字的尾数，为了便于预测使用，我们就把它们看作成是已知的、特别的一个位置号码。弄明白了这点，对于具体使用各种对应法时就不会遗忘这些已知的“标准位置号码”的存在，通过这些“标准位置号码”与未知的位置号码之对比，能起到不可或缺的预测作用。

善于利用各种特点、各种特殊性为预测推算服务，是彩票中奖号码预测的中心点。

第十一节 十二地支(生肖)预测推算

中奖号码的原则与方法

在彩票中奖号码的预测过程中,通过位置号码与十二生肖的定性对应即生肖码与标准参照系中的天干、地支、纳音或者生肖码间进行相生相克关系或特定关系的轨迹对应,记录它们在对应过程中产生某种关系的次数与方向,确认这种变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的,此法称为生肖码对应预测法。

生肖码对应预测法与其它的位置号码轨迹对应预测法的最大区别是:前者是预测具体号码,后者是预测具体号码的尾数。但是两者间的预测机理、预测方法均是相通的、一致的。

[重要说明]

本章节所介绍的预测推算原则与方法是为已经掌握了十二地支(生肖)间生克关系以及各种特定关系的彩民而设。一般彩民可选用或不用。当然,用比不用更能进一步提高预测推算的精确度。

应用生肖码对应预测法之前,首先应具备如下前提条件:

- a. 正常顺序下的生肖码演变系统一览表;
- b. 当年的十二生肖(地支)与数字号码的对应挂钩一览表。

开奖日的地支、天干、纳音(包括相冲关系的干支、纳音)与生肖码之间的关系,不外乎是相生、相克(含相刑)关系:

天干、地支、纳音之五行属性 $\xrightarrow{\text{生}}$ 位置生肖码的五行属性

天干、地支、纳音之五行属性 $\xrightarrow{\text{克}}$ 位置生肖码的五行属性

[注:位置生肖码的五行属性是指该生肖(地支)的五行属性而不是号码尾数的五行属性]

其中属金的生肖 = 申、酉；属木的生肖 = 卯、寅；属水的生肖 = 子、亥；属火的生肖 = 巳、午；属土的生肖 = 辰、戌、丑、未。

每个位置号码只不过是十二生肖（地支）码之一，所以，我们就是要千方百计地通过搜索、判断和识别各种变化状态的临界点而去排除、舍弃绝大多数不可能出现的“生肖”，就是说，每个位置号码其中 11/12 的生肖码是多余的，不可能出现的。

在预测的过程中，为了更好地发挥各种对应关系的预测功能，若位置生肖码的生肖名与开奖日的地支或生肖码间是同名的，则记录为：自刑；不是同名但是五行属性是一致的，则记作为：同刑。例如：巳 $\xrightarrow{\text{自刑}}$ 巳，巳 $\xrightarrow{\text{同刑}}$ 午；子 $\xrightarrow{\text{自刑}}$ 子；子 $\xrightarrow{\text{同刑}}$ 亥；寅 $\xrightarrow{\text{同刑}}$ 卯，申 $\xrightarrow{\text{同刑}}$ 酉等。

一、标准参照系——位置生肖码生克轨迹对应预测法

包括：

- 地支——位置生肖码生克轨迹对应预测法；
- 天干——位置生肖码生克轨迹对应预测法；
- 纳音——位置生肖码生克轨迹对应预测法；
- 生肖码——位置生肖码生克轨迹对应预测法。

指在干支数字信息载体总系统中（包括其它各个分系统），开奖日的地支/天干/纳音/生肖码——位置生肖码进行生克关系轨迹对应过程中，通过记录两者间产生同一方向的相生或相克（相刑）的次数，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性从而达到预测目的。

[说明]

使用此预测法之前必须掌握十二地支（生肖）间的生克关系以及建立中奖号码的生肖码演变系统。

原则与方法

（一）选定适用的系统：所有系统均适用。

(二)检索和找出:识别地支/天干/纳音生肖码——位置生肖码生克轨迹对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高记录”之标准:

①相刑为 3—4 次;同一方向相生或相克 4—5 次(很少达 5 次)

②同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为 6—7 次(很少达 7 次)

(三)搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比;当然具体问题还须具体分析,原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(四)作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

(五)同一位置号码,同一预测内容必须坚持“事应过三”验证法则,最后综合各项的初步预测结果得出最终的预测结论。原则是:必须保证预测结论是准确的。

例 1:2001 年广东四花选 4 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

乙未初九(2)	9 酉	9 酉	10 申	5 丑	金
壬寅十六(9)	10 申	8 戌	13 巳	12 午	金
己酉廿三(16)	1 巳	8 戌	2 辰	1 巳	土
丙辰初一(23)	10 申	8 戌	7 亥	2 辰	土
癸亥初八(30)	9 酉	11 未	2 辰	7 亥	水
庚午十五(7)	10 申	8 戌	12 午	2 辰	土
丁丑廿二(14)	(1)	⊗刑	⊗刑	(4)	水(未开奖,需预测)

——如上图所示的垂直对应, (生肖码) 戌——位置 (2) 之前出现一个变化的明显临界点: $\left\{ \begin{array}{l} \text{戌} \xrightarrow{\text{刑}} \text{戌} \\ \text{戌} \xrightarrow{\text{刑}} \text{戌} \\ \text{戌} \xrightarrow{\text{刑}} \text{未} \\ \text{未} \xrightarrow{\text{刑}} \text{戌} \end{array} \right.$, 所以, 戌与位置 (2) 就不会再出现“相刑”的轨迹对应, 即 $\text{戌} \xrightarrow{\text{刑}} \otimes$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{未} \\ \text{戌} \\ \text{辰} \\ \text{丑} \end{array} \right.$, 从而位置 (2) 就可以排除属土的生肖: 辰、戌、丑、未。

——又如上图所示的斜线对应, 午——位置 (4) 之前出现一个变化的明显临界点 (相刑已达 4 次), 所以, 午与位置 (2) 就不会再出现“相刑”的轨迹对应, 即 $\text{午} \xrightarrow{\text{刑}} \otimes$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{午} \\ \text{巳} \end{array} \right.$, 从而位置 (4) 就可以排除属火的生肖: 午、巳。

例 2: 2000 年广东体彩 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....


壬辰三十(4)	1 辰	11 午	12 巳	15 寅	21 申	26 卯	28 丑—27 寅	水
己亥初七(11)	2 卯	7 戌	11 午	13 辰	19 戌	21 申	22 未—24 巳	木
丙午十四(18)	1 辰	8 酉	11 午	15 寅	21 申	29 子	35 午—23 午	水
癸丑廿一(25)	8 酉	16 丑	17 子	22 未	27 寅	31 戌	33 申—23 午	木
庚申廿八(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)—(8)	木

(未开奖, 需预测)

——如上图所示的平行对应, 申——位置 (1) 之前出现一个变化的较明显临界点 (出现同一方向相生轨迹已达 3 次), 所以, 申与位置 (1) 就不会再出现同一方向的相生关系的对应, 即 $\text{申} \xrightarrow{\text{生}} \otimes$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{子} \\ \text{亥} \end{array} \right.$, 从而位置 (1) 就可以排除属水的生肖: 子、亥。

例 3: 2001 年广东“四花选 4”某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....




——如上图所示的平行对应,位置(3)——纳音木之前出现一个变化的较明显临界点(出现同一方向相克轨迹已达3次),所以,位置(3)与纳音木就不会再出现同一方向的相克关系的对应,即(辰戌丑未)土 $\xleftarrow{\text{克} \otimes}$ 木,从而位置(3)就可以排除属土的生肖:辰、戌、丑、未。

例4:2001年广东体彩7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

纳音 相冲资料



——如上图所示的平行对应,位置(6)——天干甲之前出现一个变化的明显临界点(出现同一方向相生轨迹已达4次),所以,位置(4)与天干甲就不会再出现同一方向的相生关系的对应,即(巳、午) $\xleftarrow{\text{生} \otimes}$ 甲,从而位置(6)就可以排除属火的生肖了:巳、午。

例 5:2000 年某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的系统:

.....

癸丑	廿一(25)	4 丑	16 丑	17 子	22 未	27 寅	31 戌	33 申	— 23 午
庚申	廿八(2)	3 寅	13 辰	16 丑	20 酉	28 丑	29 子	34 未	— 25 辰
丁卯	初六(9)	12 巳	19 戌	18 亥	21 申	31 戌	34 未	35 午	— 10 未
甲戌	十三(16)	6 亥	12 巳	19 戌	20 酉	22 未	24 巳	28 丑	— 35 午
辛巳	廿十(23)	6 亥	10 丑	17 子	18 亥	21 申	29 子	30 亥	— 19 戌
戊子	廿七(30)	10 未	14 卯	21 申	22 未	23 午	27 寅	29 子	— 32 酉
乙未	初五(6)	3 寅	7 戌	17 子	20 酉	23 午	33 申	34 未	— 5 子
壬寅	十二(13)	8 酉	11 午	14 卯	15 寅	26 卯	29 子	31 戌	— 25 辰
己酉	十九(20)	1 辰	3 寅	6 亥	22 未	23 午	33 申	36 巳	— 29 子
丙辰	廿六(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	— (8)

(未开奖,需预测)

——如上图所示的斜线对应,天干己——位置 (1) 之前出现一个变化的明显临界点 (同一方向的相生和相克的混合轨迹达 7 次),所以天干己与位置 (1) 之间就不会再产生同一方向的相生或相克的轨迹对应,即:己 $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ (巳、午),己 $\xleftarrow{\text{克}\otimes}$ (卯、寅),从而位置 (1) 就可以排除了属火的生肖:巳、午以及属木的生肖:卯、寅。

——又如上图所示的斜线对应,午——位置 (7) 之前出现一个变化的明显临界点(同一方向相生关系轨迹已达 4 次!)所以生肖码午与位置 (7) 就不会再产生同一方向相生关系的轨迹对应,即:午 $\xrightarrow{\text{生}\otimes}$ (辰、戌、丑、未),从而位置 (7) 就可以排除属土的生肖了: 丑、未、辰、戌。

——又如上图所示的垂直对应,22 未——位置 (4) 之前出现

生或克

• • • • •

112

置(5)与地支亥就不会再产生相刑关系轨迹对应,即:亥(水) $\xleftrightarrow[\textcircled{\otimes}]{\text{刑}}$

• • • • •

壬戌

28

丙子

癸未

唐宣

丁酉	十五(1)	6	子	8	戌	18	子	25	巳	27	卯	28	寅	33	酉
甲辰	廿二(8)	1	巳	3	卯	18	子	22	申	23	未	25	巳	34	申
辛亥	廿九(15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(未开奖,需预测)						

——如上图箭头所示的斜线对应,地支辰——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相生和相克混合轨迹对应已达6次),所以,位置(2)与地支辰就不会再产生同一方向的相生或相克关系轨迹对应,即:(土) $\xrightarrow{\text{生}} \text{⊗}$ (金) 申、酉,辰(土) $\xrightarrow{\text{克}} \text{⊗}$ (水) 亥、子,从而位置(2)就可以排除属金的生肖码申、酉,以及属水的生肖码亥、子了。

例 8: 2001 年南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....																
庚寅	初八(24)	木	1	巳	7	亥	9	酉	15	卯	22	申	26	辰	32	戌
丁酉	十五(1)	火	6	子	8	戌	18	子	25	巳	27	卯	28	寅	33	酉
甲辰	廿二(8)	火	1	巳	3	卯	18	子	22	申	23	未	25	巳	34	申
辛亥	廿九(15)	金	7	亥	8	戌	11	未	18	子	26	辰	28	寅	34	申
戊午	初六(22)	火	1	巳	11	未	16	寅	23	未	26	辰	31	亥	36	午
乙丑	十三(29)	金	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(未开奖,需预测)						
壬申	廿十(5)	金														

——如上图箭头所示的斜线对应,纳音金——位置(1)之前出现一个变化的较明显临界点(同一方向的相克关系已达4次),所以位置(1)与纳音金就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应,即:巳、午(火) $\xrightarrow{\text{克}} \text{⊗}$ 金,从而位置(1)就可以排除属火的生肖码巳、午了。

例 9：2001 年南粤风采 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

庚辰 廿六(16)	1	巳	4	寅	12	午	19	亥	20	戌	22	申	24	午
丁亥 初三(23)	5	丑	13	巳	17	丑	20	戌	21	酉	24	午	31	亥
甲午 初七(30)	2	辰	4	寅	11	未	17	丑	24	午	25	巳	26	辰
辛丑 十七(6)	1	巳	2	辰	8	戌	12	午	15	卯	19	亥	29	丑
戊申 廿四(13)	2	辰	10	申	12	午	14	辰	25	巳	27	卯	35	未
乙卯 初二(20)	13	巳	15	卯	16	寅	17	丑	18	子	31	亥	36	午
壬戌 初九(27)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)							
己巳 十六(3)														

(未开奖,需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，生肖码 16 寅——位置 (7) 之前出现一个变化的明显临界点(相刑关系已达 4 次)，所以位置 (7) 与生肖码 16 寅就不再产生相刑关系轨迹对应，即：寅(木) $\xrightarrow[\otimes]{\text{刑}}$ 寅、卯，从而位置 (7) 就可以排除属木的生肖码寅、卯了。

[重要说明]

1. 每个位置生肖码均是 1/12 生肖，即是说 11/12 是不可能出现的，所以，千方百计地通过各种方式、渠道去找寻和识别出变化状态的临界点从而准确地排除不可能出现的生肖；最后的预测范围内所剩生肖，经过“还原”就可得出相应的数字号码。从某种意义上来说数字即生肖，生肖即号码。

2. 每个位置生肖码的五行属性与开奖日的天干或地支的五行属性进行对应时，不外乎是相生、相克(相刑)三种关系之一，所以只要根据当时的具体“环境”能作出准确的推算，确认是其中的

一种关系，那么就好办了；最后看有没有无足够的依据去确定这种关系的“方向”性。

记住：每一个未知的位置生肖码，在众多的各个系统内，在众多的各个方位上，在若干个标准参照系的载体中，在各个已知的生肖码位置中，只要能找出有一种“变化状态”能准确地判断和肯定两者间的确切关系，要么相生，要么相克，要么相刑（自刑还是同刑），则就为最终的预测推算带来极大好处！

所以，在预测过程中应时刻留心每个位置生肖码与每个进行对应的“个体”间有没有出现能确认两者关系的临界点！这样做，就能准确地、极大范围地缩减预测范围。

3. 预测推算的过程结束后，把预测范围内的生肖依照当年生肖码挂钩对应的方法即可还原成相应的号码。

二、同名地支（生肖）顺序对应预测法：

指在正常顺序下的总系统中，以某种地支（生肖）的排列顺序作为标准参照系，凡是每个位置生肖码所产生的排列顺序在标准参照系找到2—3个同名同顺序的对应，则可以认为出现一个变化的明显临界点，即是说：相应的第3—4次两者间的对应就不会再出现同名顺序，通过这种对比从而达到预测的目的。

原则与方法：

（一）选定适用的系统：正常顺序下的总系统。

（二）选定适用的地支（生肖）排列顺序：

A 标准：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥、（子）

〔注：这是正常顺序排列〕。

B 标准：子、未、寅、酉、辰、亥、午、丑、申、卯、戌、巳、（子）

〔这是“六十花甲”循环中地支的排列顺序〕

（三）检索和找出：识别位置生肖码的排列顺序在上述的标准排列顺序中得到对应时产生变化临界点的“最高记录”和“次最高

记录”:

①位置生肖码在 A 标准中为:2—3 个(很少达到 3 个)

②位置生肖码在 B 标准中为:2—3 个(很少达到 3 个)

(四) 搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点:以上述制定的标准去衡量、对比;当然具体问题具体分析,原则是:明显者用之,不明显者弃之。

(五) 作出初步预测结果:根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。在实际的预测应用过程中,符合 A 标准者达 3 次的各个位置生肖之排列顺序是很少的,绝大多数的情形是符合 A 标准达 2 次就会产生一个变化的明显临界点。同样,符合 B 标准者达 2 次的各个位置生肖之排列顺序是占少数,大多数的情况是符合 B 标准达 1 次时就会产生一个变化的明显临界点。所以,在 1—12 期同一个小周期中的各个位置生肖在与 A 或 B 标准进行对应时,必须“见机行事”。比如在同一位置的垂直方向前者刚以“最高记录标准之次数在 A 或 B 中得到对应,则接着 1—3 期内的同一位置就不会再在 A 或 B 中以“最高记录标准”的次数再找到对应。

例 1:2000 年广东体彩 36 选 7 某阶段正常顺序下的中奖号码总系统:

.....

甲午初六(3)	3 寅	6 亥	7 戌	17 子	23 午	24 巳	36 巳	—	22 未
辛丑十三(10)	12 巳	17 子	18 亥	22 未	26 卯	30 亥	33 申	—	1 辰
戊申廿十(17)	1 辰	3 寅	13 辰	18 亥	23 午	25 辰	31 戌	—	36 巳
乙卯廿七(24)	11 午	14 卯	17 子	21 申	22 未	31 戌	36 巳	—	35 午
壬戌初五(31)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)

(未开奖,需预测)

——如上图所示的垂直对应中，午——位置(8)之前出现一个变化的明显临界点(辰——→巳——→午的排列顺序与A标准中排列顺序是一致的达3个)，即午——位置(8)的排列顺序不会在A标准中相应地找到第四个，因为A标准的顺序是：辰——→巳——→午——→未，从而位置(8)就可以排除生肖：未。

——又如上图所示的垂直对应中，未——位置(5)之前出现一个变化的较明显临界点(午——→未的排列顺序与A标准中排列顺序是一致的达2个)，即未——位置(5)的排列顺序不会在A标准中相应地找到第3个。因为A标准的顺序是：午——→未——→申，从而位置(5)就可以初步排除生肖：申。

——又如上图所示的垂直对应中，卯——位置(2)之前出现一个变化的较明显临界点(寅——→卯的排列顺序与A标准中排列顺序是一致的达2个)即卯——位置(2)的排列顺序不会在A标准中相应地找到第3个。因为A标准的顺序是寅——→卯——→辰，从而位置(2)就可以初步排除生肖：辰。

——如上图所示的斜线对应，巳——位置(8)之前出现一个变化的明显临界点(卯——→辰——→巳的排列顺序与A标准中排列顺序是一致的达3个)，即巳——位置(8)的排列顺序不会在A标准中相应地找到第4个。因为A标准的顺序是卯——→辰——→巳——→午，从而位置(8)就可以排除生肖：午。

——又如上图所示的斜线对应，位置(1)——卯之前出现一个变化明显的临界点(辰——→卯的排列顺序与A标准中排列顺序是一致的达到2个)，即位置(1)——卯的排列顺序不会在A标准中相应地找到第3个。因为A标准的顺序是：寅——→卯——→辰，从而位置(1)就可以排除生肖：寅。

例2：2001年广东体彩四花选4某阶段正常顺序下的中奖号码总系统：

.....

壬子廿六(19)	1 巳	4 寅	13 巳	1 巳
己未初四(26)	5 丑	6 子	7 亥	3 卯
丙寅十一(3)	10 申	3 卯	8 戌	5 丑
癸酉十八(10)	(1)	(2)	(3)	(4) (未开奖,需预测)

——如上图所示的斜线对应,位置(2)——戌之前出现一个变化的较明显临界点(戌——卯的排列顺序与B标准中排列顺序是一致的达2个),即位置(2)——戌的排列顺序不会在B标准中相应地找到第3个。因为B标准的顺序是:卯——戌——巳,从而位置(2)就可以排除生肖:巳。

——又如上图所示的垂直对应,位置(1)——申之前出现一个变化的较明显临界点(丑——申的排列顺序与B标准中排列顺序是一致的达2个),即位置(1)——申的排列顺序不会在B标准中相应地找到第3个。因为B标准的顺序是丑——申——卯,从而位置(1)就可以排除生肖:卯。

三、同生肖(名)母——子轨迹对应预测法:

在正常顺序下的总系统内,需要预测的各个位置生肖码称作未知“子”,上期中所有的位置生肖码均作为已知“母”,当各个已知“母”与未知“子”进行连线对应,就形成了母——子轨迹对应。即以上一期的位置生肖作为“母”,在此基础上,往上寻找同一位置上的同名“母”及其所对应的“子”。如此往上至少找出4—6次同名母——子轨迹对应(次数越多越好)。通过记录4—6对同名母——子轨迹对应时所产生的同一方向相生或相克或相刑的次数,确认这种变化状态的临界点,根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

(一)选定适用的系统:正常顺序下的总系统。

(二) 检索和找出：识别若干对同名母——子轨迹对应时所产生的同一方向的生克关系的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

- ①同一方向的相生或相克或相刑为：3—4 次(很少达 4 次)
- ②同一方向的相生或相克的混合轨迹为：5—6 次。

(三) 搜索、判断和确认需要预测的位置生肖码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比；当然具体问题具体分析，原则是：明显者用之，不明显者弃之。

(四) 作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

例 1：2000 年某地 36 选 7 某阶段正常顺序的中奖号码总系统：

.....

己酉十九(20)	3 寅	4 丑	6 亥 _生	22 未	23 午	33 申	36 巳—29 子
丙辰廿六(27)	1 辰	8 酉	13 辰 _生	19 戌	20 酉	22 未	24 巳—32 酉
癸亥初三(4)	7 戌	9 申	11 午	14 卯	19 戌	21 申	32 酉—36 巳
庚午初十(11)	10 未	17 子	19 戌	24 巳	27 寅	33 申	35 午—7 戌
丁丑十七(18)	3 寅	7 戌	9 申 _生	12 巳	23 午	24 己	36 巳—25 辰
甲申廿四(25)	3 寅	5 子	12 巳	14 卯	24 巳	28 丑	31 戌—8 酉
辛卯初二(1)	10 未	18 亥	25 辰 _克	26 卯	32 酉	33 申	36 巳—2 卯
戊戌初九(8)	6 亥	8 酉	10 未 _生	13 辰	25 辰	32 酉	36 巳—22 未
乙巳十六(15)	2 卯	6 亥	19 戌	20 酉	21 申	31 戌	34 未—26 卯
壬子廿三(22)	2 卯	3 寅	7 戌	17 子	18 亥	21 申	27 寅—10 酉
己未初一(29)	3 寅	5 子	17 子 _生	20 酉	22 未	31 戌	36 巳—19 戌

(未开奖,需预测)

——又如图所示的斜线对应，以上期的第3位置“7戌”作为“母”，位置(1)作为未知“子”，构成位置(1) ↔ 戌的母——子轨迹对应，在此基础上，往上找寻同母——子轨迹对应。位置(1) ↔ 戌的母——子轨迹对应之前出现一个变化的明显临界点（出现同一方向的相克轨迹达4次），所以，位置(1) ↔ 戌间的母——子轨迹对应就不会再产生同一方向的相克关系轨迹，即（卯、寅） $\xrightarrow{\text{克} \otimes}$ 戌，从而位置(1)就可以排除生肖卯、寅了。

——又如图所示的垂直对应,以上期的第3位置“7 戌”作为“母”,位置(3)作为未知“子”,构成位置(3) ↔ 戌的母子轨迹对应。在此基础上,往上找寻同母——子轨迹对立。位置(3) ↔ 戌的母子轨迹对应之前没有出现一个变化的明显或较明显的临

界点，所以不能据此作出初步预测结论。因为其母——子轨迹对应过程为：

戊	戊	戊	戊	戊，
↓	↓	↓	↓	↓
申	戌	子	戌	位置(3)，这称为“不明显者弃之”。

[重要说明]

每个位置号码的母——子轨迹对应的个性特性是因阶段性的不同而不断产生变化，如何发挥母——子轨迹对应的预测功效，则具体问题具体分析。这种预测方式碰上“机会”效果不错。

在预测过程中，经过各种方法处理后，某个位置所剩下的可能“生肖”范围，可根据生肖——数字——号码所挂钩对应的规则从中“还原”出有关号码。

例如：2001年某只(36选7)中的第一个位置的预测范围是：巳、午、寅、戌。即：巳=1,13,25；午=12,24；寅=4,16,28；戌=8,20,32；因为是第一个位置，根据这只彩票历史资料，第一位出现的号码均是“15”以下的号码，所以可以自然筛选为：巳=1,13；午=12；寅=4；戌=8；此时再结合位置号码尾数所进行的各种预测对应方法，得知第一位置的号码尾数可能出现的范围仅剩下属水、属金的号码尾数，其他已被排除，通过“尾数排除”，上述生肖码就只剩下巳=1，寅=4。

即是说，一只彩票的每个位置号码的最后预测范围，最佳的结合方法是：位置号码尾数(五行属性)+生肖码。当然有时候位置号码尾数经过五行属性的预测技术处理后，剩下的准确的预测范围经很小，就不用结合“生肖码”了。

一般情况下，乐透型彩票的最后位置号码和第一位置号码可以不结合“生肖码”而可以通过其他各种方法去预测推算。传统型彩票因为游戏规则的关系，其每个位置号码的范围均是0—9，所

以最后的预测范围最好还是位置号码尾数 + 生肖码。

总之，每个位置号码的最终预测结论是所有准确的、可靠的预测结果之综合！

第十二节 同数字母——子轨迹对应预测法

所谓同数字母——子轨迹对应预测法，就是指在正常顺序下的总系统内，需要预测的各个位置号码称作未知“子”，上期中所有的位置号码均作为已知“母”，当各个已知“母”与未知“子”进行连线对应，就形成了母——子轨迹对应。即以上一期的位置号码作为“母”，在此基础上，往上寻找同一位置上的同数字“母”及其所对应的“子”，如此往上至少找出 4—6 次同数字母——子轨迹对应。通过记录 4—6 对同数字母——子轨迹对应时所产生的同一方向相生或相克或相刑的次数，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

本预测法与生肖码同名母——子轨迹对应预测法大同小异。后者的同名母是指“同名生肖”，子是指“生肖”；而前者的同数字母是指“同一数字号码”（不是尾数），子是指“具体各个数字号码”。

（一）选定适用的系统：正常顺序下的总系统。

（二）检索和找出：识别若干对同数字母——子轨迹对应时所产生的同一方向的生克关系的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

①对于乐透型彩票，同一方向的相生或相克或相刑为：3—4 次（很少达 4 次）。

对于传统型彩票，同一方向的相生或相克或相刑为：4—5 次（很少达 5 次）

②同一方向的相生和相克的混合轨迹为 5—6 次。

(三) 搜索、判断和确认需要预测的位置号码之变化状态的明显临界点：以上述制定的标准去衡量、对比；当然具体问题具体分析，原则是：明显者用之，不明显者弃之。

(四) 作出初步预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除和舍弃。

例 1：某地 36 选 7 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

乙巳十六(15)	2	6	11	14	21	31	34 — 26
壬子廿三(22)	1	3	7	17	18	21	27 — 20
己未初一(29)	1	5	17	20	22	31	36 — 19
丙寅初八(5)	15	18	20	25	27	34	36 — 7
癸酉十五(12)	6	9	11	15	23	31	36 — 25
庚辰廿二(19)	6	17	18	20	26	29	31 — 25
丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35 — 33
甲午初六(3)	3	6	7	14	23	24	36 — 22
辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33 — 1
戊申廿十(17)	1	3	17	18	28	30	31 — 36
乙卯廿七(24)	11	14	17	19	22	31	33 — 35
壬戌初五(31)	3	14	25	28	30	32	34 — 26
己巳十二(7)	1	4	5	6	7	10	30 — 33
丙子十九(14)	1	3	14	19	24	28	33 — 20
癸未廿六(21)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) — (8) (未开奖,需预测)

——如上图所示的第七位置的垂直对应；可找到同数字“36”

母——子轨迹对应过程为： $\begin{array}{cccc} 36 & 36 & 36 & 36 \\ \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{生}} \\ 36 & 36 & 31 & 33 \end{array}$ ，即出现一个三次的同一方向“相刑”后，第四次的母——子轨迹对应就不再产生同一方向的“相刑”关系轨迹了。

——又如上图所示的第一个位置的斜线对应，以上期的号码“1”作为同数字母，需要预测的位置(7)作为未知“子”，往上找出

其同数字母——子轨迹对应过程： $\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{刑}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}}? \\ 36 & 36 & 36 & 33 & 33 & \text{位置(7)} \end{array}$ 可

以认为“1——位置(7)”之前出现一个变化的较明显临界点(出现同一方向的相生轨迹已达2次)，所以“1——位置(7)”之间就不会再出现同一方向的相生关系的轨迹对应，即： $1 \xrightarrow{\text{生}} \text{木}$ ，从而位置(7)就可以排除属木的号码[3]和[8]了。

——又例如：第一位置与第三个位置间的斜线对应，以上期的号码“1”作为同数字母，需要预测的位置(3)作为未知“子”，往上找出

其同数字母——子轨迹对应过程为： $\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}}? \\ 17 & 20 & 7 & 17 & 14 & \text{位置(3)} \end{array}$

因为上述的这阶段同数字母——子轨迹对应的变化临界点不是那么明显，故不能据此作出预测结果，弃之不用。

——又例如：第一个位置与第四个位置间的斜线对应，以上期的号码“1”作为同数字母，需要预测的位置(4)作为未知“子”，往上找出

其同数字母——子轨迹对应过程为： $\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{克}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}} & \downarrow_{\text{生}}? \\ 20 & 25 & 14 & 19 & 19 & \text{位置(3)} \end{array}$

可以认为“1——位置(4)”之前出现一个变化的明显临界点(出现同一方向的相生关系轨迹过3次；而且出现同一方向的相生和相克关系混合轨迹已达5次)，所以“1——位置(4)”之间就不会再出现同一方向的相克或相生关系轨迹对应了，即：“1”生木，“1”——火，从而位置(4)就可以排除属木、属火的号码：[3]、[8]、

[2]、[7]了。

——至于继续以上期的号码“1”作为同数字母，其他需要预测的位置作为未知“子”，即 $\overset{1}{\uparrow}$ 位置(1) $\overset{1}{\uparrow}$ 位置(2) $\overset{1}{\uparrow}$ 位置(5) $\overset{1}{\uparrow}$ 位置(8) 这些位置的同数字母——子轨迹斜线对应均未能出现一个变化的明显临界点，而只能弃之不用。

[重要说明]

有多少个位置号码，就相应有多少对母——子轨迹对应，上一期中的每一个已知位置号码均可以成为下一期未知的每一个位置号码之“母”。母——子轨迹对应可以是垂直对应，也可以是斜线对应。

例 2:某地传统型彩票某阶段中奖号码的正常顺序的总系统:

.....

庚申十五(13)	0	2	9	3	1	1—4 (其他资料省略)
丁卯廿二(20)	5	4	1	2	5	6—2
甲戌廿九(27)	5	2	0	0	9	5—3
辛巳初七(3)	0	5	8	5	2	1—7
戊子十四(10)	2	8	6	5	5	8—4
乙未廿一(17)	0	1	3	3	7	5—1
壬寅廿八(24)	8	3	9	4	0	0—2
己酉初五(3)	5	8	3	9	7	5—9
丙辰十二(10)	0	4	9	2	7	7—3
癸亥十九(17)	7	2	6	1	5	2—2
庚午廿六(24)	1	2	3	6	7	9—4
丁丑初四(31)	3	0	1	8	3	6—5
甲申十一(7)	7	7	8	3	2	0—1
辛卯十八(14)	0	8	2	9	7	5—1
戊三廿五(21)	0	5	2	2	0	0—8
乙巳初三(28)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(7)(未开奖,需预测)

——如上图所示的斜线对应，以上期的第一个位置号码“0”作为同数字“母”，需要预测的位置(5)作为未知“子”，往上找出其同数字母——子轨迹对应过程为：

0	0	0	0	0	0
↓ _刑	↓ _刑	↓ _刑	↓ _刑	↓ _刑	↓ _?
5	5	0	5	5	位置(5)

(注：这种情况很少见)可以认为“0——位置(5)”之前出现一个变化的明显临界点(出现同一方向的相刑关系轨迹达5次!)，所以“0——位置(5)”之间就不会再出现同一方向的相刑关系轨迹对应了，即：“0” $\xleftrightarrow{\otimes}$ 土，从而位置(5)就可以排除属土的号码[5]、[0]了。

至于其它位置的同数字“0”母——子轨迹对应即：

0	0	0	0	0	0
↓	↓	↓	↓	↓	↓
位置(1)	位置(2)	位置(3)	位置(4)	位置(6)	特别号码

这些位置的同数字母——子轨迹斜线对应均未能出现一个变化的明显临界点，而只能弃之不用。

——又如上图所示的第六个位置的垂直对应，以上期的第六个位置“0”作为同数字“母”，需要预测的位置(6)作为未知“子”，往上找出其同数字母——子轨迹对应过程为：

0	0	0
↓ _刑	↓ _刑	↓ _?
5	5	位置(5)

按正常情况下，上述这个母——子轨迹对应过程是属于不明显者，但其有特殊情况：正常顺序下第六位置已连续出现0—5—0—？，即三次“土”，故“0—位置(6)”之前可以认为出现一个变化的较明显临界点，所以“0—位置(6)”就不会再发生相刑关系轨迹对应了，从而0 $\xleftrightarrow{\otimes}$ 土，位置(6)就可以排除属土的号码[5]、[0]了。

这种情形的灵活处理就是“具体问题具体分析”的体现，在正常顺序下，许多的同数字母——子轨迹对应往往是产生2次的同一方向的相生或相克或相刑时就会产生一个变化的较明显临界点，碰上“疑点”时则应善于观察、分析其周围的“关系”“空间”以便能充分利用每一个稍纵即逝的机会。

第十三节 位置号码的预测推算方法总结

一、标准参照系——位置号码生克轨迹对应预测法(★★★★★)

1. 天干——位置号码生克轨迹对应预测法：

● 适用系统：所有系统(除主题系统外)

● 产生明显临界点的次数：

①乐透型彩票——同一方向中的相生或相克或相刑为：3—4次；

四花选4彩票——同一方向的相生或相克或相刑为：4—5次。

②同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为：

6—7次——乐透型彩票

6—7次——四花选4彩票

③生克混合轨迹对称来回的方向达3—4次。

2. 地支——位置号码生克轨迹对应预测法：

● 适用系统：所有系统(除主题系统外)。

● 产生明显临界点的次数：

①同一方向的相生或相克或相刑为：

3—4次——乐透型彩票

4—5次——四花选4彩票

②同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为：

6—7次——乐透型彩票

6—7次——四花选4彩票

③生克混合轨迹对称来回的方向达3—4次。

3. 纳音——位置号码生克轨迹对应预测法：

● 适用系统：所有系统(除主题系统外)。

● 产生明显临界点的次数：

①同一方向的相生或相克或相刑为：4—5次(相生或相克)

4—5次(相刑)

②同一方向的相生和相克（不含相刑）混合轨迹为：5—6次（很少达6次）。

③生克混合轨迹对称来回的方向达3—4次。

4. 农历尾数——位置号码生克轨迹对应预测法和新历尾数——位置号码生克轨迹对应预测法以及相冲岁数（尾数）——位置号码生克轨迹对应预测法：

●适用的系统：总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

●产生明显临界点的次数：

①同一方向的相生或相克为：4—5次；相刑：3—4次。

②同一方向的相生和相克（不含相刑）混合轨迹为：5—6次。

③生克混合轨迹对称来回的方向达3—4次。

二、标准参照系——位置号码主题轨迹对应预测法（★★★★★）

包括农历尾数——位置号码主题轨迹对应预测法、新历尾数——位置号码主题轨迹对应预测法和相冲岁数（尾数）——位置号码主题轨迹对应预测法。

●适用的系统：所有系统（除农历系统、新历系统外）

●产生明显临界点的次数：

位置号码与农历尾数/新历尾数/相冲岁数（尾数）进行主题配搭关系对应时。

①均是纯主题或杂主题为：3—4次（极少达4次）

②纯主题和杂主题混合为：4—5次（很少达5次）

三、号码——位置号码生克轨迹对应预测法（★★★★★）

●适用的系统：总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统。

●产生明显临界点的次数：

①同一方向相生或相克为：4—5次，相刑为3—4次。

②同一方向的相生和相克（不含相刑）混合轨迹为：6—7次

③生克混合轨迹对称来回的方向达3—4次。

四、号码——位置号码主题轨迹对应预测法(★★★★★)

●适用的系统:所有系统(除农历系统、新历系统外)。

●产生明显临界点的次数:

①均是纯主题或杂主题为:3—4次。

②纯主题和杂主题混合为:4—5次。

五、九宫星——位置号码生克轨迹对应预测法

●适用的系统:总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

●产生明显临界点的次数:

①同一方向相生或相克轨迹对应为:相刑2—3次(很少达3次);相生或相克3—4次(很少达4次)。

②同一方向的相生和相克之混合轨迹为:4—5次(很少达5次)。

六、九宫星——位置号码主题轨迹对应预测法

●适用的系统:总系统、干支系统、纳音系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统。

●产生明显临界点的次数:

九宫星数字——位置号码进行主题配搭对应时——

①均是纯主题或杂主题为:2—3次(很少达3次)。

②纯主题和杂主题的混合主题轨迹为:4—5次(很少达5次)。

七、数字——位置号码加法轨迹对应预测法(★★★★★)

1. 数字——位置号码等距加法轨迹对应预测法:

●适用的系统:所有系统(除号码等距离环环相比系统)。

●产生明显临界点的次数:数字与位置号码进行等距加法轨迹平行或斜线对应时——

①正常顺序下的总系统内,若干对相加所得之和的尾数是一致的次数:2—3次。

②在其他各个分系统中,若干对相加所得之和的尾数是一致的次数:3—4次(很少达4次)。

③数字——位置号码间进行垂直对应时,正常顺序下总系统内相加之和的尾数是一致的次数:3—4次(极少达4次)。

2. 数字——位置号码等值加法轨迹对应预测法:

●适用的系统:所有系统均适用。

(1)三角等值加法轨迹对应预测法:数字与数字间等边三角形式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同时——

●产生明显临界点的次数:1—2次(总系统内)

2—3次(其他各个分系统)

(2)夹心等值加法轨迹对应预测法:数字与数字间夹心式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同时——

●产生明显临界点的次数:1—2次(总系统内)(极少达2次)

2—3次(其他各个分系统)(很少达3次)

(3)不规则等值加法轨迹对应预测法:数字与另一数字间不规则式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同时——

●产生明显临界点的次数:2—3次(总系统内)

3—4次(其他各个分系统)(极少达4次)

(4)直线等值加法轨迹对应预测法:数字与另一数字间直线式的相加之和的尾数值与分别对应的位置号码尾数相同时——

●产生明显临界点的次数:1—2次(总系统内)

2次(其他各个分系统中)(极少者可达3次)

八、数字——位置号码等值乘法轨迹对应预测法(★★★★★)

可分为:等距乘法轨迹对应、三角等值乘法轨迹对应、直线等值乘法轨迹对应、不规则等值乘法轨迹对应。

●适用的系统:所有系统均适用。

●产生明显临界点的次数:

——数字与数字间进行相乘，所得之积的尾数在相应位置号码中找到等值对应时：2—3 次。

九、十二地支(生肖)预测推算中奖号码的方法

1. 标准参照系——位置生肖码生克轨迹对应预测法：

(包括) 地支/天干/纳音/生肖码——位置生肖码生克轨迹对应预测法：

●适用的系统：所有系统均适用。

●产生明显临界点的次数：

①相刑 3—4 次；同一方向相生或相克 4—5 次(很少达 5 次)。

②同一方向的相生和相克(不含相刑)混合轨迹为：6—7 次(很少达 7 次)。

2. 同名地支(生肖)顺序对应预测法：

●适用的系统：总系统。

●产生明显临界点的次数：

①位置生肖码在 A 标准中为：2—3 个(很少达到 3 个)。

②位置生肖码在 B 标准中为：2—3 个(很少达到 3 个)。

3. 同生肖(名)母——子轨迹对应预测法：

●适用的系统：总系统。

●产生明显临界点的次数：

①同一方向的相生或相克或相刑为：3—4 次(很少达 4 次)。

②同一方向的相生和相克的混合轨迹为：5—6 次。

十、同数字母——子轨迹对应预测法

●适用的系统：总系统。

●产生明显临界点的次数：

①对于乐透型彩票，同一方向的相生或相克或相刑为：3—4 次(很少达 4 次)；对于四花选 4 彩票；同一方向的相生或相克或相刑为：4—5 次(很少达 5 次)。

②同一方向的相生和相克的混合轨迹为:5—6次。

[重要说明]

上述标题含“★★★★★”者是最重要的预测法,彩民必须熟练掌握,其他方法可选用,或不用。

上述共十大类预测法,是专门解决每一个位置号码的预测推算的不同方式。但无论何种预测法,万变不离其宗,即是发挥各个系统的功能(指对各种“相同项”的分类与归纳),千方百计地挖掘和识别出各种变化状态的明显临界点。正所谓“东方不亮西方亮”,每一个位置号码可以按部就班地用上述十种预测法去进行预测推算,明显者用之,不明显者弃之。

在预测推算过程中,必须自始至终坚持“事应过三”的验证法则。由于彩票游戏规则的不同,各种预测方式和预测方法在识别变化的明显临界点的次数这个关键问题上,必须灵活地、具体问题具体分析地适当微调!

在预测过程中,对于“最高记录”标准之使用,抓住99%总趋势与特点,放弃偶然的1%,在所难免。

为了充分保证预测结果是准确的,在应用各式各样的预测方法时,能采用“最高记录”标准去识别变化的明显临界点则最好,其相应的预测结论则最可靠。当然,灵活、变通地采用“次最高记录”标准去识别变化的临界点也是十分必要的重要的。

在预测方法的具体应用过程中,既不轻易地放过一个机会,又不轻率地、侥幸地、勉强地去识别变化状态的临界点。由于每个阶段、每个周期的开奖号码具有其个性,有时候若干个位置号码的若干种变化状态处于较明显的转折点,有时候若干个位置号码的其它变化状态处于不十分明显的过程,所以坚持预测原则与方法后的各个位置号码“幸存”下来的预测范围,该如何就如何,必须客观地尊重事实。

例如：某期次 36 选 7 经过十一大类预测方法处理后，各个位置的预测范围产生了，其交叉组合过程如下：

——首先确定分组：A；B + C；D + E；F + G。

——分组后第一次组合：

$$B + C = \begin{cases} B[0]、[1] \longrightarrow 10、20、11、21 \text{ (可能的号码)} \\ C[1]、[3] \longrightarrow 11、21、13、23 \text{ (可能的号码)} \end{cases}$$

交叉后的组合为：10 11 10 21 20 21 20 23 10 13
 11 21 11 13 11 23 21 23 10 23

	A	B	C	D	E	F	G
[位置]	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(五行属性)	土	土	木	土	水	金	水
(相应的尾数)	火	水	水	火	金	土	土
	[5][0]	[0]	[3]	[0]	[1]	[9]	[1]
	[2]	[1]	[1]	[2]	[9]	[0]	[0]

$$D + E = \begin{cases} D[0]、[2] \longrightarrow 10、20、22、32 \text{ (可能的号码)} \\ E[1]、[9] \longrightarrow 11、21、19、29 \text{ (可能的号码)} \end{cases}$$

交叉后的组合为：10 11 10 21 10 19 10 29
 20 21 20 29 22 29

——分组后第二次组合为(B + C) + (D + E)：

<u>10 11</u> <u>10 21</u> <u>20 21</u> <u>20 23</u>		<u>10 11</u> <u>10 21</u> <u>10 19</u> <u>10 29</u>
<u>11 21</u> <u>11 13</u> <u>11 23</u> <u>21 23</u>		<u>20 21</u> <u>20 29</u> <u>22 29</u>
<u>10 13</u> (B + C)		(D + E)
<u>10 23</u>	↓	

交叉后的组合为：

Ⅱ:
$$\begin{cases} \underline{10\ 11\ 20\ 21} & \underline{10\ 21\ 22\ 29} & \underline{11\ 21\ 22\ 29} \\ \underline{10\ 11\ 20\ 29} & \underline{20\ 21\ 22\ 29} & \underline{11\ 13\ 20\ 21} \end{cases}$$

10 11 22 29 10 13 20 21 11 13 20 29
10 13 20 29 11 13 22 29
10 13 22 29

——第三次组合: $[(B + C) + (D + E)] + (F + G)$

$F + G = \begin{cases} F[9]、[0] \longrightarrow 19、29、20、30(\text{可能的号码}) \\ G[1]、[0] \longrightarrow 11、21、31、20、30(\text{可能的号码}) \end{cases}$

I: $\begin{cases} \underline{19\ 20} & \underline{19\ 30} & \underline{19\ 21} & \underline{19\ 31} \\ \underline{29\ 31} & \underline{29\ 30} & \underline{20\ 21} & \underline{20\ 31} \\ \underline{20\ 30} & \underline{30\ 31} & & \end{cases}$

——把 I + II 配对组合得出:

10 11 20 21 29 31 10 11 20 21 30 31
10 11 20 21 29 30 10 11 20 29 30 31
10 11 22 29 30 31 10 21 22 29 30 31
10 21 22 29 30 31 20 21 22 29 30 31
11 21 22 29 30 31 11 13 20 29 30 31
11 13 20 21 29 31 11 13 22 29 30 31
11 13 20 21 29 30 10 13 20 24 29 31 10 13 20 29 30 31
11 13 20 21 30 31 10 13 20 21 29 30 10 13 22 29 30 31
10 13 20 21 30 31

——第四次组合: $A + \{[(B + C) + (D + E)] + (F + G)\}$

$A = \begin{cases} [5]、[0] \longrightarrow 5、15、10、20(\text{可能的号码}) \\ [2] \longrightarrow 2、12(\text{可能的号码}) \end{cases}$

即:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A B C D E F G A B C D E F G
2/5 10 11 20 21 29 31 ; 2/5 10 11 20 21 30 31
2/5 10 11 20 21 29 30 ; 2/5 10 11 20 21 30 31

2/5 10 11 22 29 30 31 ; 2/5 10 21 22 29 30 31
2/5 10 21 22 29 30 31 ; 2/5 20 21 22 29 30 31
2/5 11 21 22 29 30 31 ; 2/5 11 13 20 29 30 31
2/5 11 13 20 21 29 31 ; 2/5 11 13 22 29 30 31
2/5 11 13 20 21 29 30 ; 2/5 10 13 20 21 29 31
2/5 11 13 20 21 30 31 ; 2/5 10 13 20 21 29 30
2/5 10 13 20 21 30 31
2/5 10 13 20 29 30 31
2/5 10 13 22 29 30 31

这样经过上述四次的交叉组合后就初步得出了位置号码预测小范围的排列组合。

但这还不足够,为了令投注额能进一步减少,就必须对小范围的排列组合在总体结构上,整体和局部配搭上再去“过滤”和“提纯”,下面的章节就专门介绍中奖号码的总体结构的预测推算方法。

请记住:只要认真遵循本书所介绍的各种预测方式和预测方法进行推算,若每个位置号码的预测推算的每一项内容,每一个步骤,每一个环节均做到准确无误的话,则“全中”就是意料之内的事情。

每个位置号码的预测推算,不是找寻最大可能出现的号码或其组合,而是千方百计地排除绝大多数其不可能出现的号码或其组合。

能准确地把每一个位置号码的可能出现范围压缩得越小,则你中大奖的机会就越高!

预测方式和预测方法的机制、原理是绝对的,各种变化状态的临界点是相对的,可以“因地制宜”,“随机应变”,没有绝对不变的临界点,只有众多的等待你去识别的“机会点”,坚持抓住 99% 的普遍性的正确特点,放弃偶然出的 1% 的特殊性。

第六章 中奖号码的总体结构之一： 主题与主题类型的预测推算原则与方法

第一节 系统——主题预测法

如果说位置号码的预测推算是在“微观”上去约束和限制开奖号码的选择范围，那么，总体结构的预测推算则是在“宏观”上去约束和限制开奖号码的配搭范围。

中奖号码总体结构的预测推算的前提是：建立完善的、齐全的干支数字信息载体总系统和各个分系统。

主题预测法的核心是：在五大主题即[1·9]主题、[2·8]主题、[3·7]主题、[4·6]主题、[5·0]主题当中，有哪些主题会出现，有哪些主题不会出现。出现的主题称为实主题，没有出现的主题称为虚主题。所以，主题预测法的中心点也是要搜索、判断和识别主题变化的临界点，尽量排除不可能出现的主题以及其配搭！

主题配搭的总范围包括：

(一)

[1·9]+[2·8]		[1·9]+[2·8]+[3·7]		[1·9]+[3·7]+[4·6]
[1·9]+[3·7]	或	[1·9]+[2·8]+[4·6]	或	[1·9]+[3·7]+[5·0]
[1·9]+[4·6]		[1·9]+[2·8]+[5·0]		[1·9]+[4·6]+[5·0]
[1·9]+[5·0]				

- (二) $[2 \cdot 8] + [3 \cdot 7]$ $[2 \cdot 8] + [3 \cdot 7] + [4 \cdot 6]$
 $[2 \cdot 8] + [4 \cdot 6]$ 或 $[2 \cdot 8] + [3 \cdot 7] + [5 \cdot 0]$
 $[2 \cdot 8] + [5 \cdot 0]$ $[2 \cdot 8] + [4 \cdot 6] + [5 \cdot 0]$

(上述配搭形式：缺 $[1 \cdot 9]$ 主题，即 $[1 \cdot 9]$ 主题为虚主题)

- (三) $[3 \cdot 7] + [4 \cdot 6]$ 或 $[3 \cdot 7] + [4 \cdot 6] + [5 \cdot 0]$
 $[3 \cdot 7] + [5 \cdot 0]$

(上述配搭形式：缺 $[1 \cdot 9]$ 和 $[2 \cdot 8]$ 主题，即 $[1 \cdot 9]$ 和 $[2 \cdot 8]$ 成为虚主题)

- (四) $[4 \cdot 6] + [5 \cdot 0]$

(上述配搭形式：缺 $[1 \cdot 9]$ 、 $[2 \cdot 8]$ 和 $[3 \cdot 7]$)

- (五) $[1 \cdot 9]$ 或 $[2 \cdot 8]$ 或 $[3 \cdot 7]$ 或 $[4 \cdot 6]$ 或 $[5 \cdot 0]$

(上述配搭形式：单独主题形式出现)

——目前流行的乐透型彩票(三十几选7；几十选6；几十选5等等)和传统型彩票(000000-999999型)的中奖号码的总体结构是上述(共25种配搭或单独形式)之一。换句话说：每一期的开奖号码和主题，只不过是上述配搭形式的 $1/25$ ，只要能准确地、尽量地排除绝大部分($24/25$)不可能出现的主题或主题配搭形式，所剩下的范围就是(需要预测即将开奖的期次)中奖号码出没的范围！

所以，预测中奖号码的实主题和虚主题同样重要。

系统——主题预测法，指在总系统和各个分系统中，通过对比该系统整体的主题出没的趋势，确认上下两期间有或没有主题相同，从而在总体结构上去预测中奖号码的组成。

通过直观法对中奖号码结构缩写的观察、分析即知：上下两期间有或没有主题相同，一目了然。为了便于预测使用，若有一个主题相同，则在两期之间记作符号“①”，若有二个主


题相同，则在两期之间记作符号“②”，如果是有三个主题相同，在两期之间则记作符号“③”，如果两期间没有主题相同，则记作符号“⊗”。

原则与方法：


(一)选定适用的系统：正常顺序下的总系统和各个分系统。

(二)检索和找出：识别系统内上下两期间主题异同变化状态临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准。

a. 同一个主题在系统内(各个系统)连续出现：4—5次(很少达5次)；(南粤风采同一个主题在系统内可偶然出现6—7次)。



c. 在三十几选7彩票中，连续出现记录符号：



[重要说明]

每只彩票由于游戏规则的原因导致上下两期次间主题有无异同的次数的“最高记录”和“次最高记录”是有所区别的。其实，每只彩票上下期次间主题异同次数之趋势只要查

看其正常顺序下的总系统的结构缩写就知道。(当然期次至少
要有一年半以上)即是说, 系统——主题预测法要根据游戏规
则下的彩票玩法而灵活使用, 总之, 具体问题具体分析。

例如：在 36 选 7 中，农历系统上下两期次间绝大多数有 1—2 个主题相同，即使没有相同者，也只是一次，第二次起又恢复主题有相同对应的特点。

在 36 选 7 中，新历系统、主题系统、纳音系统中，上下两期次间大多数有 1—2 个主题相同，即使没有相同者，记录符号往往出现一次“⊗”或连续二次“⊗—⊗”时，第三次起又恢复主题有相同对应的趋势。

(三)搜索、判断和确认需要预测的期次与上一期次间有没有主题异同的明显临界点：根据该系统的特点与趋势去衡量和对比，明显者用之，不明显者弃之；具体问题具体分析。

(四)作出初步预测结果：根据识别出的期次间有没有主题相同之明显临界点作出相应的排除或肯定。

(五)同一主题是否出没，必须坚持“事应过三”的验证法则，最后综合各项的初步预测结果得出最终的结论。原则是：必须保证结论是准确的。

例 1:某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

丙戌	廿九(23)	1	4	5	10	26	30	34—8	土	[5+0+0][4+4+6]	[1] ①
癸巳	初七(30)	1	4	6	11	13	14	27—19	水	[1+1][4+4+6]	[3+7] ⊗
庚子	十四(6)	5	7	10	12	25	32	36—29	土	[5+5+0][2+2]	[7,6] ⊗
丁未	廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34—26	水	[6+6+4][3+3]	[1,2] ①
甲寅	廿八(20)	14	22	24	27	29	34	35—8	水	[4+4+4][2,7,9,5]	⊗

(注：其他资料省略)

辛酉_{初五(27)} 10 18 19 22 23 26 32—30 木 $[8+2+2][9,3,0,6]$
 戊辰_{十二(6)} 1 2 5 7 17 19 23—30 木 $[7+7+3][1+9][2,5]$
 乙亥_{十九(13)} 11 14 15 22 28 33 36—3 火 $[2+8][4+6][1,3,5]$
 壬午_{廿六(20)} 1 5 6 9 15 33 35—28 木 $[5+5+5][1+9][6,3]$
 己丑_{初三(27)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 火 (未开奖, 需预测)

——上述己丑初三(27)在应用系统——主题预测法时, 壬午——己丑期次间出现一个变化的明显临界点(已连续出现主题没有相同的记录符号“⊗”达4次), 所以壬午——己丑之间肯定有主题相同, 即:

壬午 = $[5+5+5]$ 、 $[1+9]$ 中的 $[1 \cdot 9]$ 、 $[5 \cdot 0]$ 主题至少有其一出现在下一期的己丑的总体结构内。

例2: 某地7/36某阶段中奖号码的同名纳音[火]系统:

.....

乙亥_{十二(18)} 8 9 10 11 18 19 24—1 火 $[8+8][1+9+9][0,4]$
 己丑_{廿六(1)} 1 2 4 14 15 17 23—34 火 $[4+4][3+7][1,2,5]$
 丙申_{初四(8)} 4 10 17 22 25 28 34—19 火 $[4+4][2+8][5+0][7]$
 丁卯_{初六(9)} 5 14 18 21 31 34 35—10 火 $[4+4][1+1][5+5][8]$
 甲戌_{十三(16)} 6 12 19 20 22 24 28—35 火 $[4+6][2+2+8][0,9]$
 戊子_{廿七(30)} 3 14 21 22 23 27 29—32 火 $[3+3+7][1+9][2,4]$
 乙巳_{十六(15)} 2 6 11 14 21 31 34—26 火 $[1+1+1][4+4+6][2]$
 己未_{初一(29)} 1 5 17 20 22 31 36—19 火 $[1+1][5+0][7,2,6]$
 丙寅_{初八(5)} 15 18 20 25 27 34 36—7 火 $[5+5+0][4+6][7,8]$
 丁酉_{初十(5)} 2 3 10 18 19 22 30—25 火 $[0+0][2+2+8][3,9]$

(注: 其他资料省略)

甲辰^{十七(12)} 8 10 13 19 20 21 36—12 火 [0+0][1+9][8,3,6]
 戊午^{初一(26)} 1 10 15 21 24 30 35—12 火 [0+0+5+5][1+1][4]
 乙亥^{十九(13)} 11 14 15 22 28 33 36—3 火 [2+8][4+6][1,5,3]
 己丑^{初三(27)} 5 6 12 21 30 31 35—4 火 [5+5+0][1+1][6,2]
 丙申^{初十(3)} 2 6 7 11 12 17 23—19 火 [7+7+3][2+2][1,6]
 戊子^{初四(24)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 火 (未开奖, 需预测)
 ?

——上述戊子初四(24)在应用系统——主题预测法时, 丙申——戊子期次间出现一个变化的明显临界点(已连续出现主题没有相同的记录符号“⊗”达3次), 所以丙申——戊子之间肯定有主题相同, 即:

丙申 = [7+7+3][2+2][1, 6]中的[3·7]、[2·8]主题至少有其一出现在下一期的戊子的总体结构内。

[说明]

同名纳音系统(包括金、木、水、火、土)中期次间主题异同次数在各个系统间既有共性, 又有个性, 经互相观察、对比, 这种变化的趋势与特点就比较明显了。如在7/36的同名纳音系统中, 上下期次间没有主题相同者, 还未发现有超过三次的; 有主题相同者最多不会超过六次。所以在上例中丙申——戊子之前已连续出现三次“⊗”符号时, 则就可以认为这是一个明显的临界点。

例3: 某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊午^{初一(26)} 1 10 15 21 24 30 35—12 火 [5+5+0+0][1+1][4]
 乙丑^{初八(2)} 5 13 23 27 28 30 35—19 金 [5+5+0][3+3+7][8]
 壬申^{十五(9)} 3 17 23 26 30 35 36—28 金 [3+3+7][5+0][6+6]
 ①
 ②
 ③

己卯_{廿二(16)} 6 14 17 24 25 30 33—10 土 [3+7][5+0][4+4+6]^②
 丙戌_{廿九(23)} 1 4 5 10 26 30 34—8 土 [5+0+0][4+4+6][1][?]
 癸巳_{初七(30)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 水 (未开奖, 需预测)

(注: 其他资料省略)

——上述癸巳初七(30)在应用系统——主题预测法时, 丙戌——癸巳期次间出现了一个变化的明显临界点(连续出现主题间相同的记录符号“②—③—②”已达三轮), 所以, 丙戌——癸巳之间所出现的记录符号就不会再是“②”或“③”了, 即是丙戌 = $[5 \cdot 0] + [4 \cdot 6]$ 中的 $[5 \cdot 0]$ 主题和 $[4 \cdot 6]$ 主题肯定不会同时配搭出现在下一期的癸巳的总体结构内。

例 4: 某地 7/36 某阶段中奖号码的农历系统:

.....

丙申_{初四(8)} 4 10 17 22 25 28 34—12 火 [4+4][2+8][5+0][7]^①

丙午_{十四(18)} 1 8 11 15 21 29 35—23 水 [1+1+1+9][5+5][8][⊗]

甲申_{廿四(25)} 3 5 12 14 24 28 31—8 水 [4+4][2+8][5,3,1]^①

辛亥_{廿四(19)} 1 16 17 18 19 22 27—11 金 [1+9][2+8][7+7][6]^①

庚子_{十四(6)} 5 7 10 12 25 32 36—29 土 [5+5+0][2+2][7,6]^①

庚戌_{廿四(17)} 6 11 12 18 19 27 30—34 金 [2+8][1+9][0,6,7]^②

己亥_{十四(5)} 1 11 12 23 26 28 31—2 木 [1+1+1][2+8][3,6][?]

戊子_{初四(24)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 火 (未开奖, 需预测)

(注: 其他资料省略)

——上述戊子初四(24)在应用系统——主题预测法时, 己亥——戊子期次间出现一个变化的明显临界点($[2 \cdot 8]$ 主题连续出现 5 次), 所以, 己亥——戊子之间肯定不会再出现 $[2 \cdot 8]$ 主题对应, 即是说戊子初四(24)的总体结构中 $[2 \cdot 8]$ 主题不会出

现。

另外，在上例当中，还有一个变化的明显临界点：连续四次均出现副码[6]。在正常情况下，在各个系统内连续出现某个副码达四次已是“最高记录”。所以戊子初四(24)的总体结构肯定不会仅出现一个[6]副码。

例 5：某地传统型彩票中奖号码正常顺序的总系统：

己未初十(18)	1	6	3	8	4	9—3	火	[1+9][4+6][3,8]—3	(注：其他资料省略)
丙寅十七(25)	0	1	2	7	3	8—5	火	[2+8] [⊗] [3+7][0,1]—5	
癸酉廿四(1)	8	0	7	3	9	8—7	金	[8+8] ^② [3+7][0,9]—7	
庚辰初二(8)	7	7	5	9	1	0—2	金	[7+7] ^① [5+0][1+9]—2	
丁亥初九(15)	8	0	7	3	3	0—1	土	[0+0] ^② [7+3+3][8]—1	
甲午十六(22)	6	5	0	7	7	6—8	金	[5+0] ^② [7+7][6+6]—8	
辛丑廿三(29)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(7)	土	(未开奖，需预测)	

.....

——上述辛丑廿三(29)在应用系统——主题预测法时，甲午——辛丑期次时出现二个变化的明显临界点(第一个：连续出现 5 次[3·7]主题；第二个：连续出现主题间相同的记录符号“②—②”已达 2 次)，所以，甲午——辛丑之间所出现的记录符号就不会再是“②”或“③”了，同时，辛丑廿三(29)肯定不会有[3·7]主题的出现；因为：甲午[5·0][3·7][4·6]中的三个主题或者其中任意两个主题配搭不会出现在下一期的辛丑廿三(29)的总体结构内包括⊗[5·0][3·7]，⊗[5·0][4·6]，⊗[3·7][4·6]，即是说：[5·0][4·6]的配搭对于辛丑廿三(29)而言也是不成立的。

[说明]

在正常顺序下的总系统，很少出现连续三次的主题相同记录符号为：②—②—②或②—②—③，尤其在传统型的彩票当中更少见。所以，上例中出现了一个“②—②”就可以认为是一个变化的较明显临界点。

第二节 标准参照系——主题平行对应预测法

标准参照系——主题平行对应预测法，就是指在正常顺序下的总系统中，以标准参照系的各个信息载体作为主题的对应载体，通过记录标准参照系中各个载体与开奖日的主题发生平行对应的次数，确认这种对应次数的变化临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

以前的篇章已介绍过，为了便于预测，为了充分发挥标准参照系的预测功能，我们规定：

[1·9]主题定性——→水 主题

[2·8]主题定性——→火 主题

[3·7]主题定性——→木 主题

[4·6]主题定性——→金 主题

[5·0]主题定性——→土 主题

所以，标准参照系的各个数字信息载体的五行属性就可以与上述五大主题五行属性互相挂钩对应；对应的结果就是把开奖日的中奖号码之主题结构能在各个数字信息载体上得到准确的反映。

标准参照系——主题平行对应预测法包括两大类

第 I 类：天干——主题平行对应预测法；地支——主题平行对应预测法；纳音——主题平行对应预测法；九宫星——主

题平行对应预测法。(注：开奖日相冲关系的天干、地支、纳音均不包含在内)。

第Ⅱ类：农历尾数——主题平行对应预测法，新历尾数——主题平行对应预测法。

上述第Ⅰ类是以开奖日的载体之五行属性与开奖日的主题的五行属性进行挂钩对应，只有两者是具有相同的五行属性才算是“对应”上了。

而第Ⅱ类是以开奖日载体或与号码的尾数直接与开奖日的主题进行数字对应(不是五行属性对应)，只有载体的尾数与该主题的数字是一致的才算是“对应”上了。

一、第Ⅰ类的预测原则与方法

(一)适用的系统：第Ⅰ、Ⅱ类均只适用正常顺序下的总系统；

(二)检索和找出：识别开奖日标准参照系与开奖的主题进行平行对应时产生变化的明显临界点的“最高记录”和“次最高记录”的标准：

1. 天干——主题平行对应预测法；3—4次(偶然间会出现5次)；

2. 地支——主题平行对应预测法：3—4次(偶然间会出现5次)；

3. 九宫星——主题平行对应预测法：3—4次。

(注：对于偶然间者，可放弃，作失误计。因为其出现的机会极少)。

(三)搜索、判断和确认需要预测的期次与标准参照系载体进行平行对应时的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；也可以通过记录不同载体与开奖日的主题产生对应时的符号间的对比从而找出记录符号间异同的明显临界点。原则是：明显

者用之，不明显者弃之；具体问题具体分析。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作相应的排除或肯定。原则：必须保证预测结果是准确的。

(五)同一预测内容、预测结果，最后须综合各项的初步预测结果才能得出最终的结论。原则：“事应过三”验证法则。

下面我们就介绍天干、地支、纳音、九宫星与主题挂钩对应的方法：

$\left\{ \begin{array}{l} \text{属木的天干} = \text{甲、乙} \\ \text{属木的地支} = \text{寅、卯} \\ \text{属木的九宫星} = \text{三碧、四绿} \\ \text{属木的纳音} = \text{木} \end{array} \right\}$	$\xRightarrow{\text{对应}}$	[3·7]木主题
---	---------------------------	----------

$\left\{ \begin{array}{l} \text{属火的天干} = \text{丙、丁} \\ \text{属火的地支} = \text{午、巳} \\ \text{属火的九宫星} = \text{九紫} \\ \text{属火的纳音} = \text{火} \end{array} \right\}$	$\xRightarrow{\text{对应}}$	[2·8]火主题
--	---------------------------	----------

$\left\{ \begin{array}{l} \text{属水的天干} = \text{壬、癸} \\ \text{属水的地支} = \text{子、亥} \\ \text{属水的九宫星} = \text{一白} \\ \text{属水的纳音} = \text{水} \end{array} \right\}$	$\xRightarrow{\text{对应}}$	[1·9]水主题
--	---------------------------	----------

$\left\{ \begin{array}{l} \text{属金的天干} = \text{庚、辛} \\ \text{属金的地支} = \text{申、酉} \\ \text{属金的九宫星} = \text{六白、七赤} \\ \text{属金的纳音} = \text{金} \end{array} \right\}$	$\xRightarrow{\text{对应}}$	[4·6]金主题
---	---------------------------	----------

$\left\{ \begin{array}{l} \text{属土的天干} = \text{戊、己} \\ \text{属土的地支} = \text{辰、戌、丑、未} \\ \text{属土的九宫星} = \text{二黑、五黄、八白} \\ \text{属土的纳音} = \text{土} \end{array} \right\}$	$\xRightarrow{\text{对应}}$	[5·0]土主题
--	---------------------------	----------

[说明]

为了便于预测应用，凡是标准参照系上的载体与开奖日的主题发生对应者，则记作“*”，没有对应者则记作“⊗”。

进行主题对应者，必先要对中奖号码进行主题结构缩写，这样才能便于操作。

绝大多数的彩票的特别号码是不列入主题结构缩写部分，特别号码是特别处理的，这全由其游戏规则所决定：36选7中7个号码则“全中”，特别号码只是对于“全中”以外的奖项起作用。

而广东南粤风采的主题结构缩写则把特别号码列入，因为其游戏规则规定：36选7中(6+1)个号码则“全中”，而且位置不限，其中“6”个为基本号码，“1”个则是特别号码。

例1：某地7/36某所段中奖号码正常顺序下的总系统：

……(图转下页)

——上述丁未廿一(13)进行纳音——主题平行对应时可知，纳音水——(未知的)主题之前出现一个变化的明显临界点(连续出现纳音——主题间有对应的记录符号“*”已达5次!)，所以水——(未知的主题)之间就不会再出现记录符号“*”了，即纳音水 $\xrightarrow{\text{对应}}$ [1·9]主题就不会出现，从而需要预测的丁未廿一的总体结构内就不会有[1·9]主题出现了。

——从上述的载体与主题对应的记录符号可知：地支——主题以及九宫星——主题之间进行平行对应时，当连续出现四个记录符号“*”时就产生一个变化的明显临界点，即相应的第五次就会产生新的记录符号“⊗”。

[重要说明]

1. 当开奖日的纳音和九宫星均与当日的开奖号码产生主题

(例 1 图)

标准参照系的各
个载体与开奖日的主
题进行平行对应的记
录符号：

	结构缩写	九宫星	天干	地支	纳音	九宫星
丁酉 _{初十(5)}	2 3 10 18 19 22 30-25 火 [2+2+8][0+0][3,9]	四绿	*	⊗	*	⊗
甲辰 _{十七(12)}	8 10 13 19 20 21 36-12 火 [1+9][0+0][8,3,6]	六白	⊗	*	⊗	⊗
辛亥 _{廿四(19)}	1 16 17 18 19 22 27-11 金 [1+9][2+8][7+7][6]	八白	⊗	*	⊗	⊗
戊午 _{初一(26)}	1 10 15 21 24 30 35-12 火 [5+5+0+0][1+1][4]	一白	*	⊗	⊗	*
乙丑 _{初八(2)}	5 13 23 27 28 30 35-19 金 [5+5+0][3+3+7][8]	三碧	*	*	⊗	*
壬申 _{十五(9)}	3 17 23 26 30 35 36-28 金 [3+3+7][6+6][5+0]	五黄	⊗	*	*	*
己卯 _{廿二(16)}	6 14 17 24 25 30 33-10 土 [3+7][4+4+6][5+0]	七赤	*	*	*	*
丙戌 _{廿九(23)}	1 4 5 10 26 30 34-8 土 [5+0+0][4+4+6][1]	九紫	⊗	*	*	⊗
癸巳 _{初七(30)}	1 4 6 11 13 14 27-19 水 [1+1][4+4+6][3+7]	二黑	*	⊗	*	⊗
庚子 _{十四(6)}	5 7 10 12 25 32 36-29 土 [5+5+0][2+2][7,6]	四绿	⊗	⊗	*	⊗
丁未 _{廿一(13)}	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)-(8) 水 (未开奖, 需预测)	六白	?	?	?	?

对应时，若连续二期两者均是如此同时有主题对应，则第三期的纳音和九宫星不会再同时与主题发生对应，即是说，第三期的纳音所对应的主题 A 以及九宫星所对应的主题 B，主题 A 和 B 不能同时配搭出现在第三期内的总体结构中。

2. 同样，当开奖日的天干与地支的五行属性均是不同时，则不会连续二期的天干与地支均与当日的主题产生对应，即是说，当上一期的天干、地支均与当日的主题有对应时，则下一期的天干、地支不会再同时与当日的主题产生对应。

上述这两种情形也是识别变化的明显临界点的手段，可以根据记录符号间的异同次数去相应作出灵活的预测。总之，具体问题具体分析。

3. 由于开奖日的天干、地支、纳音、九宫星与当日的开奖号码连续不发生主题对应的次数各有阶段性的趋势，利用连续不发生主题对应的次数去作为预测的手段，则应“见机行事”。比如有时可以连续不发生主题对应达 6 次！当其表现出一个变化的明显临界点时也可以相应作出预测。

4. 不同游戏规则下的每只彩票的标准参照系各个载体与当日的开奖号码的总体结构有无主题对应的趋势，只要建立齐全的、完善的、期数足够的“载体——主题平行对应”记录一览表，再观察、分析表中的特点，就基本上可得出相关的总体结论。

例 2: 某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

——上述甲戌廿九(27)进行天干——主题平行对应时，天

										主题对应的记录符号			
结构缩写(特别号码另计)										天干	地支	纳音	
癸卯 _{廿七(28)}	6	2	8	7	3	1	—	1	金	[2+8][3+7][6,1]	⊗	*	⊗
庚戌 _{初五(4)}	4	1	7	7	6	7	—	2	金	[4+6][7+7+7][1]	*	⊗	*
丁巳 _{十二(11)}	9	8	8	5	0	0	—	7	土	[8+8][5+0+0][9]	*	*	*
甲子 _{十九(18)}	7	3	3	4	8	1	—	5	金	[7+3+3][4,8,1]	*	⊗	⊗
辛未 _{廿六(25)}	5	2	6	4	1	0	—	4	土	[4+6][5+0][1,2]	*	*	*
戊寅 _{初三(2)}	3	5	7	2	8	5	—	8	土	[3+7][2+8][5+5]	*	*	*
乙酉 _{初十(9)}	5	5	9	9	9	6	—	1	水	[5+5][9+9+9][6]	⊗	⊗	*
壬辰 _{十七(16)}	4	6	4	1	3	4	—	5	水	[4+4+4+6][1,3]	⊗	⊗	⊗
己亥 _{廿四(23)}	5	4	3	2	0	2	—	6	木	[5+0][2+2][3,4]	*	⊗	⊗
丙午 _{初一(30)}	4	1	1	6	4	5	—	9	水	[1+1][4+4+6][5]	⊗	⊗	*
癸丑 _{初八(6)}	2	9	8	5	9	7	—	4	木	[9+9+][2+8][5,7]	*	⊗	⊗
庚申 _{十五(13)}	4	6	1	4	9	6	—	7	木	[4+4+6+6][1+9]	*	*	⊗
丁卯 _{廿二(20)}	8	4	1	3	7	2	—	6	火	[8+2][3+7][4,1]	*	*	*
甲戌 _{廿九(27)}	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	—	(7)	火(未开奖,需预测)	?	?	?	

干甲——(未知的)主题之前出现一个变化的较明显临界点(连续出现记录符号“*”已达3次),为什么连续3次“*”就认为是一个临界点?经过对这只彩票的“载体——主题平行对应”一览表观察、分析可知,当某种主题对应的记录符号出现一次

“最高记录”后，同一周期内紧随着的趋势肯定不会再出现“次最高记录”；在此之前已经出现了一个极少出现的连续5次“*”，现在紧接着又出现一轮连续的3个“*”，所以，据此就可以判断出：这一轮的记录符号不会连续出现4个“*”！从而天干甲^{对应}→[3·7]木主题就不会出现在甲戌廿九(27)的总体结构内。这种分析，也是具体问题具体分析的一例。

——另外，从上例的符号记录一览表中可知，天干、地支同时与开奖日的主题产生两期连续对应(见虚线框)，[其中庚申十五(13)期次的天干“庚”和地支“申”的五行属性是一致的]，所以需要预测的甲戌廿九(27)中天干“甲”和地支“戌”所对应的主题肯定不会同时配搭出现，即甲^{对应}→[3·7]木主题，戌^{对应}→[5·0]土主题，[3·7]和[5·0]主题不会同时在甲戌廿九(27)的总体结构内出现。

二、第Ⅱ类预测的原则与方法

(一)适用的系统：只适用正常顺序下的总系统。

(二)检索和找出：识别开奖日的农历尾数、新历尾数、位置号码尾数与开奖日的主题进行平行对应时产生变化的明显临界点“最高记录”和“次最高记录”的标准：

1. 农历尾数——主题平行对应预测法：3—4次(极少出现四次)；

2. 新历尾数——主题平行对应预测法：3—4次(极少出现四次)。

(三)搜索、判断和确认需要预测的期次与新历尾数、农历尾数进行平行对应时的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；也可以通过记录尾数与开奖日的主题产生对应时的符号间的对比，从而找出这种变化状态的明显临界点。原则是：明显者用之，不明显者弃之，具体问题具体分析。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定。原则是：必须保证预测结果是准确的。

下面我们就介绍农历尾数、新历尾数以及位置号码尾数与主题挂钩对应的方法：

●凡是农历、新历、号码的尾数是“1”或“9”者均对应[1·9]主题；

●凡是农历、新历、号码的尾数是“2”或“8”者均对应[2·8]主题；

●凡是农历、新历、号码的尾数是“3”或“7”者均对应[3·7]主题；

●凡是农历、新历、号码的尾数是“4”或“6”者均对应[4·6]主题；

●凡是农历、新历、号码的尾数是“5”或“0”者均对应[5·0]主题；

为了便于预测应用，凡是农历/新历/号码的尾数与当日的开奖号码尾数是一致的，记作“正”，不一致者但能配搭构成主题者记作“反”，不一致者又不能配搭组成主题者，则记作“⊗”；当日的开奖号码有多少个尾数与农历/新历/(上一期)号码的尾数是一致的，则就相应记作多少个“正”；同理，则就相应记作多少个“反”；而没有相应主题尾数对应者则一律只记作一个“⊗”。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

农历—— 主题对应	新历—— 主题对应
正月初一 春节	1月1日 元旦
正月十五 元宵节	2月4日 立春
二月初二 龙抬头	3月20日 春分
三月初三 上巳节	4月5日 清明节
三月二十八 张天师诞辰	4月20日 谷雨
四月初八 浴佛节	5月6日 立夏
五月初五 端午节	6月21日 夏至
五月初九 哪吒诞辰	7月7日 七夕
六月初六 端午节	8月7日 立秋
七月初七 七夕	9月22日 秋分
七月初九 哪吒诞辰	10月23日 立冬
八月十五 中秋节	11月22日 小雪
九月初九 重阳节	12月22日 冬至
十月初一 寒衣节	1月5日 小寒
十一月初一 冬至	1月20日 大寒
十二月初一 小寒	2月4日 立春

庚午^{初十}(11) 10 17 19 24 27 33 35—27 [7+7+3][5+0][9,4] 正+反 反
 丁丑^{十七}(18) 3 7 9 12 23 24 36—15 [3+3+7][4+6][9,2] 正+反+反 反
 甲申^{廿四}(25) 3 5 12 14 24 28 31—8 [4+4][2+8][5,3,1] 正+正 正
 辛卯^{初二}(1) 10 18 25 26 32 33 36—2 [6+6][2+8][5+0][3] 正+反 ⊗
 戊戌^{初九}(8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) (未开奖, 需预测) ? ?
 ⊗

——上述需要预测的农历初九(尾数)与(未知的)主题进行平行对应时,之前出现一个变化的明显临界点(连续出现四次农历尾数——主题对应),所以,“初九”与未知的开奖号码的总体结构肯定不会再有任何的主题对应,即“初九” \longrightarrow [1·9]主题,从而戊戌初九(8)的总体结构中不会有(完整的)[1·9]主题出现。

例 2: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

• • • • •

农历——新历——
主题对应 主题对应

丁巳初二(24) 3 8 13 20 25 31 36—26 土 [3+3+][5+0][8,1,6]反 反

甲子初九(1) 1 8 11 15 17 20 24—10 金 [1+1][5+0][4,7,8] 反+反 正+正

辛未十六(8) 4 8 10 12 23 29 36—31 土 [2+8][4+6][9,0,3] 正+反 正+反

戊寅廿三(15) 8 12 16 17 20 25 27—7 土 [2+8][5+0][7+7][6]反+反 正+反

乙酉三十(22)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)火(未开奖,需预测) ? ?

——上述需要预测的乙酉三十(22)中的农历和新历之尾数与(未知的)主题进行平行对应时，之前出现一个变化的明显临界点(分别连续出现三次农历尾数——主题对应和新历尾数——主题对应)，所以，农历“三十”和新历(22)肯定不会再同时与

未知的开奖号码的总体结构产生主题对应,即“三十” $\xrightarrow{\text{对应}}$ $[5 \cdot 0]$ 主题;“22” $\xrightarrow{\text{对应}}$ $[2 \cdot 8]$ 主题,从而需要预测的乙酉三十(22)的总体结构中肯定不会有 $[2 \cdot 8]$ 主题与 $[5 \cdot 0]$ 主题同时配搭出现。

[重要说明]

1. 开奖日的农历与新历尾数若同时与当日的开奖号码的总体结构产生主题对应,当农历与新历的尾数不是互为构成主题“同一主题”尾数时,很少机会连续二期均同时与开奖日的总体号码产生主题对应。上例2中是十分特殊的实例。又因为甲子初九(1)中的新历“(1)”与农历“初九”是“同一主题”的尾数,所以农历、新历尾数与当日的开奖号码均同时产生主题对应,实质上仅是一种对应而已。所以,具体问题必须具体分析。

2. 无论是农历尾数——主题对应或是新历尾数——主题对应,在正常顺序下的总系统内,最高记录是可以连续十二次不产生(完整的)主题对应(当然是很少连续十二次者),能否利用这些去作为预测的手段,则应“见机行事”。这也是识别新历/农历尾数与开奖日的总体结构有无产生主题对应的一个变化之临界点。

3. 在总系统内,若记录符号“ \otimes ”连续出现2—3次(极少三次)则可以认为这是一个变化的明显临界点。即不会再相应出现第三或第四次。

例3:某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

											农历—— 主题对应	新历—— 主题对应
丁未	廿一(13)	6	16	22	23	31	33	34	—	26	水 [6+6+4][3+3][1,2]	正 正 + 正
甲寅	廿八(20)	14	22	24	27	29	34	35	—	8	水 [4+4+4][2,7,9,5]	反 反
辛酉	初五(27)	10	18	19	22	23	26	32	—	30	木 [8+2+2][9,3,0,6]	反 反
戊辰	十二(6)	1	2	5	7	17	19	23	—	30	木 [7+7+3][1+9][2,5]	正 ⊗
乙亥	十九(13)	11	14	15	22	28	34	36	—	3	火 [2+8][4+4+6][1,5]	反 ⊗
壬午	廿六(20)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	—	(8)	木 (未开奖, 需预测)?	?

——上述需要预测的壬午廿六(20)之前出现连续两个记录新历与主题平行对应的符号“⊗”，可以认为这是一个变化的明显临界点(无论是农历/新历——主题对应，只要连续出现二轮“⊗”，则几乎就可以认为这是一个临界点)，即第三次的记录符号不会再是“⊗”，从而壬午廿六(20)中的新历所对应的[5·0]主题或副码[5]或[0]就至少有一出现在壬午廿六(20)期次的开奖号码中。

[重要说明]

在正常顺序下的载体——主题平行对应记录符号一览表当中，我们可以利用符号间的特点来作出相应的预测。

比如：

●正常顺序下当连续记录符号为 $\begin{cases} \text{正} + \text{反} \\ \text{正} + \text{反} \end{cases}$ 时，则第三期的记录符号肯定不会是“正 + 反”；

●在等距离排列对比时，当记录符号为 $\begin{cases} \text{正} + \text{正} \\ \text{正} + \text{正} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \text{反} + \text{反} \\ \text{反} + \text{反} \end{cases}$ ，或 $\begin{cases} \text{正} + \text{正} + \text{反} \\ \text{正} + \text{正} + \text{反} \\ \text{正} + \text{正} + \text{反} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \text{正} + \text{反} + \text{反} \\ \text{正} + \text{反} + \text{反} \\ \text{正} + \text{反} + \text{反} \end{cases}$ 时，则相应的等距下一期一定不会再重复出现第三次同样之记录符号。

●在等距离排列对比时，当记录符号为 $\begin{cases} \text{正} + \text{反} \\ \text{正} + \text{反} \\ \text{正} + \text{反} \end{cases}$ 或者 $\begin{cases} \text{正} + \text{正} + \text{正} \\ \text{正} + \text{正} + \text{正} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \text{反} + \text{反} + \text{反} \\ \text{反} + \text{反} + \text{反} \end{cases}$ 时，则相应的、等距的下一期一定不会再重复出现第四次同样的记录符号。

第三节 位置号码——主题斜线对应预测法

位置号码——主题斜线对应预测法，就是指在正常顺序下的总系统中，以上一期的各个位置号码作为下一期开奖号码的主题之对应载体，通过记录位置号码与主题在斜线对应过程中所产生的符号变化轨迹，确定其变化的明显临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

为了便于掌握有关斜线对应后的趋势和便于使用，可建立位置号码——主题斜线对应符号记录一览表。

原则与方法：

(一)选定适用的系统：正常顺序下的总系统；

(二)检索和找出：

识别开奖日上一期的位置号码与下一期的主题进行斜线对应时产生变化的明显临界点“最高记录”的标准：

●上一期同一位置号码与下一期的总体结构不产生主题对应的连续次数为：9次；

●上一期同一位置号码与下一期的总体结构产生主题对应的连续次数为：8次；

●在正常顺序下，当记录符号连续3次出现“⊗”时；

●对同一位置的记录符号进行等距排列对比：当主题缩写记录符号三次完全一致时；当单个记录符号(指“正”或“反”或“⊗”)出现四次完全一致时。

●对同一位置的记录符号进行(1—12位的)等距离环环排列对比：当连续三次均各自产生相同的符号对应时。

即：

$$\begin{Bmatrix} A \\ B \end{Bmatrix}, A=B \quad \begin{Bmatrix} C \\ D \end{Bmatrix}, C=D \quad \begin{Bmatrix} E \\ F \end{Bmatrix}, E=F \quad \begin{Bmatrix} G \\ H \end{Bmatrix}, G \neq H$$

——则第四次的等距离环环排列对比项就不会再“相等”。

(三)搜索、判断和确认需要预测的期次与上一期位置号码进行斜线对应时的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；当然也可以通过记录符号间的互相对比(上与下，左与右，左斜与右斜等)而找出符号间的异同之临界点。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定。原则是：必须保证预测结果是准确的。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

…… (图转下页)

——从上述的记录一览表运用直观法观察可知，这阶段的最小号码位置〈1〉与最大号码位置〈7〉平均 3—4 轮就至少会产生一次主题对应。其它各个位置的主题对应各具有相应的周期性的特点。

——从上述的斜线记录表可知，甲辰十七(12)的位置(2)之前出现一个变化明显的临界点；连续出现主题对应的记录符号达 8 次。所以，未知的位置(2)的主题记录符号就不会与上期的号码“3”尾数再产生主题对应，即“3” $\xrightarrow{\text{对应}}$ [3·7]主题，从而需要预测的甲辰十七(12)的总体结构中就不会出现[3·7]主题。

——上述未知的位置(2)的记录符号之前还出现一个变化的明显临界点：连续三轮出现的主题对应的记录符号全部均是由三个符号以上组成，所以相应的第四轮所对应的记录符号不会与上期的号码“3”尾数再产生三个号码或以上组成的主题对应，即“3” $\xrightarrow[\text{⊗}]{\text{对应}}$ [3·7]主题，从而需要预测的甲辰期次的总体结构中就不会出现由三个号码或以上构成的[3·7]主题了！

(例 1 图)

己未初一(29)	1	5	17	20	22	31	36—19	火	[1+1][5+0][7,2,6]	-----
丙寅初八(5)	15	18	20	25	27	34	36—7	火	[5+5+0][4+6][7,8]	-----
癸酉十五(12)	6	9	11	15	23	31	36—25	金	[1+1+9][6+6][7,8]	-----
庚辰廿二(19)	6	17	18	20	26	29	31—25	金	[1+9][6+6][7,8,0]	-----
丁亥廿九(26)	1	6	7	11	17	18	35—33	土	[1+1][7+7][6,8,5]	-----
甲午初六(3)	3	6	7	17	23	24	36—22	金	[3+3+7+7][4+6+6]	---
辛丑十三(10)	12	17	18	22	26	30	33—1	土	[3+7][2+2+8][0,6]	----
戊申二十(17)	1	3	17	18	28	30	31—36	土	[3+7][8+8][1+1][0]	----
乙卯廿七(24)	11	14	17	21	22	31	33—35	水	[1+1+1][3+7][4,2]	---
壬戌初五(31)	3	14	25	28	30	32	34—26	水	[2+8][5+0][4+4][3]	---
己巳十二(7)	3	4	5	6	7	10	23—33	木	[3+3+7][4+6][5+0]	---
丙子十九(14)	1	3	14	19	24	28	30—20	水	[1+9][4+4][3,8,0]	-----
癸未廿六(21)	5	8	13	16	17	25	33—18	木	[3+3+7][5+5][6,8]	----
庚寅初三(28)	8	12	17	18	22	30	32—28	木	[2+2+2+8+8][7,0]	----
丁酉初十(5)	2	3	10	18	19	22	30—25	火	[2+2+8][0+0][3,9]	----
甲辰十七(12)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	? (7)—(8)	火	(未开奖, 需预测)	-----


上期各个位置号码——下一期开奖号码主题对应记录表：

-----	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-----	⊗	正+正+反	正	正+反+反	反	⊗	正+反	⊗
-----	正	⊗	反	正	反	反+反	正+正	反
-----	正+正	正+反	正+反	反	反	正+反	正+正	反
-----	正	正+正	正	反	正	反+反	正+正	正
-----	⊗	正+正+反	正+正+反+反	⊗	正+正+反+反	⊗	⊗	正+正+反+反
-----	正+反	正	正+反	正+反	正+反	反	正	正+正+反
-----	反+反	正+反	正+正	反+反	⊗	正	正+反	正+正
-----	正+正+正	正+反	正+反	反	反	⊗	正+正+正	反
-----	⊗	正+正	反	反	⊗	⊗	正	正+反
-----	正+正+反	正+反	正+反	⊗	正+反	⊗	正+反	正+反
-----	正	正+正	反	反+反	反	正	正	正
-----	⊗	正+正+反	反	⊗	反	正	反+反	反+反
-----	反	正+正+反+反+反	反	⊗	正	反	反	正+正+反+反+反
-----	正+反+反	正+正+反	反	正+反+反	正+正+反	正+正	正+正+反	正+反+反
-----	?	?	?	?	?	?	?	?

——从上述的第六个位置号码的记录一览表可知，它曾经出现过连续 9 轮均没有产生(完整的)主题对应，相应的第 10 轮才产生一次主题对应：“正 + 正”。

——上述未知的位置(3)的记录符号之前出现一个变化的明显临界点：连续出现单个符号“反”达 4 次，所以，相应的第 5 轮的记录符号肯定不会再出现“反”，即：上一期的位置号码“10”尾数 $\xrightarrow{\text{对应}} \text{反} = [5]$ ，从而需要预测的甲辰十七(12)的总体结构中就不会仅出现一个尾数为[5]的副码，换句话说，甲辰十七(12)的总体结构中要么出现[5·0]主题，要么出现尾数为[0]的一个副码，要么[5·0]主题成为虚主题。

——上述第五个位置的记录符号(垂直方向)中，其记录符号顺序为：



——对上述(1—12 位)的记录符号进行等距离环环排列对比：(如上图箭头所示)第九位(相隔 8 位)的单个符号“反”开始起连续三轮均出现相同的符号对应：反—反—正←—→反—反—正，这也是一个变化的明显临界点，即相应的下一次两者间的符号就不会再相同对应。

例 2:某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

										位置(3)—— 主题记录
										结构缩写
丙子 _{十二} (21)	2	9	9	8	8	6—0	水	[9+9][2+8+8][6]		
癸未 _{十九} (28)	4	5	7	1	5	0—9	木	[5+5+0][4,7,1]	反	
庚寅 _{廿六} (5)	5	2	5	4	4	5—3	木	[5+5+5][4+4][2]	⊗	
丁酉 _{初四} (12)	7	6	1	1	7	8—0	火	[1+1][7+7][6,8]	⊗	
甲辰 _{十一} (19)	5	6	8	7	5	7—1	火	[5+5][7+7][6,8]	⊗	
辛亥 _{十八} (26)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)—(8)	金 (未开奖, 需预测)		?	

(其他资料略)

上述未知的位置(3)的记录符号之前出现一个变化的明显临界点：连续三次出现的主题对应的记录符号是“⊗”(注意：特别号码是独立考虑，不在主题对应之列)，所以，未知的位置(2)的主题对应记录符号不会再是“⊗”，即是上一期的第 3 个位置号码“8”所对应的[2·8]主题符号或单个符号[2]或[8]至少有其一成为未知的位置(3)的记录符号。换句话说，需要预测的辛亥十八(26)的总体结构中至少会有[2]或[8]的号码了。

[重要说明]

为了充分发挥记录符号间的预测作用，可以采用同符号母——子轨迹对应来进行对比预测：以同一位置的上轮记录符

号作为同母，需要预测的记录符号作为未知“子”，在同一位置上往上寻找连续的若干次的同名母——子轨迹对应：当已知“子”轨迹是一致的且达3次时(即“子”记录符号是一样的)则其相应的第四次同母——子轨迹对应中的“子”轨迹就不会再相同，即通过已知“子”去预测未知“子”。

例如：某位置号码——主题对应记录一览表中找到如下同一子轨迹对应：

同母	子		同母	子		同母	子
[正 + 反]	→正		正	→⊗		反	→[正 + 反]
[正 + 反]	→正		正	→⊗		反	→[正 + 反]
[正 + 反]	→正	或	正	→⊗	或	反	→[正 + 反]
[正 + 反]	$\xrightarrow{?}\text{正}$ ⊗		正	$\xrightarrow{?}\text{⊗}$ ⊗		反	$\xrightarrow{?}\text{[正 + 反]}$ ⊗
(不会产生)			(不会产生)			(不会产生)	

第四节 副码——主题对应预测法

副码——主题对应预测法，就是指在正常顺序下的总系统中，以上一期的中奖号码的总体结构中的副码作为下一期开奖号码主题的对应载体，通过记录上一期副码与下一期主题发生对应的次数，确定这种对应的明显临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

应用副码——主题对应预测法的前提必须是对每一期次的中奖号码进行结构缩写，依据其所显示出的副码才能与下一期的开奖号码总体结构进行相关的主题对应。

副码——主题对应预测法又可分为三种：

一、副码——主题连续对应预测法：当上一期的一个或二

个副码尾数能与下一期中奖号码产生主题对应时，若这种对应连续达 7 次时，则可以认为产生一个变化的明显临界点，即连续相应的第 8 次的副码——主题对应就不会再出现。

注意：副码必须是连续的，若其间碰上全主题者而没有副码，则这连续性就被中断，这就不能再视作“连续”了。

二、副码——主题间隔连续对应预测法：当上一期的副码能与下一期中奖号码产生主题对应时，若其中间期次碰上全主题者（即无副码），但全主题者期次过后紧接着又能出现副码——主题对应时，如此这种情形达到 7 次副码——主题对应时，可以认为出现一个变化的明显临界点，即相应的第 8 次之副码——主题对应就不会再产生。

三、同副码母——子主题轨迹对应预测法：以需要预测的上一期的副码作为同母，需要预测的期次的总体结构作为未知“子”，如此往上寻找连续的若干次的同母——子轨迹对应：当已知“子”（指总体主题）是一致且达 4 次时，则相应的第 5 次同母——子轨迹对应中的“子”轨迹就不会再是与“同母”对应的主题了。若同母——已知子轨迹对应过程中，已知“子”的缩写符号完全相同且达 3 次时，则相应的第 4 次之“子”缩写符号肯定就不会再一致。

[重要说明]

上述三种副码——主题连续对应预测法，在确认是否产生一个变化的明显临界点时是均依据该同类的“最高记录”的标准，以确保相应的预测结论是准确的。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

戊寅_{廿三(15)} 8 12 16 17 20 25 27—7 土 [2+8][5+0][7+7][6]
 乙酉_{三十(33)} 10 15 18 19 21 26 35—2 水 [0+5+5][1+9][6,8]
 壬辰_{初七(29)} 7 8 9 16 18 26 34—28 水 [4+6+6][8+8][7,9]
 己亥_{十四(5)} 1 11 12 23 26 28 31—2 木 [1+1+1][2+8][6,3]
 丙午_{廿一(12)} 4 12 17 20 22 24 34—13 水 [4+4+4][2+2][0,7]
 癸丑_{廿八(19)} 3 6 8 20 27 28 35—33 木 [8+8][5+0][3,6,7]
 庚申_{初六(26)} 4 9 10 29 33 34 35—3 木 [4+4][9+9][5+0][3]
 丁卯_{十三(3)} 3 5 27 28 30 31 36—34 火 [3+7][5+0][8,1,6]
 甲戌_{廿十(10)} 1 5 6 13 19 21 23—20 火 [1+1+9][3+3][5,6]
 辛巳_{廿七(17)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 金 (未开奖, 需预测)

如上图箭头所示的斜线对应, 应用副码——主题连续对应预测法可知, 需要预测的辛巳廿七(17)与上期的副码[5]和[6]进行主题对应之前出现一个变化的明显临界点: 连续出现副码——主题对应已达7次, 所以, 副码[5]和[6]就不会与未知的辛巳廿七(17)的总体结构再产生主题对应, 即需要预测的辛巳廿七(17)的总体结构中不会再有[5·0]主题或[4·6]主题。

例2: 某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....
 壬午_{十九(25)} 3 7 8 18 24 25 29—1 木 [8+8][3+7][4,5,9]
 己丑_{廿六(1)} 1 2 4 14 15 17 23—34 火 [3+7][4+4][1,2,5]
 丙申_{初四(8)} 4 10 17 22 25 28 34—9 火 [2+8][5+0][4+4][7]
 癸卯_{十一(15)} 3 4 12 14 23 30 36—11 金 [3+3][4+4+6][0,2]
 庚戌_{十八(22)} 7 20 22 23 28 30 33—17 金 [0+0][3+3+7][2+8]
 丁巳_{廿五(29)} (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 土 (未开奖, 需预测)

——如上图箭头所示的斜线对应，由于需要预测的丁巳廿五(29)的上一期是全主题，无副码，所以副码——主题对应的趋势被中断，只能待下一期有副码产生后才能再进行相应的主题对应了。

例 3：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统中可找到同副码[3]和[7]的同母——子轨迹对应为：

同副码母 下一期的子轨迹

[7]→[3+3]

[7]→[3]

[7]→[3+3+7]

[7]→[3+3+3]

[7]→[7+7+3]

[7]→[3+7]

[7]→[7]

[7]→[3]

[7]→[7+7]

[7]→[3]

[7]→[3]

.....

“子”轨迹是同一 [3·7] 主题
达 4 次,产生一个明显的临界点。

同副码母 下一期的子轨迹

[3]→[7+3]

[3]→⊗

[3]→⊗

完全相同虚主题“子”轨迹达 2 次。

[3]→[3]

[3]→[3]

[3]→[3]

[3]→⊗

完全相同的“子”轨迹达 3 次,产生一个变化的明显临界点。

$$\begin{array}{l} [3] \longrightarrow [3+3+7] \\ [3] \longrightarrow [3+3+7] \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} [3] \longrightarrow [3+3+7] \\ [3] \longrightarrow [3+3+7] \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{完全相同的“子”主题轨迹达 2 次,} \\ \text{产生一个变化的明显临界点。} \end{array}$$

$$[3] \longrightarrow [7+7]$$

$$\begin{array}{l} [3] \longrightarrow (\otimes) \\ [3] \longrightarrow (\otimes) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} [3] \longrightarrow (\otimes) \\ [3] \longrightarrow (\otimes) \end{array}} \right\}$$

$$[3] \longrightarrow [7]$$

$$[3] \longrightarrow ?$$

从上例的同母——子轨迹对应可知：同母——子轨迹对应中，“子”是相同一样的单个副码可以达到3次，但是“子”轨迹是主题形式时则其出现2次完全相同的“子”轨迹后就往往产生了一个变化的明显临界点。这也是具体问题具体分析的例子。

[重要说明]:

在应用同副码母——子轨迹对应过程中，若记录符号连续出现二次“⊗”时(即无任何主题或副码对应，该副码所对应的主题已成为下一期的虚主题!)，可以认为出现一个变化的明显临界点，即相应的第三次同副码母——子轨迹对应就不会再产生符号“⊗”，换句话说，上一期同副码母所对应的主题或相应的副码一定有一个出现在下一期的开奖号码之总体结构中。

第五节 同缩写主题母——子轨迹对应预测法

同缩写主题母——子轨迹对应预测法，就是指在正常顺序下的总系统中，依据每一期次的中奖号码的结构缩写，凡是主题缩写符号完全一致者，视作为同缩写主题。以需要预

测的期次的上一期所出现的缩写主题作为同母，自身的期次总体结构作为未知“子”，如此往上寻找同缩写主题母——子轨迹对应：

①当已知“子”的缩写符号是完全一致且达2次时，则相应第3次的“子”缩写符号就不会再相同一致了。

②当已知“子”的缩写符号是主题时，即与同母是同一总体主题，如果已知“子”连续4次均是主题时，则相应第5次的“子”不会再是主题，而只能是副码符号或无对应符号“⊗”。

③当已知“子”的记录符号是“⊗”且连续达2次时，则相应的第3次“子”轨迹对应的记录符号不会再出现符号“⊗”，即是说，上一期的同缩写主题母中至少有一个尾数号码出现在相应第三次的“子”之中。

例1：某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统中可找到同缩写主题母——子轨迹对应如下：

同缩写主题母 下一期的子轨迹

[2+8]——→2

[2+8]——→⊗

[2+8]——→8

[2+8]——→[8+8+8]

[2+8]——→[2+2]

[2+8]——→[8]

[2+8]——→[2]

[2+8]——→[2]

[2+8]——→[2+8]

[2+8]——→⊗

[2+8]——→⊗

[2+8]——→[?](未开奖,需预测)*

} 出现2次完全相同的“子”轨迹

} 出现2次完全相同的“子”轨迹

同缩写主题母	下一期的子轨迹
--------	---------

$[1+1] \longrightarrow [9]$	
$[1+1] \longrightarrow [1+1]$	
$[1+1] \longrightarrow \otimes$	}
$[1+1] \longrightarrow \otimes$	
$[1+1] \longrightarrow [1+1+1]$	
$[1+1] \longrightarrow \otimes$	}
$[1+1] \longrightarrow \otimes$	
$[1+1] \longrightarrow [9]$	}
$[1+1] \longrightarrow [9]$	
$[1+1] \xrightarrow{?} (\text{未开奖, 需预测}) *$	出现两次完全相同的“子”轨迹

——从上图所记录的同缩写主题 $[2+8]$ 母——子轨迹对应中，需要预测的 $*$ 之前出现一个变化的明显临界点：连续两次出现完全相同的“子”记录符号，所以相应第三次的“子”($*$)就一定不会是“ \otimes ”，即需要预测的 $*$ 至少会含有 $[2]$ 或 $[8]$ 之一。

——从上图所记录的同缩写主题 $[1+1]$ 母——子轨迹对应中，需要预测的 $*$ 之前出现一个变化的明显临界点：连续两次出现完全相同的“子”缩写符号，所以相应第三次的“子”($*$)就一定不会仅是一个 $[9]$ ，要么是 $[1 \cdot 9]$ 主题缩写或副码 $[1]$ 缩写，要么是无对应符号“ \otimes ”。

例 2：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统中可找到同缩写主题母——子轨迹对应如下：

.....

同缩写主题母 下一期的子轨迹

$$[2+2+8] \longrightarrow [2]$$

$$[2+2+8] \longrightarrow \otimes$$

$$\left. \begin{array}{l} [2+2+8] \longrightarrow [2+2] \\ [2+2+8] \longrightarrow [2+8] \\ [2+2+8] \longrightarrow [2+8] \\ [2+2+8] \longrightarrow [8+8] \end{array} \right\}$$

$$[2+2+8] \xrightarrow{?} (\text{未开奖, 需预测}) *$$

——从上图所记录的同缩写主题 $[2+2+8]$ 母——子轨迹对应中，需要预测的 $*$ 之前出现一个变化的明显临界点：连续4次出现主题，即母——子均是同一总体主题： $[2 \cdot 8]$ ，所以相应的第五次之“子”肯定不会是 $[2 \cdot 8]$ 主题的缩写，换句话说，需要预测期次的 $*$ 之总体结构不会有 $[2 \cdot 8]$ 主题。

[重要说明]

在主题预测的各个识别变化状态之明显临界点的过程中，除非该变化状态处于一个特殊的阶段，一定要尽量使用“最高记录”标准去识别相应变化的临界点以确保预测结论是准确的。这点情况与位置号码的预测推算过程既要重视“最高记录”标准，也要重视“次最高记录”标准有所区别。因为我们所作出的总体结构性的预测结论是对各个位置号码推算后的小范围进行总体“过滤”和“提纯”，所以一定要确保这些总体预测结论是准确的，以免由于总体结论的错误导致各个位置号码交叉组合后的小范围受到无辜的影响！

(主题)能排除多少或肯定多少，就算多少，宁缺勿滥，其前提是必须准确无误。

第六节 主题类型的预测推算原则与方法

以前的章节已介绍过主题类型的功能与分类。当某期次的总体结构的主题可能出现的小范围被预测推算出来后，其中的主题到底是由两个码所构成的还是由三个码组成的？或者是由两个主题配搭而成还是由三个主题配搭而成呢？或者有多少个副码呢？这就要依赖相应的主题类型的预测推算。当某一期次的主题类型被准确地预测出来后，则就可以解答出上述的问题了。

不同游戏规则下的彩票，每个地方的彩票，开奖号码的总体结构中的主题类型，在一个大满贯(60期)中无可避免地、事实地呈现出如下4种状况：

一、热主题类型：即不仅出现的次数最多，而且平均3—6期中会出现一次；

二、一般主题类型：即出现的次数介乎于热主题与冷主题类型之间，平均7—9期会出现一次；

三、冷主题类型：即出现的次数很少，平均10—12期才出现一次；

四、极冷主题类型：极少出现，平均25—30期左右才出现一次。

例如在36选7中，各种主题类型的冷热程度为：

一、热主题类型：

a. $\langle 2 \rangle + 1$ ——双主题；主题是由一个标准单主题和一个由三个号码构成的主题共同组成；出现这种主题类型者，则有两个副码，出现一个虚主题。如：

$[1+1][2+2+8][5,6] \otimes [3 \cdot 7]$ 。

b. $\langle 2 \rangle$ ——标准双主题；主题是由两个标准的单主题

共同组成；出现这种主题类型者，则有 3 个副码，没有虚主题，即出[齐]；

如：[2+8][4+6][9, 0, 3] [齐]。

二、一般主题类型：

a. $\langle 3 \rangle$ ——标准三主题：主题是由三个标准的单主题共同组成；出现这种主题类型者，则有 1 个副码，有 1 个虚主题；

例如：[6+6][7+7][5+0][1] \otimes [2·8]

b. $\langle 3 \rangle + 1$ ——三主题；主题是由 2 个标准的单主题组成和 1 个由三个号码组成的主题共同构成；出现这种主题类型者，则没有副码，故是全主题；共有 2 个虚主题；

例如：[3+3+7][5+5][8+2] \otimes [1·9] \otimes [4·6]。

c. $\langle 2 \rangle + 1 + 1$ ——双主题；主题是由两个的三个号码形成的主题共同构成；出现这种主题类型者，则有 1 个副码，共有 2 个虚主题；

例如：[4+4+6][1+1+1][8] \otimes [5·0] \otimes [3·7]

三、冷主题类型：

a. $\langle 1 \rangle + 1$ ——单主题；主题是由三个号码共同构成；出现这种主题类型者，则有 4 个副码，没有虚主题，即出[齐]；

例如：[6+6+4][5, 1, 8, 7] [齐]

b. $\langle 2 \rangle + 2$ ——双主题；主题是由一个的四个号码组成的主题和一个标准的单主题共同构成；出现这种主题类型者，则有 1 个副码，有 2 个虚主题；

例如：[3+7+7+7][1+1][8] \otimes [5·0] \otimes [4·6]。

四、极冷主题类型：

a. $\langle 1 \rangle + 2$ ——单主题；主题是由四个号码共同组成；出现这种主题类型者，有 3 个副码，有 1 个虚主题；

例如：[6+6+4+4][5, 3, 8] \otimes [1·9]

b. $\langle 1 \rangle + 3$ ——单主题；主题是由五个号码单独组成；出现这种主题类型者，有 2 个副码，有 2 个虚主题；

例如： $[2+2+2+8+8][7, 0] \otimes [4 \cdot 6] \otimes [1 \cdot 9]$ 。

c. $\langle 2 \rangle + 2 + 1$ ——双主题；主题是由一个的四个号码组成的主题和一个的三个号码组成的主题共同构成；没有副码，属全主题，有 3 个虚主题；

例如： $[3+3+7+7][4+6+6] \otimes [1 \cdot 9] \otimes [2 \cdot 8] \otimes [5 \cdot 0]$

又例如在传统型彩票(000000—999999)中，不同地方的彩票各种主题类型的冷热程度大同小异：

热主题类型有：

一、 $\langle 2 \rangle$ ——标准双主题；主题是由两个标准的单主题共同组成；出现这种主题类型者，有 2 个副码，有 1 个虚主题；

例如： $[3+3][1+9][5, 6] \otimes [2 \cdot 8]$

二、 $\langle 2 \rangle + 1$ ——双主题；主题是由一个标准的单主题和一个由三个号码构成的主题共同组成；出现这种主题类型者，则有 1 个副码，有 2 个虚主题；

例如： $[6+4+4][2+2][1] \otimes [3 \cdot 7] \otimes [5 \cdot 0]$

三、 $\langle 1 \rangle$ ——标准单主题；主题是由两个号码构成的标准主题单独组成；出现这种主题类型者，则有 4 个副码，没有虚主题；

例如： $[5+0][2, 7, 9, 6] [齐]$ 。

一般主题类型有：

一、 $\langle 1 \rangle + 1$ ——单主题；主题是由三个号码构成的主题单独组成。出现这种主题类型者，则有 3 个副码，有 1 个虚主题；

例如： $[2+2+8][7, 6, 0] \otimes [1 \cdot 9]$

二、 $\langle 3 \rangle$ ——标准 3 主题；主题是由三个标准的单主题共同

组成。出现这种主题类型者,则没有副码,有 2 个虚主题;

例如: $[1+9][8+8][4+6] \otimes [5 \cdot 0] \otimes [3 \cdot 7]$

冷主题类型有:

一、 $\langle 1 \rangle + 2$ ——单主题;主题是由四个号码构成的主题单独组成。出现这种主题类型者,有 2 个副码,有 2 个虚主题;

例如: $[4+4+6+6][1, 3] \otimes [2 \cdot 8] \otimes [5 \cdot 0]$

二、 $\langle 2 \rangle + 2$ ——双主题;主题是由一个的四个号码组成的主题和一个标准的单主题共同构成;出现这种主题类型者,有 3 个虚主题,没有副码,属全主题;

例如: $[1+1+9+9][5+0] \otimes [2 \cdot 8] \otimes [3 \cdot 7] \otimes [4 \cdot 6]$

极冷主题类型有:

一、 $\langle 2 \rangle + 1 + 1$ ——双主题;主题是由两个的三个号码构成的主题共同组成;出现这种主题类型者,没有副码,有 3 个虚主题;

例如: $[0+0+0][3+3+7] \otimes [1 \cdot 9] \otimes [2 \cdot 8] \otimes [4 \cdot 6]$

二、 $\langle 1 \rangle + 3$ ——单主题;主题是由五个的号码构成的主题单独组成;出现这种主题类型者,有 1 个副码,有 3 个虚数型;

例如: $[4+4+4+4+6][7] \otimes [1 \cdot 9] \otimes [2 \cdot 8] \otimes [5 \cdot 0]$ 。

正常情况下,只考虑热主题类型和一般主题类型这两种(两者合共有五类主题组合情况)也就基本上能满足实际需要。当然,若通过对位置号码预测推算后的小范围进行投注“包围”的话,则各种可能的主题类型就要考虑了。各只彩票因为“一方彩票养一方特点”,所以,关于其主题类型的具体冷热之分,只要把正常顺序下(60)期的开奖号码进行结构缩写,依据本书所介绍的多种可能性的主题配搭形式即主题类型进行分类统计,则其冷热程度就一目了然。热主题类型和一般主题类型则优先和重点考虑,冷主题类型可适当考

虑，极冷主题类型基本上可放弃考虑。当然，具体问题必须具体分析。

主题类型的预测推算其中之一的方法为：

系统——主题类型预测法；

原则与方法：

系统——主题类型预测法：指在总系统和各个分系统中，通过记录同一主题类型在系统中连续出现的次数，确定变化的明显临界点从而达到预测的目的。

(一)选定适用的系统：所有系统均适用。

(二)找出：

识别系统内同一主题类型连续出现的次数而产生变化的明显临界点的“最高记录”的标准。

①在正常顺序下的总系统中，同一主题类型连续出现的次数为：4次；

②在各个分系统中(除等距离排列系统、号码等距离环环相比系统外)，同一主题类型连续出现的次数为：3次；

③在等距离排列系统、号码等距离环环相比系统内，同一主题类型连续出现的次数为：4次。

(三)搜索、判断和确定主题类型变化的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；具体问题具体分析；明显者用之，不明显者则弃之。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定。

原则：必须保证预测结果是准确的，宁缺勿滥。

例1：某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

	结构缩写	相应的主题类型	相应的虚主题
辛酉初五(27)	[8 + 2 + 2][9, 3, 0, 6]	$\langle 1 \rangle + 1$	[齐]
戊辰十二(6)	[7 + 7 + 3][1 + 9][2, 5]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [4 \cdot 6]$
乙亥十九(13)	[2 + 8][4 + 6][1, 3, 5]	$\langle 2 \rangle$	[齐]
壬午廿六(20)	[5 + 5 + 5][1 + 9][6, 3]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [2 \cdot 8]$
己丑初三(27)	[5 + 5 + 0][1 + 1][6, 2]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [3 \cdot 7]$
丙申初七(3)	[2 + 2][7 + 7 + 3][6, 1]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [5 \cdot 0]$
癸卯十七(10)	[2 + 8][4 + 4 + 6][3, 5]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [1 \cdot 9]$
庚戌廿四(17)	[2 + 8][1 + 9][0, 6, 7]	$\langle 2 \rangle$	[齐]
丁巳初二(24)	[3 + 3][5 + 0][8, 1, 6]	$\langle 2 \rangle$	[齐]
甲子初九(1)	[1 + 1][5 + 0][4, 7, 8]	$\langle 2 \rangle$	[齐]
辛未十六(8)	[2 + 8][4 + 6][9, 0, 3]	$\langle 2 \rangle$	[齐]
戊寅廿三(15)	[2 + 8][5 + 0][7 + 7][6]	$\langle 3 \rangle$	$\otimes [1 \cdot 9]$
乙酉三十(22)	[5 + 5 + 0][1 + 9][6, 8]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [3 \cdot 7]$
壬辰初七(29)	[6 + 6 + 4][8 + 8][7, 9]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [5 \cdot 0]$
己亥十四(5)	[1 + 1 + 1][2 + 8][3, 6]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [5 \cdot 0]$
丙午廿一(12)	[4 + 4 + 4][2 + 2][7, 0]	$\langle 2 \rangle + 1$	$\otimes [1 \cdot 9]$
癸丑廿八(19)	(未开奖, 需预测)?	?	?

——上述癸丑廿八(19)的主题类型之前出现一个变化的明显临界点：连续四期的主题类型均是“ $\langle 2 \rangle + 1$ ”，所以，需要预测的癸丑廿八(19)的主题类型就肯定不会再是“ $\langle 2 \rangle + 1$ ”了。

——需要预测的癸丑廿八(19)第九位(即相隔 8 期)的等距离环环相比系统，其主题类型的对应过程为：

……(第九位的等距离环环相比)

{ 壬午廿六(20):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	达四次
{ 乙酉三十(22):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 己丑初三(27):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 壬辰初七(29):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 丙申初十(3):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 己亥十四(5):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 癸卯十七(10):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 丙午廿一(12):	$\langle 2 \rangle + 1$	(相同对应)	
{ 庚戌廿四(17):	$\langle 2 \rangle$	(不会相同对应)	
{ 癸丑廿八(19):	?(未开奖,需预测)		

——即 { 庚戌廿四(17): $\langle 2 \rangle$
 { 癸丑廿八(19): ? 之前出现一个变化的明显临界点：连续出现 4 次“相同对应”，所以相应的第五次的环环相比就肯定不会再相同对应，即 { 庚戌廿四(17): $\langle 2 \rangle$
 { 癸丑廿八(19): ? $\updownarrow \otimes$ ，从而，癸丑廿八(19)的主题类型就可以排除了“ $\langle 2 \rangle$ ”。

例 2:某地 7/36 某阶段中奖号码的同名纳音[木]系统：

……

辛酉廿八(4)	[6 + 6][2 + 8][3 + 7][9]	$\langle 3 \rangle$
戊辰初五(11)	[3 + 3][1 + 1 + 9][2, 6]	$\langle 2 \rangle + 1$
壬午十九(25)	[3 + 7][8 + 8][4, 5, 9]	$\langle 2 \rangle$
己亥初七(11)	[1 + 1 + 9][2 + 2][3 + 7]	$\langle 3 \rangle + 1$

癸丑廿一(25)	[3 + 7 + 7][2 + 8][6, 1]	$\langle 3 \rangle + 1$	
庚申廿八(2)	[4 + 6][0 + 0][3, 8, 9]	$\langle 2 \rangle$	
辛卯初二(1)	[6 + 6][2 + 8][5 + 0][3]	$\langle 3 \rangle$	
戊戌初九(1)	[6 + 6][2 + 8][0 + 5][3]	$\langle 3 \rangle$	
壬子廿三(22)	[3 + 7 + 7 + 7][1 + 1][8]	$\langle 2 \rangle + 2$	
己巳十二(7)	[3 + 3 + 7][4 + 6][5 + 0]	$\langle 3 \rangle + 1$	
癸未廿六(21)	[3 + 3 + 7][5 + 5][6, 8]	$\langle 2 \rangle + 1$	
庚寅初三(28)	[2 + 2 + 2 + 8 + 8][7, 0]	$\langle 1 \rangle + 3$	
辛酉初五(27)	[2 + 2 + 8][9, 3, 0, 6]	$\langle 1 \rangle + 1$	} 三次相同
戊辰十二(6)	[7 + 7 + 3][1 + 9][2, 5]	$\langle 2 \rangle + 1$	
壬午廿六(20)	[5 + 5 + 5][1 + 9][6, 3]	$\langle 2 \rangle + 1$	
己亥十四(5)	[1 + 1 + 1][2 + 8][6, 3]	$\langle 2 \rangle + 1$	
癸丑廿八(19)	(未开奖, 需预测)	?	

——上述癸丑廿八(19)之前的主题类型连续相同达3次, 可以认为这是一个变化的明显临界点, 所以, 癸丑廿八(19)的主题类型肯定就不会是“ $\langle 2 \rangle + 1$ ”了。

——从上述的同名纳音[木]系统可知, 若应用同名干支进行相比, 其过程如下:

{	辛酉廿八(4)	[6 + 6][2 + 8][3 + 7][9]	{	$\langle 2 \rangle$
	辛酉初五(27)	[2 + 2 + 8][9, 3, 0, 6]		$\langle 2 \rangle + 1$
{	戊辰初五(11)	[3 + 3][1 + 1 + 9][2, 6]	{	$\langle 2 \rangle + 1$
	戊辰十二(6)	[7 + 7 + 3][1 + 9][2, 5]		$\langle 2 \rangle + 1$
{	壬午十九(25)	[3 + 7][8 + 8][4, 5, 9]	{	$\langle 2 \rangle$
	壬午廿六(20)	[5 + 5 + 5][1 + 9][2, 5]		$\langle 2 \rangle + 1$

$$\begin{cases} \text{己亥初七(11)} & [1+1+9][2+2][3+7] & \left\{ \begin{array}{l} \langle 3 \rangle + 1 \\ \langle 2 \rangle + 1 \end{array} \right. \\ \text{己亥十四(5)} & [1+1+1][2+8][6,3] & \\ \text{癸丑廿一(25)} & [3+7+7][2+8][6,1] & \left\{ \begin{array}{l} \langle 3 \rangle + 1 \\ ? \end{array} \right. \\ \text{癸丑廿八(19)} & (\text{未开奖,需预测}) & \end{cases}$$

[重要说明]

当期次足够多时(正常顺序下,60期为一个满贯后,同名干支开始产生),可以充分利用同名干支对比系统进行各种内容的预测,效果奇佳。

无论是位置号码还是总体结构,当上二轮的同名干支某项内容是一致时,则相应第三轮的同名干支所对比的同一项内容则一定不会再相同。即:

$$\begin{aligned}
 & \text{① } \left\{ \begin{array}{l} A \\ B \end{array} \right. \text{ 当 } A = B \text{ 时,} \quad \left. \right\} \text{ 出现 2 次相同;} & \text{③ } \left\{ \begin{array}{l} E \\ F \end{array} \right. \text{ 则 } E \neq F. \\
 & \text{② } \left\{ \begin{array}{l} C \\ D \end{array} \right. \text{ 当 } C = D \text{ 时,} &
 \end{aligned}$$

——上述同名干支 $\left\{ \begin{array}{l} \text{癸丑廿一(25)} \\ \text{癸丑廿八(19)} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \langle 3 \rangle + 1 \\ ? \end{array} \right.$ 之前的主题类型

变化不明显,无法作出相应的预测,故弃之不用。

[重要说明]

1. 识别各种变化的主题类型的明显临界点,一定要尽量应用同类“最高记录”的标准,以确保相应的预测结论是准确的。

2. 无论使用何种预测方法,你不要指望通过 1—2 种方式就能把大部分的预测内容排除掉!只有实事求是地、一步一个脚印地去做并不十分复杂的预测工作,只有充分挖掘出各种隐蔽的“明显临界点”,才能为最后的小范围的预测结论作出准确性的“贡献”。

第七章 中奖号码的总体结构之二： 数型与配伍的预测推算原则和方法

第一节 数型与虚数型预测法

数型是指中奖号码在五大区间段落的数字型号。凡是在开奖日的中奖号码中没有出现的、消失的数型，称为虚数型；反之，称为实数型(简称数型)。

在预测数型的过程中，有时候预测虚数型的重要性还大于实数型。因为预测后知道了当前期次的虚数型后，则可在组合预测范围内的号码时去掉某一区间段落的号码。这就为降低投注额起到了较大作用。

一、标准参照系——虚数型预测法

指在干支数字信息载体总系统以及其各个分系统中，以开奖日的标准参照系中的各个载体作为当日开奖号码和虚数型的对应载体，通过记录标准参照系的各个载体与虚数型间进行生克关系，各种对应的次数与方向，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

以前的章节已经介绍过，把游戏规则下的各个号码划分为五大区间段落，由小到大分别记作 0，1，2，3，4，分别对应土、水、火、木、金。若期次的开奖号码的数型包含着 0，1，2，3，4，则记作[齐]。

标准参照系——虚数型生克轨迹对应预测法分为：

- 天干——虚数型生克轨迹对应预测法；
- 地支——虚数型生克轨迹对应预测法；

- 纳音——虚数型生克轨迹对应预测法；
- 九宫星——虚数型生克轨迹对应预测法；
- 农历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法；
- 新历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法；

(注：上述的天干、地支、纳音不包含相冲关系的天干、地支、纳音)。

标准参照系——虚数型生克轨迹对应预测法的前提条件是：建立齐全的、完善的数型与配伍演变系统。

原则与方法：

(一)选定适用的系统：所有系统均适用。

(二)检索和找出：识别标准参照系各载体与虚数型间进行平行或斜线对应时，两者间产生同一方向的生克关系的明显临界点的“最高记录”的标准：

①正常顺序下的总系统内：

天干/地支/纳音/九宫星/农历尾数/新历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法：

- 相刑为 2 次。(平行对应)；
- 相刑为 3 次。(斜线对应)；
- 同一方向相生或相克达 4 次，(平行或斜线对应)。

②各个系统内：

天干/地支/纳音/九宫星/农历尾数/新历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法：

- 相刑为 3 次。(平行对应)；
- 相刑为 4 次。(斜线对应)；
- 同一方向相生或相克达 5 次，(平行或斜线对应)。

(三)搜索、判断和确认标准参照系与虚数型进行生克关系轨迹对应过程中产生变化的明显临界点：以上述的标准去衡

量、对比，明显者用之，不明显者弃之；具体问题具体分析。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定。原则是：必须保证预测结果是准确的。

[说明]

1. 在预测推算虚数型过程中，尽量应用“最高标准”去识别变化的明显临界点，以保证相应作出的结论是准确的。

2. 在总系统和各个分系统中，若期次的开奖号码的数型记录符号是[齐](即每一个数型均有代表)，则相应的标准参照系与虚数型之间的生克关系对应就被中断，有关的“次数”和“方向”就应重新计起。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

	数型	总体 配伍	虚数型
己亥初七(11)	2 7 11 13 19 21 22—24 0 0 1 1 2 2 2	[8]	3 ⊗ 3 ⊗ 4
丙午十四(18)	1 8 11 15 21 27 35—23 _刑 0 1 1 2 2 4 4	[4]	3 ⊗ 3
癸丑廿一(25)	8 16 17 22 27 31 33—23 _刑 1 2 2 3 3 4 4	[9]	3 ⊗ 0
庚申廿八(2)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) (未开奖，需预测)		?

——如上述的箭头所示的平行对应，新历(2)——需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：连续出现两次的“相刑”轨迹对应，所以相应的第三次新历(2)与需要预测的虚数型间就不会再产生“相刑”关系，即(2)←^刑⊗→火，从而需要预测的虚数型就不会是“⊗2”，换句话说，庚申廿八(2)的中奖号码的实数型内一定有“2”数型。

例 2：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

——如上述的箭头所示的斜线对应，农历[十五]需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：连续出现3次相刑关系轨迹对应，所以相应的第四次的农历[十五]与虚数型 $\otimes 3$ 之间的对应就不会再是“刑”关系了，即[十五] $\xleftarrow[\otimes]{\text{刑}}$ 土，从而，需要预测的虚数型就不会是“ $\otimes 0$ ”，换句话说，丙寅初八(5)的中奖号码的实数型内一定有“0”数型。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

虚数型

壬寅_{十二(13)}7 11 14 15 20 29 31—25 金 0 0 1 2 2 4 4 ^[3] 3 ⊗ 0

己酉_{十九(20)}3 4 6 22 23 33 36—29 土 0 0 0 3 3 4 4 ^[4] 4 ⊗ 1 ⊗ 2

丙辰_{廿六(27)}1 8 13 19 20 22 24—32 土 0 1 1 2 2 3 3 ^[2] 4 ⊗ 4

癸亥_{初三(4)}7 9 11 14 19 21 32—36 水 0 0 1 1 2 2 4 ^[0] 4 ⊗ 3

庚午_{初十(11)}10 17 19 24 27 33 35—7 土 1 1 2 3 3 4 4 ^[8] 0 ⊗ 0

丁丑_{十七(18)}(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)—(8) 水 (需预测) ?

——如上述的箭头所示的平行对应，开奖日的地支丑——需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一方向的相生关系轨迹对应，所以相应的第五次的地支丑与需要预测的虚数型之间就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即丑——→金，从而需要预测的虚数型就不会是“ $\otimes 4$ ”，换句话说，丁丑十七(18)的中奖号码之实数型内一定有“4”数型。

例 4: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

• • • • •

癸酉 _{十五(12)}	6	9	11	15	23	31	36—25	金	0	1	1	2	3	4	4	[5]	3[齐]
庚辰 _{十七(19)}	6	17	18	20	26	29	31—25	金	0	2	2	2	3	4	4	[7]	3⊗1
丁亥 _{廿九(26)}	1	6	7	11	17	18	35—33	土	0	0	0	1	2	2	4	[9]	4⊗3
甲午 _{初六(3)}	3	6	7	17	23	24	36—22	金	0	0	0	2	3	3	4	[2]	3⊗1
辛丑 _{十三(10)}	12	17	18	22	26	30	22—1	土	0	2	2	3	3	4	4	[9]	0⊗1
戊申 _{二十(17)}	(未开奖, 需预测)							土	?							?	
乙卯 _{廿七(24)}								水									

——如上述的箭头所示的斜线对应；开奖日的纳音[水]——需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：同一方向的相克关系轨迹连续出现4次，所以相应第五次的纳音[水]与需要预测的虚数型之间就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即[水]——→火，从而需要预测的虚数型就不会是属火的⊗2，换句话说，戊申廿十(17)的中奖号码的实数型内一定有“2”数型。

例 5: 某地传统型彩票某阶段中奖号码同名纳音[木]系统:

• • ♦ • • •

虚数型

乙亥	初一(16)	7	7	7	1	2	7	—1	木	3	3	3	0	1	3	$\frac{[3]}{0}$	$\otimes 2 \otimes 4$
癸丑	十五(2)	8	刑	1	6	0	9	4	—2	木	4	0	3	0	4	2	$\frac{[3]}{1} \otimes 1$
庚申	廿二(9)	4	刑	6	6	0	5	5	—7	木	2	3	3	0	2	2	$\frac{[2]}{3} \otimes 1 \otimes 4$
辛卯	廿五(8)	7	刑	2	5	0	1	4	—8	木	3	1	2	0	0	2	$\frac{[8]}{4} \otimes 4$
戊戌	初二(15)	\otimes	(需预测)							木							?

如上述的箭头所示的平行对应，天干戊——需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：连续出现三次的“相刑”关系轨迹对应，所以，相应的第四次天干戊与需要预测的虚数型之间就不会再产生“相刑”关系，即戊 $\xleftrightarrow{\text{刑} \otimes}$ 土，从而需要预测的虚数型就不会是“ $\otimes 0$ ”，换句话说，戊戌初二(15)的中奖号码的实数型内一定有“0”数型。

例 6: 某地传统型彩票某阶段中奖号码数型配伍演变系统:

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

[illegible]

——如上述的箭头所示的斜线对应，九宫星八白——需要预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：连续出现四次

的“相生”关系轨迹对应，所以相应的第五次九宫星八白与需要预测的虚数型之间就不会再出现同一方向的“相生”关系轨迹，即八白 $\xleftarrow{\text{生}\otimes}$ 火，从而需要预测的虚数型就不会是 $\otimes 2$ ，换句话说，壬寅十八(7)的中奖号码之实数型内一定有“2”数型。

例 7：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

														虚数型
壬午	廿六(20)	木	0	0	0	1	1	4	4	$\xrightarrow{[0]}$	3			$\otimes 2 \otimes 3$
己丑	初三(27)	火	0	0	0	1	1	2	3	$\xrightarrow{[7]}$	0	生	\uparrow	$\otimes 4$
丙申	初十(3)	火	0	0	2	2	2	4	4	$\xrightarrow{[4]}$	3	生	\uparrow	$\otimes 1 \otimes 3$
癸卯	十七(10)	金	0	1	1	1	3	3	4	$\xrightarrow{[3]}$	2	生	\uparrow	$\otimes 2$
庚戌	廿四(17)	金	0	1	1	2	2	3	4	$\xrightarrow{[3]}$	1	\otimes	\uparrow	[齐]
丁巳	初二(24)	土	0	0	1	2	2	4	4	$\xrightarrow{[3]}$	4	\otimes	\uparrow	[齐]
甲子	初九(1)	金	(需预测)										\uparrow	?

——如上述的箭头所示的平行对应，连续出现 3 次的同一方面的相生关系轨迹对应，但因为中途出现[齐]的记录符号，这种同一方向连续“相克”的关系轨迹被中断，则需预测的甲子初九(1)中地支[子]与虚数型的生克轨迹对应就重新开始计起。

二、系统——虚数型预测法

指在总系统和各个分系统中，通过记录同一虚数型或同一记录符号连续的出现次数，确定这种变化的明显临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

原则与方法：

- (一)选定适用的系统：所有系统均适用。
- (二)检索和找出：

识别同一虚数型或同一记录符号在系统中连续出现而产生明显临界点的“最高记录”的标准：

△在三十六选 7 中：

●正常顺序下的总系统中，同一虚数型或符号[齐]连续出现达：3 次；

●除等距离排列系统和号码等距离环环相比系统外，在其它各个分系统中，同一虚数型或符号[齐]连续出现达：4 次；

●正常顺序下的总系统中，上期若出了二次的两个虚数型者，则第三期不会再出现两个虚数型；

●在各个分系统中，记录符号连续出现三次的两个虚数型者，则相应的第四次不会再出现两个虚数型；

●在等距离排列系统和号码等距离环环相比系统中，同一虚数型连续出现达：5 次。

△在四十七选 6 中：

●正常顺序下的总系统中，同一虚数型连续达：4 次；连续记录符号[齐]达：3 次；

●在各个分系统中，记录符号连续出现三次的两个虚数型达：5 次；

△在四花选 4 彩票中：

●正常顺序下的总系统中，记录符号连续出现三次的两个虚数型者，则相应的第四次不会再出现两个虚数型。

●在各个分系统中，记录符号连续出现五次的两个虚数型者，则相应的第六次不会再出现两个虚数型。

(三)搜索、判断和确定同一虚数型或同记录符号[齐]连续出现的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；具体问题具体分析；明显者用之，不明显者弃之。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定；原则：必须保证预测结果是准确的。宁缺勿滥。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码同名纳音[金]系统：

.....	<u>虚数型</u>																	
癸卯 _{十一(15)}	3	4	12	14	23	30	36	—11	金	0	0	1	1	3	4	4 ^[3]	1	⊗2
庚戌 _{十八(22)}	7	20	22	23	28	30	33	—17	金	0	2	3	3	3	4	4 ^[9]	2	⊗1
甲子 _{初三(7)}	1	5	6	19	20	23	35	—11	金	0	0	0	2	2	3	4 ^[1]	1	⊗1
辛巳 _{二十(23)}	2	6	16	17	18	29	30	—19	金	0	0	2	2	2	4	4 ^[4]	2	⊗1⊗3
乙未 _{初五(6)}	6	7	17	27	30	33	34	—5	金	0	0	2	3	4	4	4 ^[7]	0	⊗1
壬寅 _{十二(13)}	金									?								

——如上述虚线所示，需预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：同一虚数型“⊗1”连续出现达 4 次，所以相应的第五次需要预测的虚数型就不会再是“⊗1”，换句话说，壬寅十二(13)的实数型内一定有“1”数型。

例 2：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....	<u>虚数型</u>																
己巳 _{十二(7)}	3	4	5	6	7	10	23—33	木	0	0	0	0	0	1	3	$\frac{[4]}{4}$	4⊗2⊗4
丙子 _{十九(14)}	1	3	14	19	24	28	30—20	水	0	0	1	2	3	3	4	$\frac{[3]}{2}$	2[齐]
癸未 _{廿六(21)}	5	8	13	16	17	25	32—18	木	0	1	1	2	2	3	4	$\frac{[3]}{2}$	2[齐]
庚寅 _{初三(28)}	7	12	17	18	22	30	28—28	木	0	1	2	2	3	4	4	$\frac{[6]}{3}$	3[齐]
丁酉 _{初十(5)}	(需预测)								火								?

——如上述虚线所示，需预测的虚数型之前出现一个变化的明显临界点：同一记录符号“[齐]”连续出现达 3 次，所以

的辛酉初五(27)的开奖号码内的数型要么出“齐”，要么只有某一个虚数型。

例 5:某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

戊戌初九(8)	木	0	1	1	1	3	4	4	<u>[4]</u>	3	⊗2
乙巳十六(15)	火	0	0	1	1	2	4	4	<u>[2]</u>	3	⊗3
壬子廿三(22)	木	0	0	0	2	2	2	3	<u>[9]</u>	2	⊗1 ⊗4
己未初一(29)	火	0	0	2	2	3	4	4	<u>[5]</u>	2	⊗1
丙寅初八(5)	火	2	2	2	3	3	4	4	<u>[0]</u>	0	⊗1 ⊗0
癸酉十五(12)	金	0	1	1	2	3	4	4	<u>[5]</u>	3	[齐]
庚辰廿二(19)	金	0	2	2	2	3	4	4	<u>[7]</u>	3	⊗1
丁亥廿九(26)	土	0	0	0	1	2	2	4	<u>[9]</u>	4	⊗3
甲午初六(3)	金	0	0	0	2	3	3	4	<u>[2]</u>	3	⊗1
辛丑十三(10)	土	1	2	2	3	3	4	4	<u>[9]</u>	0	⊗0
戊申二十(17)	土	0	2	2	2	3	4	4	<u>[7]</u>	4	⊗1
乙卯廿七(24)	水	1	2	2	2	3	4	4	<u>[8]</u>	4	⊗0
壬戌初五(31)	水										?

——如上图所示，在需要预测的壬戌初五(31)的第 2 位(即相隔1 期)的等距离环环相比系统中，在连续出现五轮相同的同一虚数型“⊗1”，这可以认为这是一个变化的明显临界点，即相应的第六轮就不会再出现虚数型⊗1，从而需预测的壬戌初五(31)的实数型中就一定会有数型“1”。

例 6:某地 7/36 某阶段中奖号码的第 15 位等距离环环相比系统:

.....

{	甲戌十三(16):	⊗4	
{	己未初一(29):	⊗1	
{	辛巳廿七(30):	⊗1	⊗3
{	丙寅十五(12):	⊗1	⊗0
{	戊子廿七(30):	[齐]	
{	癸酉十五(12):	[齐]	
{	乙未初五(6):	⊗1	
{	庚辰廿二(19):	⊗1	
{	壬寅十二(13):	⊗3	
{	丁亥廿九(26):	⊗3	
{	己酉十九(20):	⊗1	⊗2
{	甲午初六(3):	⊗1	
{	丙辰廿六(27):	⊗4	
{	辛丑十三(10):	?(需预测)	

——上述的等距离环环相比过程中，

{	丙辰廿六(27):	⊗4
{	辛丑十三(10):	?

之前出现一个变化的明显临界点：连续出现五轮相同的虚数型对应，所以相应的第六轮的对比就不会再出现相同的虚数型了，即：

{	丙辰廿六(27):	⊗4
{	辛丑十三(10):	?

从而辛丑十三(10)开奖号码的实数型中一定有数型“4”。

[重要说明]

不同游戏规则下的彩票，其数型在总系统和各个分系统中

的具体表现出来的异同趋势和特点，只要建立起完善的、齐全的、期次足够多的数型配伍系统，经过认真的、细心的观察对比，就不难找出识别各种数型变化状态的明显临界点的标准，总之，一定要具体问题具体分析；原则是不变的，方法是灵活变通的，明显者一定用之，不明显者决不勉强用之。

记住：一方彩票养一方特点，有时候某些状态变化的“最高记录”应因“地”制宜，适当微调也未尝不可。原则就是：必须保证相应的预测结论是准确的！

三、位置——数型预测法

对于乐透型彩票，在正常顺序下的总系统中，由于中奖号码的排列是由左到右，由小到大，依次排列，所以数型就无可避免地受到位置号码排列的自然调节。为了便于预测，把位置号码的数型划分为前、中、后三段。前段数型是指前面二个位置数型，后段数型是指后面二个位置数型，中段数型是指中间的二个或三个位置数型。

所谓位置——数型预测法，就是通过直观法，对位置数型进行观察、对比，通过记录位置数型在前、中、后三段出现分布的趋势与特点，识别其中变化状态的明显临界点，根据临界点变化前后的不一致而达到预测目的。

由于传统型彩票的位置号码的顺序是固定的，所以本预测法不适用传统型彩票。对于三十几选7的彩票，前段数型就第1、2位置的数型，中段数型就是第3、4、5位置的数型，后段数型就是第6、7位置的数型；对于几十选6的彩票，前段、中段、后段数型恰好根据位置进行平均分配，前、中、后各二个位置分别对应；对于几十选5的彩票，前段数型是第1、2位置的数型，中段数型是第3位置的数型，后段数型则是第4、5位置的数型。

一般情况下，前段、后段数型的数型范围波动较小，绝大多数的数型在某 1—2 个固定的段落之间反复出现；而中段数型的数型范围相对而言波动较大，它可在 1—3 个不同数型中反复变换。

下面以 7/36 彩票为例，介绍位置——数型预测法。

(一)前段数型位置预测法：前段数型的记录符号分别有：

- a. “00” 和 “01” ——占绝大部分；
- b. “11”、“12” 和 “02” ——占小部分；
- c. “13”、“22” ——占极少数。

●在正常顺序下的总系统中，凡是前段数型“00”连续出现达 3 次时，则可以为这是一个变化的明显临界点，即相应的第四次不会再出现“00”。

●在正常顺序下的总系统中，前段数型是“11”或“12”或“02”时，当连续 1—2 次时，则可以认为是一个变化的明显临界点，即相应的第 2—3 次不会现出现“11”或“12”或“02”。

●在正常顺序下的总系统中，前段数型是“13”或“22”时，则相应的下一期不会再重复同一数型。

(二)后段数型位置预测法：在正常顺序下的总系统中，后段数型的记录符号分别有：

- a. “44” 和 “34” ——占绝大多数；
- b. “33” 和 “23” 或 “24” ——占小部分；
- c. “13” 或 “22” ——占极少数。

——后段数型连续出现记录符号时产生变化的明显临界点的次数：

- 凡是后段数型“44”连续达 5 次时；
- 凡是最后一位数型是“3”且连续达 2 次时。

(三)中段数型位置预测法：正常顺序下的总系统中，中段数型由于波动较大，每个位置数型往往有3个数型反复变化交换，所以，一般情况下，对中段数型不去作特别的预测。若前段与后段数型得到准确的预测，则中段数型在“前”与“后”的限制下，中段数型号码就自然而然地受到局部的约束与限制。

例1：某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

己卯廿二(16) 土 0 1 2 3 3 4 4 $\frac{[7]}{1}$ 1 [齐]
 丙戌廿九(23) 土 $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ 0 1 3 4 4 $\frac{[2]}{1}$ 1 ⊗2
 癸巳初七(30) 水 $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ 0 1 1 1 3 $\frac{[6]}{2}$ 2 ⊗2 ⊗4
 庚子十四(6) 土 $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ 1 1 3 4 4 $\frac{[3]}{4}$ 4 ⊗2
 丁未廿一(13) 水 (需预测)

——如上述的丁未廿一(13)之前的前段数型出现一个变化的明显临界点：连续出现三次“00”，所以需要预测的丁未廿一(13)的前段数型就不会再是“00”。

例2：某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丙午十四(18) 水 0 1 1 2 2 4 4 $\frac{[4]}{3}$ 3 ⊗3
 癸丑廿一(25) 木 1 2 $\frac{2}{2}$ 3 3 4 4 $\frac{[9]}{3}$ 3 ⊗0
 庚申廿八(2) 木 1 1 $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ 3 4 4 $\frac{[7]}{3}$ 3 ⊗0
 丁卯初六(9) 火 0 1 $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ 4 3 3 $\frac{[5]}{1}$ 1 ⊗3
 甲戌十三(16) 火 0 1 $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ 3 $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{[6]}{4}$ 4 ⊗4
 辛巳二十(23) 金 0 0 $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{2}$ 2 $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{[4]}{2}$ 2 ⊗1 ⊗3
 戊子廿七(30) 火 0 1 $\frac{2}{2}$ 3 3 $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{[7]}{4}$ 4 [齐]

乙未_{初五(6)} 金 0 0 2 3 4 4 4 $\frac{[7]}{0}$ $\otimes 1$

壬寅_{十二(13)} 金 0 0 1 2 2 4 4 $\frac{[3]}{3}$ $\otimes 3$

己酉_{十九(20)} 土 (需预测)

——从上述例子的中段数型(第3个位置)可知：同一位置数型可出现“2”达7次，(第3、4位置数型)记录符号“22”可以连续达4次才产生一个变化的明显临界点；

——上述需预测的己酉十九(20)之前的后段数型出现一个变化的明显临界点：连续出现5次“44”记录符号，所以相应的第6次的后段数型就不会再是“44”。

[重要说明]

1. 前、中后段数型的总体预测，还应结合虚数型的综合预测结果，这样，才能令位置数型的预测更加恰到好处。

2. 前段数型为“00”和“01”与后段数型为“44”和“34”，两者间的前后互相配搭占(7/36)的绝大部分！

第二节 配伍预测法

各个位置数型相加之和的尾数就是配伍。为了便于预测，把配伍划分为前段配伍和后段配伍。对于几十选6或传统型的彩票而言，前面三个位置数型之和的尾数为前段配伍，后面三个位置数型之和的尾数为后段配伍；对于几十选5的彩票，前面二个位置数型之和的尾数为前段配伍，后面三个位置数型之和的尾数为后段配伍；对于几十选7的彩票，前面四个位置数型之和的尾数为前段配伍，后面三个位置数型之和的尾数为后段配伍。说明：我们所讲的配伍，就是指总体数型之和尾数的配伍。

一、标准参照系——配伍生克轨迹对应预测法：

指在干支数字信息载体总系统以及其各个分系统中，以开奖日的标准参照系中各个载体作为开奖日的配伍之对应载体，通过记录标准参照系中各个载体与配伍间进行生克关系平行对应时的次数与方向，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

标准参照系——配伍生克轨迹对应预测法可分为：

- 天干——配伍生克轨迹对应预测法；
- 地支——配伍生克轨迹对应预测法；
- 纳音——配伍生克轨迹对应预测法；
- 九宫星——配伍生克轨迹对应预测法；
- 农历尾数——配伍生克轨迹对应预测法；
- 新历尾数——配伍生克轨迹对应预测法。

(注：上述的天干、地支、纳音不包含相冲关系的天干、地支、纳音。)

标准参照系——配伍生克轨迹对应预测法的前提条件是：建立齐全的、完善的数型、配伍演变系统。

原则与方法：

(一)选定适用的系统：所有的系统均适用。

(二)检索和找出：

识别标准参照系各载体与配伍间进行平行对应时，两者间产生同一种的生克关系的明显临界点的“最高记录”的标准。

●正常顺序下的总系统：上一期的农历/新历尾数与配伍(进行平行对应)是完全一致时，则下一期的配伍就不会再与当日的农历/新历尾数相同。

●在各个分系统中，农历/新历尾数与配伍(进行平行对应)完全一致达2次时，则相应的第三次的配伍就不会再与当日的

农历/新历尾数相同。

●在正常顺序下的总系统：农历/新历尾数与当日的配伍进行生克关系的平行对应时，相生或相克或相刑关系达到 5 次时，(注：不讲方向!)。

●正常顺序下的总系统中，开奖日的天干/地支/纳音/九宫星与配伍进行生克关系的平行对应时，相生或相克或相刑关系为同一方向且达 3 次。

※正常顺序下的总系统：上一期的农历/新历尾数与前段或后段配伍(进行平行对应)是完全一致时，则下一期的配伍就不会再与当日的农历/新历尾数相同。

※在各个分系统中：农历/新历尾数与前段或后段配伍(进行平行对应)是一致达 3 次时，则相应的第四次的前段或后段配伍就不会再与当日的农历/新历尾数相同。

※正常顺序下的总系统，开奖日的天干/地支/纳音/九宫星与前段配伍或后段配伍进行生克关系的平行对应时，相生或相克或相刑关系为同一方向且达 5 次。

※正常顺序下的总系统，开奖日的农历尾数/新历尾数与前段或后段配伍进行生克关系的平行对应时，相生或相克或相刑关系为同一方向且达 3 次。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

				前段配伍		后段配伍		总体配伍	
乙酉	三十(22)	水	1	2 2 2 7		2 3 4 9		[6]	0
壬辰	初七(29)	水	0	1 1 2 4		2 3 4 9		[3]	3
己亥	十四(5)	木	0	1 1 3 5		3 3 4 0		[5]	0
丙午	廿一(12)	水	⊗ (需预测)			⊗		?	

Diagram showing connections: A bracket connects the '1' in the 3rd column of the 3rd row to the '1' in the 3rd column of the 4th row. Another bracket connects the '3' in the 7th column of the 3rd row to the '3' in the 7th column of the 4th row. A third bracket connects the '4' in the 8th column of the 3rd row to the '4' in the 8th column of the 4th row. A fourth bracket connects the '9' in the 9th column of the 3rd row to the '9' in the 9th column of the 4th row. A fifth bracket connects the '0' in the 10th column of the 4th row to the '0' in the 10th column of the 5th row.

如上述的箭头所示的平行对应，丙午廿一(12)的新历(12)——前段配伍或总体配伍之前出现一个变化的明显临界点：出现一次的尾数相同，所以需要预测的前段配伍和总体配伍就不会再与新历(12)的尾数相一致，即： $(12) \xrightarrow{\otimes} [2]$ ，从而需要预测的前段配伍和总体配伍就均不会是[2]。

例 2:某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

辛丑	十三(10)	土	1	2	2	3	8	3	4	4 ₁	<u>[9]</u>	0
戊申	二十(17)	土	0	0	2	2	4	3	4	4 ₁	<u>[5]</u>	4
乙卯	廿七(24)	水	1	1	2	2	6	3	4	4 ₁	<u>[7]</u>	4
壬戌	初五(31)	水	⊗ (需预测)								<u>?</u>	

——如上述的箭头所示的平行对应，农历初五——需要预测的配伍之前出现一个变化的明显临界点：出现一次的尾数相同，所以需要预测的配伍就不会再与农历初五的尾数相一致，即初五 $\xleftarrow[\textcircled{\otimes}]{\text{刑}}$ [5]，从而需要预测的配伍就不会是[5]了。

例 3:某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

• • • • •

甲辰	十七(12)	火	1	1	1	2 ₅	2	4	4 ₈	刑	[3]	1
辛亥	廿四(19)	金	0	2	2	2 ₆	2	3	3 ₈	刑	[4]	1
戊午	初一(26)	火	0	1	2	2 ₅	3	4	4 ₁	刑	[6]	1
乙丑	初八(2)	金	0	1	3	3 ₇	3	4	4 ₁	刑	[8]	2
壬申	十五(9)	金	0	2	3	3 ₈	4	4	4 ₂	刑	[0]	3
己卯	廿二(16)	土	0	1	2	3 ₆	3	4	4 ₁	刑	[7]	1
丙戌	廿九(23)	土									[?]	

(需预测)

——如上述的箭头所示的平行对应，农历廿九——需要预测的配伍之前出现一个变化的明显临界点：同一相刑关系轨迹对应达 5 次，所以，需要预测的配伍就不会再与农历廿九的尾数发生相刑关系，即廿九 $\xrightarrow[\otimes]{\text{刑}}$ $\begin{cases} [9] \\ [4] \end{cases}$ ，从而需要预测的配伍就不会是[4]或[9]。

例 4：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丁巳初二(24)	土	0	1	1	2 ₄	3	4	4 ₁	$\xrightarrow{[5]}$	3
甲子初九(1)	金	0	1	1	2 ₄	2	2	3 ₇	生 $\xrightarrow{[1]}$	1
辛未十六(8)	土	0	1	1	1 ₃	3	4	4 ₁	生 $\xrightarrow{[4]}$	4
戊寅廿三(15)	土	1	1	2	2 ₆	2	3	3 ₈	生 $\xrightarrow{[4]}$	0
乙酉三十(22)	水	(需预测)							$\otimes \xrightarrow{?}$	

——如上述的箭头所示的平行对应，纳音水——需要预测的配伍之前出现一个变化的明显临界点：同一方向相生关系轨迹对应达 3 次；所以，需要预测的配伍就不会与纳音水再发生同一方向的相生关系，即水 $\xrightarrow[\otimes]{\text{生}}$ 木，从而需要预测的配伍就不会是[3]或[8]了。

例 5：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丙寅初八(5)	火	2	2	2	3 ₉	3	4	4 ₁	$\xrightarrow{[0]}$	0
癸酉十五(12)	金	0	1	1	2 ₄	3	4	4 ₁	生 $\xrightarrow{[5]}$	3
庚辰廿二(19)	金	0	2	2	2 ₆	3	4	4 ₁	生 $\xrightarrow{[7]}$	3
丁亥廿九(26)	土	0	0	0	1 ₁	2	2	4 ₈	生 $\xrightarrow{[9]}$	4
甲午初六(3)	金	(需预测)							$\otimes \xrightarrow{?}$	

——如上述的箭头所示的平行对应，地支午——需预测的配伍之前出现一个变化的明显临界点：同一方向相生关系轨迹对应达3次；所以，需要预测的配伍就不会与地支午再发生同一方向的相生关系，即午 $\xleftarrow{\text{生}}\textcircled{\otimes}$ 木，从而需要预测的配伍就不会是[3]或[8]了。

例 6: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的数型配伍演变系统：

.....

甲寅廿八(20)	水	1	3	3	3 ₀	4	4	4 ₂	$\frac{[2]}{1}$
辛酉初五(27)	木	1	2	2	3 ₈	3	3	4 ₀	$\frac{[8]}{4}$
戊辰十二(6)	木	0	0	0	0 ₀	2	2	4 ₇	$\frac{[7]}{4}$
乙亥十九(13)	火	1	1	2	3 ₇	3	4	4 ₁	$\frac{[8]}{0}$
壬午廿六(20)	木	0	0	0	1 ₁	1	4	4 ₉	$\frac{[0]}{3}$
己丑初三(27)	火	0	0	1	2 ₃	4	4	4 ₂	$\frac{[5]}{0}$
丙申初十(3)	火								

(需预测) *

——如上述的箭头所示的平行对应，天干丙——需预测的后段配伍之前出现一个变化的明显临界点：同一方向相生关系轨迹对应达 5 次，所以，需要预测的后段配伍就不会与开奖日的天干再发生同一方向的相生关系，即丙 $\xleftarrow{\text{生}}\textcircled{\otimes}$ 木，从而需要预测的后段配伍就不会是[3]或[8]了。

例 7: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的数型配伍演变系统：

.....

庚子 _{十四(6)}	土	0	0	1	1 ₃	3	4	4 ₁	<u>[3]</u>	4	四绿
丁未 _{廿一(13)}	水	0	0	1	2 ₃	4	4	4 ₂	<u>[5]</u>	生	六白
甲寅 _{廿八(20)}	水	1	3	3	3 ₀	4	4	4 ₂	<u>[2]</u>	生	八白
辛酉 _{初五(27)}	木	0	1	1	1 ₃	3	4	4 ₁	<u>[4]</u>	生	一白
戊辰 _{十二(6)}	木								<u>?</u>	⊗	三碧
(需预测)											

——如上述的箭头所示的平行对应,九宫星三碧——需要预测的配伍之前出现一个变化的明显临界点:同一方向相生关系轨迹对应达3次;所以需要预测的配伍就不会与当日的九宫星三碧再发生同一方向的相生关系,即水 $\xrightarrow[\otimes]{生}$ 三碧,从而需要预测的配伍就不会是[1]或[6]了。

例8:某地7/36某阶段中奖号码正常顺序下的数型配伍演变系统:

.....

戊寅 _{廿三(15)}	土	1	1	2	2	6	2	3	3 ₈	<u>[4]</u>	0
乙酉 _{三十(22)}	水	1	2	2	2	7	2	3	4 ₉	<u>[6]</u>	0
壬辰 _{初七(29)}	水	0	1	1	2	4	2	3	4 ₉	<u>[3]</u>	3
己亥 _{十四(5)}	木	0	1	1	3	5	3	3	4 ₀	<u>[5]</u>	0
丙午 _{廿一(12)}	水	⊗	(需预测)	*							

——如上述的箭头所示的平行对应,新历(12)——需要预测的前段配伍之前出现一个变化的明显临界点:相刑关系轨迹对应达3次;所以需要预测的前段配伍就不会与新历(12)再发生相刑关系,即(12) $\xleftarrow[\otimes]{刑}$ 火,从而需要预测的前段配伍就不会再是[2]或[7]了。

二、配伍间垂直对应预测法：

指在总系统和各个分系统中，通过记录配伍与配伍间进行垂直对应时所发生的同一方向生克关系的次数和方向，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

(一)选定适用的系统：所有系统均适用。

(二)检索和找出：

识别配伍与配伍间进行垂直对应时发生同一方向生克关系的明显临界点的“最高记录”的标准：

●在正常顺序下的总系统中，尾数上下相同达1次(即自刑)。

●在正常顺序下的总系统中，相刑达2次(同刑、自刑混合)。

●在正常顺序下的总系统中，同一方向的相生或相克关系轨迹对应为：3次。

●在各个分系统中，同一方向的相生或相克或相刑关系轨迹对应为：4次。

※正常顺序下的总系统中：相刑达3次(尾数可以完全相同)

※正常顺序下的总系统中：同一方向的相生或相克关系轨迹对应为：3次。

※在各个分系统中，同一方向的相生或相克关系轨迹对应为：4次。

(注：上述※项是指前段配伍间以及后段配伍间进行的垂直对应时所产生的关系。)

(三)搜索、判断和确定配伍间进行垂直对应时产生变化的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；具体问题具体分析；明显者用之，不明显者弃之。

(四)作出初步的预测结果：根据识别出的变化的明显临界点作出相应的排除或肯定；原则：必须保证预测结果是准确

的。宁缺勿滥。

例 1：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

甲子初九(1)	金	0	1	1	2 ₄	2	2	3 ₇	<u>[1]</u>	1
辛未十六(8)	土	0	1	1	1 ₃	3	4	4 ₁	<u>[4]</u>	4
戊寅廿三(15)	土	1	1	2	2 ₆	2	3	3 ₈	<u>[4]</u>	0
乙酉三十(22)	水								<u>?</u>	

——上述所示的总体配伍中，需预测的乙酉三十(22)之前出现一个变化的明显临界点：出现相同尾数的记录符号[4]达 1 次，所以需要预测的乙酉三十(22)的配伍就不会是[4]。

例 2：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

乙卯廿七(24)	水	1	1	2	2 ₆	3	4	4 ₁	<u>[7]</u>	1
壬戌初五(31)	水	0	1	3	3 ₇	4	4	4 ₂	<u>[9]</u>	4
己巳十二(7)	木	0	0	0	0 ₀	0	1	3 ₄	<u>[4]</u>	0
丙子十九(14)	水	1	2	2	3 ₈	3	4	4 ₁	<u>[9]</u>	
癸未廿六(21)	木								<u>?</u>	

——上述所示的总体配伍中，需预测的癸未廿六(21)之前出现一个变化的明显临界点：连续出现相刑关系轨迹对应达 2 次，所以，相应的第三次垂直对应轨迹就不会现出相刑关系，即[9] $\xrightarrow[\text{刑}]{\text{⊗}}$ 金，从而，需要预测的癸未廿六(21)之配伍就不会是[4]和[9]了。

例 3：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

	前段配伍				后段配伍				总体配伍	纳音
己亥十四(5)	0	1	1	3 ₅	3	3	4 ₀		$\frac{[5]}{0}$	木
丙午廿一(12)	0	1	2	3 ₆	3	3	4 ₀		$\frac{[6]}{1}$	水
癸丑廿八(19)	0	0	1	3 ₄	3	4	4 ₁		$\frac{[5]}{4}$	木
庚申初六(26)	0	1	1	4 ₆	4	4	4 ₂		$\frac{[8]}{0}$	木
丁卯十三(3)	0	0	3	4 ₇	4	4	4 ₂		$\frac{[9]}{4}$	火
甲戌二十(10)									$\frac{?}{\otimes}$	

——如上述箭头所示的垂直对应，需要预测的甲戌廿十(10)之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一方面的相克关系轨迹达3次，所以相应的第四次的垂直对应的就不会再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即[9]← $\frac{\text{克}}{\otimes}$ 火，从而需要预测的甲戌廿十(10)的配伍就不会是[2]和[7]了。

例 4：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....										
辛酉廿八(4)	木	0	1	2	3 ₆	3	4	4 ₁	$\frac{[7]}{4}$	
戊辰初五(11)	木	0	1	2	2 ₅	3	4	4 ₁	$\frac{[6]}{2}$	
乙亥十二(18)	火	1	1	1	1 ₄	2	2	3 ₇	$\frac{[1]}{0}$	
壬午十九(25)	木	0	0	1	2 ₃	3	3	4 ₀	$\frac{[3]}{0}$	
己丑廿六(1)	火	0	0	0	1 ₁	2	2	3 ₇	$\frac{[8]}{4}$	
丙申初四(8)	火	0	1	2	3 ₆	3	3	4 ₀	$\frac{[6]}{1}$	
癸卯十一(15)	金	0	0	1	1 ₂	3	4	4 ₁	$\frac{[3]}{1}$	
庚戌十八(22)	金	0	2	3	3 ₈	3	4	4 ₁	$\frac{[9]}{1}$	

丁巳廿五(29)	土	1	1	3	3	8	3	3	4	0	<u>[8]</u>	3
甲子初二(7)	金	0	0	0	2	2	2	3	4	9	<u>[1]</u>	1
辛未初九(14)	土	0	0	1	2	3	3	3	4	0	<u>[3]</u>	4
戊寅十六(21)	土	0	1	3	3	7	3	4	4	1	<u>[8]</u>	0
乙酉廿三(28)	水	0	1	1	2	4	2	2	3	7	<u>[1]</u>	0
壬辰三十(4)	水										<u>?</u>	

——如上述虚线框所示的环环相比，需要预测的配伍的第七位等距离环环相比过程如下：

<div> <div>乙亥十二(18) [1]</div> <div>甲子初二(7) [1]</div> </div> <div>(相刑)</div>	<div> <div>壬午十九(25) [3]</div> <div>辛未初九(14) [3]</div> </div> <div>(相刑)</div>
<div> <div>己丑廿六(1) [8]</div> <div>戊寅十六(21) [8]</div> </div> <div>(相刑)</div>	<div> <div>丙申初四(8) [6]</div> <div>乙酉廿三(28) [1]</div> </div> <div>(相刑)</div>
<div> <div>癸卯十一(15) [3]</div> <div>壬辰三十(4) ?</div> </div> <div>⊗(相刑)</div>	

——即 $\left\{ \begin{array}{l} \text{癸卯十一(15)} \\ \text{壬辰三十(4)} \end{array} \right.$ 之前出现一个变化的明显临界点：

出现连续四次相刑关系轨迹对应，所以相应的第五次环环相比就不会再出现同一相刑关系，即 $[3] \xrightarrow[\otimes]{\text{刑}} \text{木}$ ，从而需要预测的壬辰三十(4)之配伍就不会是[3]和[8]了。

例 5：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的数型配伍演变系统：

.....

壬子	廿三(22)	木	0	0	0	2 ₂	2	2	3 ₇	<u>[9]</u>	2
己未	初一(29)	火	0	0	2	2 ₄	3	4	4 ₁	<u>[5]</u>	2
丙寅	初八(5)	火	2	2	2	3 ₉	3	4	4 ₁	<u>[0]</u>	0
癸酉	十五(12)	金	0	1	1	2 ₄	3	4	4 ₁	<u>[5]</u>	3
庚辰	廿二(19)	金	0	2	2	2 ₆	3	4	4 ₁	<u>[7]</u>	3
丁亥	廿九(26)	土	(需预测)						⊗ *		

——如上图箭头所示的垂直对应，需要预测的丁亥廿九(26)的后段配伍之前出现一个变化的明显临界点：连续出现相刑关系轨迹对应达3次，所以，相应的第四次垂直对应就不会再产生同一相刑关系轨迹对应，即 $1 \xleftarrow{\text{刑}} \textcircled{\otimes} \rightarrow \text{水}$ ，从而需要预测的丁亥廿九(26)的后段配伍就不会是[1]和[6]了。

例 6: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

• • • • •

辛亥	廿四(19)	金	0	2	2	2 ₆	2	3	3 ₈	<u>[4]</u>	1
戊午	初一(26)	火	0	1	2	2 ₅	3	4	4 ₁	<u>[6]</u>	1
					↑生						
乙丑	初八(2)	金	0	1	3	3 ₇	3	4	4 ₁	<u>[8]</u>	2
					↑生						
壬申	十五(9)	金	0	2	3	3 ₈	4	4	4 ₂	<u>[0]</u>	3
					↑生						
己卯	廿二(16)	土	0	1	2	3 ₆	3	4	4 ₁	<u>[7]</u>	1
					↑⊗						
丙戌	廿九(23)	土	(需预测)			*					

——如上图箭头所示的垂直对应，需要预测的丙戌廿九(23)的前段配伍之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一方向的相生关系轨迹对应达3次，所以，相应的第四次垂直

对应就不会再产生同一方向的相生关系轨迹对应，即金 $\xrightarrow{\text{生}\otimes}6$ ，从而需要预测的丙戌廿九(23)的前段配伍就不会是[4]和[9]了。

例 7：某地 7/36 某阶段中奖号码的农历主题系统：
.....

辛亥 _{廿四(19)}	金	0	2	2	2 ₆	2	3	3 ₈	<u>[4]</u>	1
庚子 _{十四(6)}	土	0	0	1	1 ₂	3	4	4 ₁	<u>[3]</u>	4
壬午 _{廿六(20)}	木	0	0	0	1 ₁	1	4	4 ₉	<u>[0]</u>	3
庚戌 _{廿四(17)}	金	0	1	2	2 ₅	2	3	4 ₉	<u>[4]</u>	4
辛未 _{十六(8)}	土	0	1	1	1 ₃	3	4	4 ₁	<u>[4]</u>	4
己亥 _{十四(5)}	木	0	0	2	2 ₄	3	4	4 ₁	<u>[5]</u>	0
庚申 _{初六(26)}	木	(需预测)			* \otimes					

——如上图箭头所示的垂直对应，需要预测的庚申初六(26)的前段配伍之前出现一个变化的明显临界点：出现连续的同方向相克关系轨迹达 4 次，所以，需要预测的庚申初六(26)前段配伍就不会与相应的前段配伍[4]再产生同一方向的相克关系轨迹对应，即火 $\xrightarrow{\text{克}\otimes}[4]$ ，从而需要预测的庚申初六(26)的前段配伍就不会是[2]和[7]了。

[重要说明]

1. 在三十几选 7 中，配伍的记录符号是 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 共 10 个数字，其后段配伍为[1]——即“344”和[0]——即“334”占多数；前段配伍为[4]——即“0112”和[3]——即“0012”以及[6]——即“0123”占多数；总体配伍属土的[5]和[0]占比例较少。

2. 所以，各个位置数型(即号码出没的区间段落)除了应结合虚数型，前段、中段、后段数型推算外，还应综合配伍、前段配伍、后段配伍，综合这些的准确的预测结果，可以极大范围地缩减预测号码的出没范围，可以大幅度地降低投注额。

3. 无论应用何种方式，对于预测总体结构的数型或配伍，一定要尽量采用同类“最高标准”去识别变化的明显临界点。

第八章 中奖号码的总体结构之三： 总体五行状态的预测原则与方法

第一节 系统——总体五行状态预测法

我们已经知道，每一个位置号码不外乎五行中的金木水火土之一，因此，由每一个位置号码的五行属性所组成的中奖号码的总体五行状态同样反映出开奖日的开奖号码的总体结构特征：

所谓总体五行状态，就是指由开奖日的位置号码的各个同类的五行属性共同形成，它只讲究总体名称，不讲究五行组成的顺序和数目。任何一种乐透型和传统型彩票的总体五行状态不外乎如下之一：

(一) 金木水火土

(二) 土木水火 (缺金) 木水火金 (缺土)

水火土金 (缺木) 火木土金 (缺水)

金土水木 (缺火)

(三) 土木火 (缺金、水) 金水土 (缺木、火)

土木水 (缺金、火) 金土火 (缺水、木)

土水火 (缺金、木) 金木火 (缺土、水)

木水火 (缺金、土) 土金木 (缺水、火)

金水火 (缺木、土)

(四) 金木 金水 金土 金火 水木 水土 水火 火土 火木 土木

(说明：体彩 7/36 的特别号码不在计算之列，单独考虑。)

——上述需要预测的庚申初六(26)的总体五行状态之前出现一个变化的明显临界点：连续出现两次同名的总体五行状态，所以相应的第三次就不会再出现同名总体五行状态，即需要预测的庚申初六(26)的总体五行状态不会是“土金火”。

例 2：某地 7/36 某阶段的农历[2·8]主题系统：

										总体五行状态	虚五行
庚申	廿八(2)	10	13	16	20	28	29	34	— 25	金木土水	⊗火
壬寅	十二(13)	7	11	14	15	20	29	31	— 25	金土水火	⊗木
辛卯	初二(1)	10	18	25	26	32	33	36	— 2	木土水火	⊗金
丙寅	初八(5)	15	18	20	25	27	34	36	— 7	{ 金木水火土	[齐]
庚辰	廿二(19)	6	17	18	20	26	29	31	— 25		[齐]
己巳	十二(7)	3	4	5	6	7	10	23	— 33		[齐]
乙丑	初八(2)	(需预测)								?	

——上述需要预测的乙丑初八(2)的总体五行状态之前出现一个变化的明显临界点：连续出现三次同名的总体五行状态，所以相应的第四次就不会再出现同名总体五行状态，即需要预测的乙丑初八(2)的总体五行状态不会是“金木水火土”。

例 3：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

								总体五行状态	虚五行
乙未	初三(7)	6	7	17	27	30	33 34—5	金木水火土	[齐]
壬寅	初十(14)	4	7	10	17	23	28 34—9	金木火土	⊗水
己酉	十七(21)	4	8	12	17	28	30 33—6	金木火土	⊗水
丙辰	廿四(28)	1	4	12	20	21	27 32—30	金水火土	⊗木
癸亥	初二(5)	9	11	12	13	23	25 34—29	金木水火土	[齐]
庚午	初九(12)	1	11	24	26	29	30 35—20	金土水	⊗木火
丁丑	十六(19)	6	8	11	21	24	28 34—10	金木水	⊗土火
甲申	廿三(26)	5	16	22	25	27	30 34—4	金水火土	⊗木
辛卯	初一(2)	2	4	11	12	27	33 36—5	金木火水	⊗土
戊戌	初八(9)	10	20	22	26	29	32 35—13	金火土水	⊗木
乙巳	十五(16)	4	7	8	18	27	30 34—11	金木火土	⊗水
壬子	廿二(23)	4	13	15	17	27	33 34—5	金木火土	⊗水
己未	廿九(30)	7	14	24	25	27	29 36—31	金水火土	⊗木
丙寅	初六(7)	(需预测)						?	⊗

——如上述的虚线框所示，需要预测的丙寅初六(7)的第九位等距离环环相比过程如下：

- {壬寅初十(14)

金木火土
- {乙巳十五(16)

金木火土
- (相同)
- {己酉十七(21)

金木火土
- {壬子廿二(23)

金木火土
- (相同)
- {丙辰廿四(28)

金水火土
- {己未廿九(30)

金水火土
- (相同)

⊗

$\left\{ \begin{array}{l} \text{癸亥初二(5)} \\ \text{丙寅初六(7)} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{金木水火土} \\ ? \end{array} \quad (\text{不会相同})$

——可以认为出现一个变化的明显临界点：连续三轮出现同名称对应，所以相应的第四次的等距离环环相比就不会再出现同名对称，即 $\left\{ \begin{array}{l} \text{癸亥初二(5)} \\ \text{丙寅初六(7)} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{金木水火土} \\ \uparrow \otimes ? \end{array}$ ，从而需要预测的丙寅初六(7)的总体五行状态就不会是“金木水火土”。

[说明]

凡是开奖号码的总体五行状态是“金木水火土”者，则记作[齐]，即没有“虚五行”了。

第二节 虚五行预测法

虚五行预测法包括标准参照系——虚五行平行对应预测法和系统——虚五行预测法两种。

一、标准参照系——虚五行预测法：

就是以开奖日的标准参照系的各载体作为当日开奖号码的虚五行之对应载体，通过记录标准参照系各载体与虚五行间的平行对应时产生同一的五行属性的对应次数，确认这种变化状态的临界点，根据临界点变化前后的不一样性而达到预测目的。

标准参照系——虚五行预测法包括：

- 天干——虚五行对应预测法；
- 地支——虚五行对应预测法；
- 纳音——虚五行对应预测法；
- 九宫星——虚五行对应预测法；
- 农历尾数——虚五行对应预测法；
- 新历尾数——虚五行对应预测法。

(一)选定适用的系统：所有系统均适用。

(二)检索和找出：

识别标准参照各载体(天干/地支/纳音/九宫星/农历尾数/新历尾数)——虚五行平行对应时产生同一五行属性的明显临界点的“最高记录”的标准：

(注：若遇上记录符号[齐]，则平行对应的五行属性是否一致，就要重新计起)

——在正常顺序下的总系统中：

●天干/地支/九宫星——虚五行进行平行对应时，出现二次同一五行属性对应；

●纳音/农历尾数/新历尾数——虚五行进行平行对应时，出现三次同一五行属性对应。

(注：在几十选7中，出现二次同一五行属性对应就几乎是一个明显临界点；几十选5和传统型彩票，则出现三次同一五行属性对应才会产生一个明显临界点。)

(注：上述的天干/地支/纳音/包括开奖日的相冲关系的天干、地支、纳音。)

——在各个分系统中：

●天干/地支/九宫星/农历尾数/新历尾数——虚五行进行平行对应时，出现四次同一五行属性对应；

●同名纳音系统——虚五行进行平行对应时，出现二次同一五行属性对应。

(三)搜索、判断和确认标准参照系各载体与开奖日的虚五行进行平行对应时两者的五行属性是一致的明显临界点：以上述的标准去衡量、对比；明显者用之，不明显者弃之；具体问题具体分析。

(四)作出初步预测结果：根据识别出的两者间具有同一五

行属性的次数的明显临界点作出相应的排除或肯定。

原则：必须保证预测结果是准确的。

例 1：某地 7/36 某阶段正常顺序下的开奖号码的总系统：

.....

辛亥廿四(19)	1	16	17	18	19	22	27—11	金	金	木	水	火	⊗土
戊午初一(26)	1	10	15	21	24	30	35—12	火	土	金	水	⊗木	火
乙丑初八(2)	5	13	23	27	28	30	35—19	金	木	火	土	⊗水	金
壬申十五(9)	3	17	23	26	30	35	36—28	金	木	土	水	火	⊗金
己卯廿二(16)							(需预测)	土			⊗		?

——如上述的箭头所示的平行对应，土——？(未知的虚五行)之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一五行属性对应的次数达 2 次，所以，纳音土与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的己卯廿二(16)的总体结构中一定有属土的号码。

例 2：某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

辛巳十三(30)	3	6	6	0	4	3—7	金	木	土	水	⊗火
戊子二十(16)	7	7	1	1	7	8—7	木	水	火	⊗金	土
乙未廿七(13)	6	8	1	0	9	5—1	金	木	土	水	⊗火
壬寅初五(20)	6	6	9	8	1	3—0	金	木	水	⊗火	土
己酉十二(27)							(需预测)	⊗			?

——如上述的箭头所示的平行对应，农历十二——？之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一五行属性对应的次数达 3 次；所以，农历十二与未知的虚五行之间就不会再出现相

同的五行属性，即需要预测的己酉十二(27)的总体结构中一定有农历十二的五行属性：火。

例 3: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....										纳音		总体五行					虚五行
己亥	初七(11)	2	7	11	13	19	21	22	—	24	木	木	水	火	金	⊗土	
丙午	十四(18)	1	8	11	15	21	29	35	—	23	水	金	木	土	水	⊗火	
癸丑	廿一(25)	8	16	17	22	27	31	33	—	23	木	木	水	火		⊗土、金	
庚申	廿八(2)	(需预测)									⊗	木					?

——如上述的箭头所示的平行对应，地支申——？之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一五行属性对应的次数达2次，所以，地支申与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的庚申廿八(2)的总体结构中一定有地支申的五行属性：金。

例 4: 某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

丙申	初四(8)	4	10	17	22	25	28	34—9	火	金木火土	⊗水
癸卯	十一(15)	3	4	12	14	23	30	36—11	金	金木水火土[齐]	
庚戌	十八(22)	7	20	22	23	28	30	33—17	金	木火土	⊗金、水
丁巳	廿五(29)	9	14	21	25	26	28	29—27	土	金木水土	⊗火
甲子	初二(7)	(需预测)							⊗	? ?	

——如上述的箭头所示的平行对应，天干甲——?之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一五行属性对应的次数达2次；所以，天干甲与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五

行属性，即需要预测的甲子初二(7)的总体结构中一定有天干甲的五行属性：木。

例 5:某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:

.....

壬寅	初十(14)	4	7	10	17	23	28	34	—9	金	金	木	火	土	⊗水
己酉	十七(21)	4	8	12	17	28	30	33	—6	土	金	木	火	土	⊗水
丙辰	廿四(28)	1	4	12	20	21	37	32	—30	土	金	水	火	土	⊗木
癸亥	初二(5)	(需预测)				⊗	水	?	?						

——如上述的箭头所示的平行对应，新历(5)——?之前出现一个变化的明显临界点：连续出现同一五行属性对应的次数达 2 次，所以，新历(5)与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的癸亥初二(5)的总体结构中一定有新历(5)的五行属性：土。

例 6:某地 7/36 某阶段中奖号码的同名纳音[水]系统:

.....

乙卯	廿六(25)	3	5	10	12	18	22	25	—28	水	木	火	土	⊗水、金
壬戌	初四(1)	6	8	16	22	26	30	32	—14	水	木	水	火	土 ⊗金
丙子	十八(5)	1	4	19	23	31	33	35	—5	水	金	木	土	水 ⊗火
癸巳	初六(1)	2	5	10	18	24	28	32	—36	水	金	木	火	土 ⊗水
丁未	二十(15)	3	8	22	23	30	32	33	—25	水	木	火	土	⊗金、水
甲寅	廿七(22)	(需预测)				水	⊗	?						

——如上述的箭头所示的平行对应，纳音水——?之前出现一个变化的明显临界点：同名纳音系统中连续出现二次相同的

五行属性对应的次数达 2 次，所以，纳音水与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的甲寅廿七(22)的总体结构中一定有五行属性：水。

例 7：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

壬辰三十(4)	1	11	12	15	21	26	28—27	水	水木火土	⊗金
己亥初七(11)	2	7	11	13	19	21	22—24	木	金木水火	⊗土
丙午十四(18)	1	8	11	15	21	29	35—23	水	金木土水	⊗火
癸丑廿一(25)	8	9	17	22	27	29	33—23	木	木金火	⊗水、土
庚申廿八(2)	10	13	16	20	28	29	34—25	木	金木土水	⊗火
丁卯初六(9)	5	14	18	21	31	34	35—10	火	金木土水	⊗火
甲戌十三(16)	6	12	19	20	22	24	28—35	火	金木水火土[齐]	
辛巳二十(23)	3	6	16	17	18	25	30—19	金	木水火土	⊗金
戊子廿七(30)	2	14	21	22	23	27	29—32	火	金木水火	⊗土
乙未初五(6)		⊗ (需预测)							?	?

——如上述的箭头所示的等距离排列的平行对应，天干乙——？之前的第 2 位(相隔 1 期)等距离排列系统中出现一个变化的明显临界点：连续出现四次相同的五行属性对应的次数达 4 次，所以天干乙与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的乙未初五(6)的总体结构中一定有天干乙的五行属性：木。

例 8：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

	九宫星	相冲关系	总体五行	虚五行
己卯 廿二(16)	6	14 17 24 25 30 33—10	七赤 [金水][癸酉、乙酉]	金木水火土[齐]
丙戌 廿九(23)	1	4 8 10 26 30 34—8	九紫 [金水][庚辰、壬辰]	金木水土 ⊗火
癸巳 初七(30)	1	4 6 11 14 21 27—19	二黑 [土水][丁亥、乙亥]	金水火 ⊗木土
庚子 初四(6)	(需预测)		四绿 [金水][甲午、丙午]	? ?

——如上述的箭头所示的平行对应，九宫星四绿——?之前出现一个变化的明显临界点：连续出现2次相同的五行属性对应，所以，九宫星四绿与未知的虚五行之间就不会再出现相同的五行属性，即需要预测的庚子十四(6)的总体结构中一定有九宫星四绿的五行属性：木。

例9：某地传统型彩票中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

	纳音	相冲关系	总体五行	虚五行
己卯 廿二(16)	0	4 9 6 7 3—7	[金水][癸酉、乙酉]	金木水火土[齐]
丙戌 廿九(23)	1	0 7 5 3 1—2	[金水][庚辰、壬辰]	木水火土 ⊗金
癸巳 初七(30)	3	6 6 9 1 4—1	[土水][丁亥、乙亥]	金木水 ⊗火土
庚子 初四(6)	(需预测)		[金水][甲午、丙午]	? ?

——如上述的箭头所示的平行对应，开奖日干支的相冲关系的天干甲——?之前出现一个变化的明显临界点：连续2次出现同一五行属性的对应，所以天干甲与未知的虚五行之间相应的第三次的平行对应就不会再产生同一五行属性的对应，即需要预测的庚子十四(6)的总体结构中一定有天干甲的五行属性：木。

——如上述箭头所示的平行对应，相冲关系的干支纳音金

——之前出现一个变化的较明显临界点：连续 2 次出现同一五行属性的对应，但由于同类的“最高记录”标准是：连续出现 3 次，所以，对于这种“较明显临界点”还不能据此就作出肯定的相应的预测结论，这还应坚持“事应过三”的验证法则。

二、系统——虚五行预测法：

就是指在完善的、齐全的、期次足够多的干支数字信息载体总系统中，通过记录某一虚五行连续出现的次数，确认这种变化的临界点，根据临界点的变化前后不一样性而达到预测目的。

原则与方法：

①在正常顺序下的总系统中，对于几十选 7 的彩票，连续出现 3 次同一虚五行者；对于几十选 6 或传统型彩票，连续出现 4 次同一虚五行者；则可以认为出现一次变化的明显临界点，即相应的第 4 次或第 5 次就不会再出现同一虚五行。

②在其它各个分系统中，凡是连续出现 5 次同一虚五行者，则可认为出现一个变化的明显临界点，即相应的第 5 次不会再继续出现同一虚五行。

例 1：某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：

.....

丙午初八(23)	7	8	2	3	6	7—4	木水火	⊗金、土
癸丑十五(20)	0	1	6	0	9	4—2	金土水	<u>⊗木、火</u>
庚申廿二(9)	9	9	6	0	5	5—1	土金水	<u>⊗木、火</u>
丁卯廿九(16)	7	7	0	7	4	5—2	土金火	<u>⊗木、水</u>
甲戌初六(23)	2	6	7	1	2	0—4	土水火	<u>⊗木、金</u>
辛巳十三(30)						(需预测)	?	?

——上述未知的虚五行“?”之前出现一个变化的明显临界点:连续出现 4 次的虚五行⊗木,所以相应的第 5 次未知的虚五行就不会再存在“⊗木”,即需要预测的辛巳十三(30)的总体结构中就一定会有五行属性的“木”号码。

例 2: 某地传统型彩票某阶段中奖号码正常顺序下的总系统:
.....

										总体五行	虚五行
庚寅	廿六(5)	5	2	5	4	4	5	—	3	土金火	⊗木水
丁酉	初四(12)	2	5	1	1	1	2	—	0	土水火	⊗金木
甲辰	十一(19)	5	6	8	7	5	7	—	1	土水火木	→ ⊗金
辛亥	十八(26)	3	2	2	2	3	5	—	1	土木火	⊗金水
戊午	廿五(2)	2	2	0	6	2	3	—	8	木火水土	→ ⊗金
乙丑	初二(9)	2	2	7	4	0	4	—	5	土火金	⊗水木
壬申	初九(16)	7	7	1	2	1	2	—	7	水火	→ ⊗金土木
己卯	十六(23)	0	4	9	8	7	3	—	2	金木火土	⊗水
丙戌	廿三(30)	1	0	7	5	2	1	—	2	水土火	→ ⊗金木
癸巳	三十(7)	3	5	6	7	9	6	—	1	金木土水火	[齐]
庚子	初七(14)	7	3	1	2	1	5	—	4	木土水火	→ ⊗金
丁未	十四(21)	1	9	4	5	9	1	—	7	金土水	⊗木火
甲寅	廿一(28)	(需预测)				?					→ ⊗?

——如上述的箭头所示的等距离排列,未知的虚五行“?”之前出现一个变化的明显临界点:第 2 位的等距离排列出现连续 5 次的同一虚五行:⊗金,所以相应的第六次未知的虚五行

就不会再是“⊗金”，即需要预测的甲寅廿一(28)的总体结构中就一定有五行属金的号码了。

例 3：某地 7/36 某阶段中奖号码正常顺序下的总系统：
.....

壬寅十七(8)	2	4	11	15	20	27	36	—	32	土金水火	⊗木
己酉廿四(25)	6	10	13	21	33	35	36	—	5	木土水	⊗金火
丙辰初二(22)	1	10	14	23	26	31	31	—	8	金木土水	⊗火
癸亥初九(29)	4	6	10	11	14	33	33	—	2	金土水木	⊗火
庚午十六(5)										(需预测)	? ?

——如上述所示的虚五行记录符号中，未知的虚五行“？”之前出现一个变化的明显临界点：连续出现 3 次的虚五行：⊗火，所以相应的第四次未知的虚五行就不会再是“⊗火”，即需要预测的庚午十六(5)的总体结构中就一定会有五行属性的“火”号码。

[重要说明]

总体五行状态的准确预测，能为位置号码进行预测后交叉组合出来的小范围再进行一次“过滤”。比如交叉组合出来的预测号码内无某一五行属性的号码，但经总体五行状态预测后得知本期的总体结构内肯定有该五行属性的号码，则把不符合这一“指标”的组合就可以删除了。

第三节 中奖号码的总体结构的预测推算方法之总结

一、主题与主题类型的预测推算

系统——主题预测法：

●适用系统：所有系统。

●产生明显临界点的次数

最高记录为：—②—②—②—； —③—②—②—
 —②—③—②—； —②—②—③—(3次)
 次最高记录为：—②—③—； —②—②—；
 —③—②—； (2次)

——在三十几选7彩票中，最高记录为：

—⊗—⊗—⊗—⊗— (4次)

次最高记录为：—⊗—⊗—⊗— (3次)

二、标准参照系——主题平行对应预测法

(仅适用于正常顺序下的总系统)

1. 天干——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次(偶然间会出现5次)

2. 地支——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次(偶然间会出现5次)

3. 纳音——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次(偶然间会出现5次)

4. 九宫星——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次

5. 农历尾数——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次(极少出现4次)

6. 新历尾数——主题平行对应预测法：

●产生明显临界点的次数：3—4次(极少出现4次)

三、位置号码——主题斜线对应预测法

●适用系统：正常顺序下的总系统。

●产生明显临界点的次数：

1. 当记录符号连续 3 次出现“⊗”时；
2. 上一期同一位置号码与下一期的总体结构不产生主题对应的连续次数为 9 次时；
3. 上一期同一位置号码与下一期的总体结构产生主题对应的连续次数为 8 次时；

4. 对同一位置的记录符号进行等距离排列对比：

当主题对应记录符号三轮完全一致时；

当单个记录符号(指“正”或“反”或“⊗”)出现四次完全一致时；

四、副码——主题对应预测法

●适用系统：正常顺序下的总系统。

1. 副码——主题连续对应预测法：

●产生明显临界点的次数：

当上一期的一个或二个副码尾数能与下一期中奖号码产生主题对应，这种对应连续达 7 次时；

2. 副码——主题间隔连续对应预测法：

●产生明显临界点的次数：

当上一期的副码能与下一期中奖号码产生主题对应，但其中间期次碰上全主题者(即无副码)，如此这种情形达到 7 次时；

3. 同副码母——子主题轨迹对应预测法：

●产生明显临界点的次数：已知“子”(指总体主题)是一致且达 4 次时。

五、同缩写主题母——子轨迹对应预测法

{ ●适用系统：正常顺序下的总系统。

{ ●产生明显临界点的次数：

1. 已知“子”的缩写符号完全一致且达 2 次时；
2. 已知“子”连续 4 次均是主题时；
3. 已知“子”的记录符号是“⊗”且连续达 2 次时。

六、系统——主题类型预测法

{ ●适用系统：正常顺序下的总系统。

{ ●产生明显临界点的次数：同一主题类型连续出现 4 次时；

{ ●适用系统：在各个分系统中(除等距离排列系统和号码等距离环环相比系统外)

{ ●产生明显临界点的次数：同主题类型连续出现 3 次时；

{ ●适用系统：等距离排列系统、号码等距离环环相比系统；

{ ●产生明显临界点的次数：同一主题类型连续出现 4 次时；

七、标准参照系——虚数型预测法

1. 天干——虚数型生克轨迹对应预测法；

2. 地支——虚数型生克轨迹对应预测法；

3. 纳音——虚数型生克轨迹对应预测法；

4. 九宫星——虚数型生克轨迹对应预测法；

5. 农历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法；

6. 新历尾数——虚数型生克轨迹对应预测法；

{ ●适用系统：正常顺序下的总系统；

{ ●产生明显临界点的次数：

相刑为 2 次——平行对应时；

相刑为 3 次——斜线对应时；

同一方向相生或相克达 4 次——平行对应或斜线对应时。

{ ●适用系统：各个分系统；

{ ●产生明显临界点的次数：

相刑为 3 次——平行对应时；

相刑为 4 次——斜线对应时；

同一方向相生或相克达 5 次——平行对应或斜线对应时。

八、系统——虚数型预测法

对于三十几选 7：

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统。
- { ●产生明显临界点的次数：同一虚数型或符号连续出现 3 次时；
- { ●适用系统：各个分系统：（除等距离排列系统和号码等距离环环相比系统外）；
- { ●产生明显临界点的次数：同一虚数型或符号[齐]连续出现达 4 次时；

- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临点的次数：记录符号连续出现 3 次为两个虚数型时；
- { ●适用系统：等距离排列系统和号码等距离环环相比系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一虚数型连续出现达 5 次时；

对于四花选 4 彩票：

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一虚数型连续出现 4 次时；
- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一虚数型连续出现 5 次时；
- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：记录符号连续出现 3 次为两个虚数型时。

- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临界点的次数：记录符号连续出现 5 次为两个虚数型时。

九、位置——数型预测法 （以三十几选 7 为例）

1. 前段数型位置预测法:

- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 前段数型“00”连续出现 3 次时;
- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 前段数型“01”连续出现达 5 次时;
- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 前段数型是“11”或“02”或“12”连续出现 2 次时;
- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 前段数型是“13”或“22”出现 1 次时。

2. 后段数型位置预测法:

- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 前段数型是“44”连续出现 5 次时;
“34”连续出现 4 次时; 最后一位
数型是“3”且连续达 2 次时。

十、标准参照系——配伍生克轨迹对应预测法

1. 农历尾数——配伍生克轨迹对应预测法;

2. 新历尾数——配伍生克轨迹对应预测法;

- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 农历或新历尾数与配伍(进行平行对应)是一致达 1 次时;(即尾数相同)
- { ●适用系统: 各个分系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 农历或新历尾数与配伍(进行平行对应)是一致达 2 次时。
- { ●适用系统: 正常顺序下的总系统;
- { ●产生明显临界点的次数: 农历或新历尾数与配伍进行生克

关系的平行对应，相生或相克或相刑关系达到5次时(不讲方向!)。

3. 天干——配伍生克轨迹对应预测法；
4. 地支——配伍生克轨迹对应预测法；
5. 纳音——配伍生克轨迹对应预测法；
6. 九宫星——配伍生克轨迹对应预测法。

- 适用系统：正常顺序下的总系统；
- 产生明显临界点的次数：天干/地支/纳音/九宫星与配伍进行生克关系的平行对应，同一方向的相生或相克或相刑关系达3次时。

十一、标准参照系——前段配伍生克轨迹对应预测法和标准参照系——后段配伍生克轨迹对应预测法

1. 农历尾数——前段或后段配伍生克轨迹对应预测法；
2. 新历尾数——前段或后段配伍生克轨迹对应预测法；

- 适用系统：正常顺序下的总系统。
- 产生明显临界点的次数：农历或新历尾数与前段或后段配伍(进行平行对应)是一致达1次时,(即尾数相同)。

- 适用系统：各个分系统；
- 产生明显临界点的次数：农历或新历尾数与前段或后段配伍(进行平行对应)是一致尾数达3次时。

3. 天干——前段配伍或后段配伍生克轨迹对应预测法；
4. 地支——前段配伍或后段配伍生克轨迹对应预测法；
5. 纳音——前段配伍或后段配伍生克轨迹对应预测法；
6. 九宫星——前段配伍或后段配伍生克轨迹对应预测法。

- 适用系统：正常顺序下的总系统；
- 产生明显临界点的次数：天干/地支/纳音/九宫星与前段或

后段配伍进行生克关系的平行对应，相生或相克或相刑关系为同一方向，达 5 次时。

十二、配伍间垂直对应预测法

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：尾数上下相同达 1 次时(即自刑)；或相刑达 2 次(同刑、自刑混合)：

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一方向的相生或相克或相刑关系轨迹对应达 3 次时。

十三、前段配伍或后段配伍间垂直对应预测法

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：相刑达 3 次时，(尾数可以完全相同)
- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临界点的次数：相刑达 4 次时。
- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一方向的相生或相克关系轨迹对应为 3 次时。
- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临界点的次数：同一方向的相生或相克关系轨迹对应为 4 次时。

十四、系统——总体五行状态预测法

- { ●适用系统：正常顺序下的总系统；
- { ●产生明显临界点的次数：某一总体五行状态名称连续出现 2 次时。
- { ●适用系统：各个分系统；
- { ●产生明显临界点的次数：某一总体五行状态名称连续出现

3 次时。

十五、标准参照系——虚五行平行对应预测法

1. 天干——虚五行平行对应预测法；
2. 地支——虚五行平行对应预测法；
3. 纳音——虚五行平行对应预测法；
4. 九宫星——虚五行平行对应预测法；
5. 农历尾数——虚五行平行对应预测法；
6. 新历尾数——虚五行平行对应预测法；

- 适用系统：正常顺序下的总系统；
- 产生明显临界点的次数：天干/地支/九宫星——虚五行进行平行对应，连续 2 次出现同一五行属性对应。

- 适用系统：正常顺序下的总系统；
- 产生明显临界点的次数：纳音/农历尾数/新历尾数——虚五行进行平行对应，连续 3 次出现同一五行属性对应；

(说明：上述的天干/地支/纳音包括开奖日的相冲关系之天干、地支、纳音)

- 适用系统：各个分系统(除同名纳音系统)；
- 产生明显临界点的次数：
天干/地支/九宫星/农历尾数/新历尾数——虚五行进行平行对应，连续出现四次同一五行属性对应时。

- 适用系统：同名纳音系统。
- 产生明显临界点的次数：纳音——虚五行进行平行对应，连续出现 2 次同一五行属性对应时；

十六、系统——虚五行预测法

- 适用系统：正常顺序下的总系统。
- 产生明显临界点的次数：连续出现 3 或 4 次同一虚五行时。

- 适用系统：各个分系统
- 产生明显临界点的次数：连续出现 5 次同一虚五行时。

[重要说明]

不同游戏规则下的彩票，不同地方(由不同摇奖机摇出的中奖号码)的彩票，在运用各种预测方式和预测方法去预测推算时，必须依据该只彩票的同一类变化现象的“最高记录”的标准去识别变化的明显临界点！有时候，根据具体的、实际的情形对产生变化的明显临界点的具体次数可以“微调”，并不一定要“硬套”本书上述所阐明的各类“次数”；但是万变不离其宗，任何一只彩票，只要按照本书，所介绍的预测方式和预测方法去“炮制”和“依样画样”则就能解决问题，就能达到准确的预测目的！

不变应万变——预测原理，预测方式，预测方法是(相对)不变的！

以变应变——判断、识别各种变化的明显临界点的具体次数可以“随机应变”！

应变——就是见机行事，具体问题具体分析，明显者用之，不明显者弃之！

第九章 彩票中奖号码预测的术语、 符号、名词之归纳与解释

彩票中奖号码预测，作为一种方法，为了便于广大彩民的使用，特立此章节。

●⊗——表示不相等，不成立，不对称，不对应，不可能，不相生，不相克，不相刑，消失的，虚的意思，等等。

●[1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7]、[8]、[9]、[0]——表示所有数字或中奖号码具有相同尾数的缩写。凡是具有相同尾数的号码均当作成为同一性质，同一类的号码。

●[1·9]、[2·8]、[3·7]、[4·6]、[5·0]——表示数字或中奖号码依特定配搭关系而形成的主题，任何数字均可以划分为五大主题之一。[1·9]主题定性属水；[2·8]主题定性属火；[3·7]主题定性属木；[4·6]主题定性属金；[5·0]主题定性属土。

●金、木、水、火、土——表示开奖日的干支、纳音、九宫星、农历、新历数字和中奖号码等依照阴阳五行理论所规定的事物间具有某种相同的、类似的特征和属性之抽象归类。它并不代表具体五种物质；只用来反映万物万事间的一种共同属性。

●[3][8]、[2][7]、[1][6]、[4][9]、[5][0]——表示任何数字尾数(包括号码尾数)与五行金木水火土挂钩对应后的分类归纳：木=[3, 8]，火=[2, 7]，水=[1, 6]，金=[4, 9]，土=[5, 0]

●初一、初二、初三、初四、初五、初六、初七、初八、初九、初十；十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十；廿一、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、三十——中国农历的记时数字，在预测应用过程中，只考虑其尾数值和尾数对应的五行属性，可以把它当作为一个已知的标准号码。

●甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸——十天干依次排列的名称，在预测中奖号码的过程中，它们是具有广泛涵义的信息数字载体，具体应用它们的五行属性为预测服务。可以把它当作成一个已知的标准参照物。

●子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥——十二地支依次排列的名称，在预测中奖号码的过程中，它们是具有广泛涵义的信息数字载体，具体应用它们的五行属性为预测服务，可以把它当作成一个已知的标准参照物。

●一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤、八白、九紫——九宫星依次排列的名称，在预测中奖号码的过程中，它们是具有广泛涵义的信息数字载体，具体应用它们的五行属性或名称的数字为预测服务，可以把它当作为一个已知的标准参照物。

●甲子、辛未、戊寅、乙酉、壬辰……——天干与地支依一定的规律互相匹配形成干支，干支共有 60 对，它们之间的排列顺序是依次不变和循环的，这 60 对干支组成“六十花甲。”

●纳音(金木水火土)——天干与地支互相匹配后所形成干支的五行属性；60 对干支的五行属性(即纳音)是固定不变，它们与 60 对干支的名称共同组成“六十花甲纳音”一览表。在预测中奖号码过程中，它们是具有广泛涵义的信息数字载

体，具体应用它们的本身的五行属性为预测服务。可以把它当作成一个已知的标准参照物。

●相冲关系——[在彩票中奖预测的具体应用方面，只是利用开奖日的干支所对应的相冲关系的干支及其纳音作为标准参照物]是阴阳五行理论中的一种特定关系：指干支与干支间、天干与天干间、地支与地支间存在的一种互相“冲突、对立、制衡”的对应。干支与干支间的相冲关系是固定不变；每一对干支是固定与两对干支(依先后顺序)产生相冲关系；第一对干支是正相冲干支，第二对干支是次相冲干支。

●相冲岁数——[在阴阳合历或通胜日历中均有表示出每一日的相冲岁数]每日的干支与其正相冲的第一对干支形成相冲关系，由于日历的干支是用来记年、月、日、时的，所以当日正相冲干支所对应的“年龄”就是相冲岁数。日历中的相冲岁数是由10开始，至69后又循环。在预测中奖号码应用方面，只是利用其数字的尾数值和其对应的五行属性去为预测服务。可以把它当作为一个已知的标准号码。

●平行对应——指在系统内，两者间在同一水平线上进行的对应。

●垂直对应——指在系统内，同一位置的号码间进行上下关系垂直方向的对应。

●斜线对应——指在系统内，不在同一水平线上的两者间进行对应，对比的两者间用直线联结起来后直观地形成斜线，故称斜线对应。它包括左斜线对应，右斜线对应。

●同母——子轨迹对应——以需要预测的对象作为未知子，以上一期的号码或名称或组合或符号作为母，两者间联结起来形成母——子轨迹对应；在系统内，往上在同等位置上找出若干对的同母——子轨迹对应，通过对比已知子的异同而

去预测推算未知“子”。

●等距离——指在系统内，期次间相隔的距离是彼此一致；或者指号码间进行对应时若干对号码间对应均是在同等的位置上进行，直观上形成“等距离”。

●环环相比——指在系统内，前面的依次排列的期次和后面依次排列的期次进行等距离的配对，配对后再依顺序排列，可以进行相应内容的对比；这种前后等距离的若干期次配对之比较，形成环环相比。

●临界点——指各种变化由量变到质变，由某种状态转换到另外一种状态，或由某一数值转换到另一数值的边缘阶线。临界点又称转折点，它的存在是不以人的主观意志为转移的，不论你发现与否，它都客观地存在着的。

●明显临界点——指在系统内，各种变化的过程有一个渐变的过程，容易令人识别其产生突变时的阶线，这种转折点，称为明显临界点。

●最高记录——指在系统内，已经发生的、曾经出现的同一类，同一种变化现象或状态或数值连续出现的最高次数。当然，系统内的期次要足够多(至少要1年以上的开奖号码)。

●次最高记录——指在系统内，已经发生的、曾经出现的同一类，同一种变化现象或状态或数值连续出现的仅次于最高记录的次数。

●相生、相克(相刑)——阴阳五行理论中所规定的万事万物间互相联系的特有规律。在彩票中奖号码预测应用方面，是指系统内的中奖号码(包括已知的、未知的)与干支、纳音、九宫星、农历尾数、新历尾数、相冲岁数(尾数)间，或者号码间进行各种对应联系时发生的三种关系。

●次数——①指在预测过程中，运用各种预测方法时，若

干对两种事物或两个数字间进行某种对应联系时，产生相生或相克或相刑关系的连续次数；②在系统内，某一类号码连续出现的次数；③在系统内，中奖号码的总体结构连续出现的次数；④在预测过程中，系统内的记录符号连续出现的次数；⑤在预测时，经过数学方法处理后的数值连续出现的次数。判断和识别“次数”，是确认变化的临界点的重要依据。

●方向——两者间进行五行生克关系的各种对应时产生的特有方向：谁生谁，谁克谁，均各自产生两种不同的方向。判断和识别“方向”，是确认变化的临界点的重要依据。

●等值对应——①在预测过程中，号码间或号码与标准参照物间运用数学方法处理后得到的数值(或尾数)：其与某相应的位置号码尾数是一致的，这过程称为等值对应；②若干对两者间之和或之积的尾数值均是一致的，这过程也称为等值对应。

●位置号码——中奖号码由小到大或由左到右依次序横向排列形成各个位置号码，有多少个号码，就相应有多少个位置，从某种意义上说，位置即号码，号码即位置。特别号码往往独立预测推算，或单独考虑和处理。

●正常顺序——是指每周固定日开奖一次所摇出的中奖号码的期次依先后排列的顺序。正常顺序从时间上而言就是逢每7天(相隔6天)开奖一次的期次顺序。

●开奖期次顺序——不论每周开奖2次或3次，把每次摇奖的开奖号码依次排列出期次，即是彩票发行机构对外公布的期次顺序。开奖期次顺序相对于“正常顺序”而言，实质上是“混合顺序”。

●轨迹对应——指在预测过程中，若干对两者间进行某种关系或某种方式对应时的过程。

●系统——是指为了充分满足中奖号码的预测需要而科学地分类形成各种信息数据库。本书所说的总系统是正常顺序下的干支数字信息载体总系统的简称；分系统包括：干支系统、农历系统、新历系统、纳音系统、主题系统、数型配伍演变系统、五行属性演变系统、五行结构演变系统、主题结构演变系统、等距离排列系统、号码等距离环环相比系统、生肖码演变系统、主题类型演变系统、奇偶性演变系统等等。

●副码——开奖号码的总体结构中除去能构成主题配搭关系后所剩余的号码；副码实质上就是主题号码的“一半”。

●标准主题——指在中奖号码的结构中，凡是由两个号码组成的某一主题均可通称为标准主题。

●主题类型——是指开奖号码内主题组合的个数以及其中能构成主题的号码之个数。可划分为：单主题、双主题、三主题、全主题、无主题。

●主题类型的记录符号——

I. 〈1〉——标准单主题；主题仅由两个号码组成。

〈1〉 + 1——单主题；主题是由一个的三个号码单独组成。“+1”者即在标准主题的基础上加多一个号码。

〈1〉 + 2——单主题；主题是由一个的四个号码单独组成。“+2”者即在标准主题的基础上加多二个号码。

〈1〉 + 3——单主题；主题是由一个的五个号码单独组成。“+3”者即在标准主题的基础上加多三个号码。

II. 〈2〉——标准双主题；主题是由两个标准的单主题共

同组成。

〈2〉 + 1——双主题；主题是由一个的标准单主题和一个的由三个号码构成的主题共同组成。

〈2〉 + 1 + 1——双主题；主题是由二个的三个号码构成的主题共同组成。

〈2〉 + 2——双主题；主题是由一个的标准单主题和一个的四个号码构成的主题共同组成。

〈2〉 + 2 + 1——双主题；主题是由一个的三个号码构成的主题和由一个的四个号码构成的主题共同组成。

Ⅲ. 〈3〉——标准三主题；主题是由分别三个标准的单主题共同组成。

〈3〉 + 1——三主题；主题是由 2 个标准的单主题和一个的由三个号码构成的主题共同组成。

Ⅳ. 无主题——中奖号码内的结构全都是副码，没有主题。

●实主题——指在中奖号码结构内已经出现的主题。

●虚主题——指在中奖号码结构内不存在的、消失的主题。

●实五行——指在中奖号码结构内已经出现的五行。

●虚五行——指在中奖号码结构内没有出现的、消失的五行。

●实数型——指在中奖号码结构内已经出现的数型。

●虚数型——指在中奖号码结构内没有出现的、消失的数型。

●配伍——把每个位置号码的尾数全部相加之和的尾数就是配伍。配伍共有等 10 个“数”，[0]、[1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7]、[8]、[9]，尾数值的五行属性就是配伍的五行属性。

●前段数型——开奖号码中前面两个位置的数型。

●后段数型——开奖号码中后面两个位置的数型。

●中段数型——去除前段、后段数型外所剩下的中间位置的数型。

●前段配伍——前面四个或三个位置的配伍。

●后段配伍——后面三个位置的配伍。

●总和数值——每个中奖号码的数值全部相加，所得之和。

●相连号——号码数字依自然排列的顺序前后相连。

●相同号——不同期次的开奖号码中存在着完全一样的号码。

●单数和双数——指彩票号码中的奇数号码和偶数号码。含有 1, 3, 5, 7, 9 的尾数者均称为单数(简称单)；含有 2, 4, 6, 8, 0 的尾数者均称为双数(简称双)。

●小周期——正常顺序下的每十二期作为一个小周期，以便和十二地支的循环相对应。

●大满贯——正常顺序下的 60 期作为一个大满贯，以便和“六十花甲”的循环相对应。

●生肖码——指在彩票中奖号码的预测过程中，把游戏规则下的各个号码分别与当年农历的“生肖岁数”进行对应，即“生肖岁数”就是号码数，该号码数的生肖名就与该岁数的当年生肖名互为一致，这就形成了“生肖码”。生肖码的名称随着每年的“岁数”改变而相应改变。

●正——表示与某期次的中奖号码尾数相同或与开奖日的农历尾数、新历尾数相同时的记录符号。

●反——表示与某期次的中奖号码尾数不一致但能与之构成主题者时的记录符号。

●[齐]——①表示中奖号码内的主题和副码均包含有五大主题和副码时的记录符号；②表示中奖号码内的数型均包含有

五大数型在内时的记录符号；③表示中奖号码的总体五行状态为“金木水火土”时的记录符号。

●“*”——表示开奖日的天干或地支或纳音或九宫星与开奖日的位置中奖号码间进行平行对应能产生主题对应时的记录符号。

●(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(26)、(27)、(28)、(29)、(30)、(31)——新历的记时数字，在预测应用过程中，只考虑其尾数值和尾数对应的五行属性，在系统内可以把它当作成一个已知的标准号码。

●“①”、“②”、“③”——指上下期次间的主题进行对比时相同的个数之记录符号。

●纯主题和杂主题——凡是全部由尾数是一致的号码构成的主题称为纯主题；凡是其中由尾数不相同但又能互相构成主题的号码组合而成的主题称为杂主题。

●标准参照系——由各个标准参照物组成，指在彩票中奖号码的预测过程中，把开奖日的天干、地支、纳音、九宫星、农历尾数、新历尾数、相冲岁数(尾数)或已知的开奖号码当作成未知的中奖号码的数字信息载体；未知的中奖号码与这些载体间进行五行属性或数值的各种对应而产生各种变化状态；通过记录这些变化状态的轨迹过程，确认其变化的临界点，根据变化前后的不一样性而达到预测目的。由上述各个数字信息载体共同构成了彩票中奖号码预测学的标准参照系。标准参照物其本身的排列组合具有固定的变化规律。

第十章 关于提高中奖号码预测准确率 的应用策略的分析

第一节 关于提高和确保中奖号码预测准确率之分析

由于人们在认识客观世界过程中形成的主观世界的反映，既可基于感性，也可基于理性，所以反映性预测可以划分为感性预测与理性预测。感性预测，通俗地说就是：因预感而生“预言”。感性预测与理性预测的本质区别在于：前者有果无因，后者则果出有因。而感性预测与理性预测的主要差异是：在因果之间，前者缺乏内在的纽带，后者却有逻辑性联系，存在着量变到质变的过程。由此可知，理性预测重视因果关系，注意因果分析，从而使之有可能在一些预测行为过程中显示出其卓越的准确性。

理性预测的支点在于思维的逻辑性，但逻辑性并不等于真实性和正确性。为了保证判断的真实与正确，除了强调论述的逻辑性外，更强调结果的实证性。只有经过实践或实验的证明，才能作出自己的定论。根据大量的、已知的、同类的中奖号码去预测推算未知的开奖号码属于理性预测，彩票中奖号码预测所提倡的正是“实证”预测。

当前，从天文、气象乃至军事、经济、金融等各个领域，以实证分析(数理统计)为基础的预测方法已经不下百余种，但万变不离其宗。其基本要义全在于因果解析，即通过

总结研究过程中引起事物变化的各种因素及其相互关联的程度，建立起一定的物理数学模型，进而选取已知或假设的有关变数，推导出代表未来过程趋势发展的“函数”。用一句话来归纳，即：“以因之变求果之异”。

感性预测也罢，理性预测也罢，终究只是对未来的某种可能的描述，而描述属于主观认识范畴，它可以通过对大量的“因”的分析有时会得出完全正确的“果”，有时会得出比较正确的“果”，也有时会得出错误的“果”。又例如现在世界各国的股市中大都采用“技术分析”的方法来预测股市股票。所谓“技术分析”是指直接对证券市场的市场行为所作的分析，其特点是通过对市场过去和现在的行为，应用数学和逻辑上的方法，归纳总结一些典型的行为，从而预测证券市场的未来的变化趋势。然而令人十分遗憾的是，用“技术分析”的方法预测股市股票，正确率最高仅为 52%，因为股市盛行的这种“技术分析”只能对过去的（而非未来的股票的涨跌趋势）数字进行归纳整理，然后依靠“走势图”，从技术面、基本面两个层面入手，对未来股市进行推测。尽管从表面上看来应用了数学逻辑性推理和归纳总结的方法，但实质上是一种简单的经验性的概率推测。也可以说是一种用科学包装了的“猜测术”而已。为什么股市股票的预测正确率最高仅达 52% 呢？因为影响和左右股市股票的已知因素和未知因素实在太多 根本无法通过“技术分析”而真正掌握其产生变化的“临界点”。变化的“临界点”不能准确地把握，也就不难理解所作出的各种预测结果的正确性了。

彩票中奖号码预测一书，倡导把大量已知的中奖号码进行分类，立足变化，持道据理，剖析因果，紧紧地抓住变化的明显临界点以预测未知的中奖号码。

我们已经知道，变化万千的中奖号码在出没的过程中，表面上的现象变化和隐蔽的实质变化，其临界点并不是全都“明显”或全都“不明显”，只有通过分类，通过各种有效的“技术处理”，才能发现和识别出真正的变化临界点。比如某一项预测内容，某一个位置号码，在预测过程中，这种预测方式找不到“明显临界点”，则通过另一种方式或渠道再去寻找其“明显临界点”，这种方法无能为力了，则又实施另一种方法去预测它。所以，彩票中奖号码预测要建立众多的系统，同一预测内容需要多种多样的预测方法。

彩票中奖号码预测的过程，可以说是搜索、挖掘、识别和确认各种变化的明显临界点的过程。能准确地确认出变化的临界点，就等于可以得出相应的准确的预测结果。

从理论上而言，中奖号码的预测结论的准确性和精确度不外乎在于两大因素：一是制定识别变化的明显临界点的标准，二是根据标准搜索和确认变化的明显临界点。

通过长期的、大量的系统数据分析可知，各种变化的临界点极难突破它的同类变化之“最高记录”，而符合轨迹“最高记录”为变化过程者往往很少或较少出现，相对而言，较多出现的往往均是符合“次最高记录”标准，所以，在预测中奖号码的具体过程中，若全部采用同类变化的“最高记录”之标准去识别变化的临界点，能符合“最高记录”过程标准者当然是明显的临界点，据此相应作出的预测结论可以说是靠得住的，准确率几乎达100%；在实际的过程中，若全部采用“最高标准”去识别变化的明显临界点，则最后的预测范围即精确度就会较大。一般情况下，太大的投注额普通大众彩民是承担不了的。因而，在预测过程中，还是需要应用同类变化的“次最高记录”去识别临界点，据此相应作出的预测结论大多数是

靠得住的，准确的，但往往有时“运气不佳”时会产生若干个“最高记录”而导致预测失误，若碰巧遇上某项关键的预测内容出错，则导致全盘预测的“价值尽失”。这就是预测的准确性和预测精确度的现实矛盾。

怎么办，怎么解决？这就需要通过一些预测方法去对付它：

一、为了保证所得出的最后预测结论是准确的，必须坚持“事应过三”的验证法则，尤其是采用“次最高记录”的标准去识别变化的临界点时——即是说，这个结论还须得到其它不同方式、不同渠道的相同的预测结论来互相验证、互相证实其可靠性。只有若干次同一预测结果均是一致时才能认为一预测结论是准确的。原则：宁缺勿滥。

二、在位置号码的具体预测上，对于第一个位置号码和最后一个位置号码的预测，所采用的标准尽量用“最高标准”去识别同类变化的明显临界点。第一个位置号码和最后一个位置号码的准确预测具有特别的重要意义：对于乐透型彩票，一个是最小码，二个是最大码，两者作为“前后门”把中间的号码挤压在有限的“空间”，这对于减少号码间的排列组合可以起到自然的约束作用。

三、中间的位置号码可以采用“次最高记录”标准去识别变化的临界点，而有关总体结构上预测比如数型配伍，主题与主题类型，总体五行状态、单双数等等一定要尽量地用“最高记录”的标准去衡量同类变化的明显临界点，目的就是要最大程度地去保证总体性的预测结论是准确的。因为位置号码的各项五行属性或尾数的预测范围可以适当放宽(放宽目的也是要最大程度地确保准确性)，经预测处理后的各个位置号码把其相应的预测范围全部交叉排列组合出来，这些排列组合的结果

就要依靠准确的总体性的预测结论去过滤、提纯。若总体性的预测结论不确保是准确的，则就“对不住”位置号码的准确预测了。换句话说，位置号码的准确预测就毁在不准确的总体性预测身上了。因此，为什么特别反复强调“宁缺勿滥，明显者用之，不明显者弃之”的原因就不言而喻了。

四、为了保证各项预测方式、预测方法的功能地发挥出其相应的预测作用，彩民们必须花力气、认真地、详细地建立本书所介绍的各个系统或各种变化现象的对比的记录一览表，只有中奖号码的信息数据库足够多，才能挖掘更多的变化的明显临界点；越多的明显临界点被准确地识别和确认，则就越能根据准确的预测结论去排除或者肯定更多的位置号码和总体结构，这样的最终结果更能大范围地提高预测中奖号码的预测精确度。正所谓一分耕耘一分收获，千方百计地挖掘出更多的明显临界点，则预测的精确度就有保证：不会产生太大的预测范围，从而投注额就不会太高。

在预测的具体过程中，在面对众多的系统之数字信息时，如何令其“物尽其用”呢？即充分发挥出其应有的准确的预测作用？可以采取：具体问题具体分析，严谨与灵活的原则处置。

正如中国的伟人邓小平所说的一句名言：不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。只要能正确地识别和确认出某种变化的临界点从而得出相应的准确的预测结果，不管什么方式或方法均可以。有时候，最简单、最直接的预测方法是妙法！长期的实践是提高和确保预测中奖号码准确性和精确度必不可少的过程。熟能生巧也。

第二节 中奖号码预测推算在实践中的应用策略

彩民若已对本书的前面章节进行过初步或深入的研究后，心中自然在盘算，在实际预测的投注过程中，如何能做到最好？如何做才算最合理？如何安排时间去预测和根据自己的经济能力去投注？毕竟中奖号码的准确预测是需要花费一定的时间的，同时，预测结果出来后，依预测范围去投注的话，自己的经济能力能否承受起相应的风险？这是必须考虑的。经济能力好，则把预测推算的范围即精确度适当扩大（这具体做法主要是更多地采用“最高标准”之识别变化的明显临界点，从而会导致其中一些预测内容或位置号码无法最大量地排除。）

所以，在日常实际的预测中奖号码过程中，适当的应用策略是必须讲究的，同时也因人而异。

下面介绍几种在预测和投注实践中的策略：

●一般而言，购买彩票的开支最合理的比例是1%—5%，即按每个家庭的年收入来算。

●正常情况下，运用本书的各种方式的预测方法去全面地、全方位地进行预测推算某一只彩票所耗费的时间大致上需要“正常生活时间”五天。所谓正常生活时间，就是指白天上班，下班后还应做点家务的空余时间。

●（在深入学习和研究本书的预测方法，并经过一段时期的实践或模拟实践后）不求每次能中大奖，只求每次能中小奖；遇上机会时（即恰好碰上该期次出现十分多的明显临界点时！）但求能中一次大奖。

一、完全综合预测型

既重视每一个位置号码的个体预测，又重视所有总体结构的预测推算，最终的投注排列组合范围是经过全面的、全方位

的预测推算。

要求：

●有充沛的赋闲时间，持之以恒的毅力和坚定的自信心。

●必须建立齐全的、完善的、期次足够多的系统(数据库)

以及预测过程各种对应关系的记录一览表。

●熟练和灵活地运用本书所介绍的各种预测方式和预测方法。

●根据自身的经济投注能力调整采用“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点的方式或具体做法。

好处：

既保证预测的精确度和一定的或相当的准确性，又不浪费不必要的金钱去投注；投注不会落空，不会无收获，假以时日，必中大奖。

缺点：

费时。

二、追求大奖综合预测型

在预测推算过程中，无论是个体位置的预测还是总体结构的推算，以严谨的态度，处处均采用同类变化的“最高记录”之标准去识别和确认各种变化的明显临界点。宁缺勿滥，力求保证所有相应的预测结论全是准确的。

要求：

●某段时期：需要足够的预测推算时间；超凡的自信心和毅力、魄力。

●经济实力雄厚，能轻松地承担一旦投注不能“全中”或失败带来的一切负面影响与结果。经济实力是指合法的、真正属于自身的经济财产。

●必须建立齐全的、完善的、期次足够多的系统(数据库)以及预测过程各种对应关系的记录一览表。

●熟练地运用本书所介绍的各种预测方式和预测方法。

好处：

能保证所得出的预测范围及结果几乎是 100% 准确，投注不会落空，必然会中奖；至于中大奖，尤其是头奖的机会极高。

缺点：

费时和投注额太大，一旦投注的结果不能“全中”或几乎“没中”，则经济损失比较大或相当大。

(注：采用这种预测方式，每次投注额大约几万元至几千元不等。)

三、单纯预测位置号码型

全力以赴地注重每一个位置号码的预测推算，其它所有的总体结构的内容均不去预测。从理论上而言，若每一个位置号码的预测范围均是正确的话，把其预测范围内的位置号码全部交叉排列组合出来，其结果当中就当然会有全中的开奖号码。

要求：

●有较多的赋闲时间，持之以恒的毅力和坚定的自信心。

●必须建齐全的、完善的、期次足够多的系统(数据库)以及预测过程各种对应关系的记录一览表。

●熟练和灵活地运用本书所介绍的各种预测方式和预测方法。

●根据自身的经济投注能力调整采用“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点的方式或具体做法。

好处：

节省了不少时间；预测后小范围的精确度和一定的或相当的准确性是有保证的；(而这点往往跟自身经济投注能力的挂钩有很大的关系)假以时日，必中大奖。

这种应用策略特别适用于传统型彩票和四花选 4 的预测。

缺点：

未能充分发挥总体结构的各项预测作用。

四、单纯预测总体结构型

全力以赴地注重总体结构的每一部分、每项内容的预测推算，力求在总体的把握上对未知的开奖号码进行推测，至于每个位置号码的内容均不去预测推算。这种类型比较适合社会上所谓的“复式投注”法。

要求：

- 有较多的赋闲时间，持之以恒的毅力和坚定的自信心。
- 必须建立齐全的、完善的、期次足够多的系统(数据库)以及预测过程各种对应关系的记录一览表。

●熟练和灵活地运用本书所介绍的各种总体结构的预测方式和预测方法，尤其要充分发挥五行结构演变系统和主题结构演变系统的综合预测作用。

●根据自身的经济投注能力调整采用“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点的方式或具体做法。

好处：

节省了不少时间；预测后小范围的精确度以及一定的或相当的准确性是有保证的(而这往往跟自身经济投注能力的挂钩有很大的关系)，假以时日，必中大奖。

比如可以考虑运用复式投注法(即包号投注)，具体包多少号码合适和合理则根据预测后的最终结论而定。

缺点：

未能充分发挥位置号码的预测作用；要求彩民的经济能力较佳。

五、半完全综合预测型

针对乐透型彩票全力以赴地预测第一个位置和最后一个位置号码以及特别号码，力求这二个或三个号码能正确；至于其

它几个位置号码则不去理会和预测。而对于总体结构的预测同样注重每项内容的推算。

要求：

●有较多的赋闲时间，持之以恒的毅力和坚定的自信心。

●必须建立齐全的、完善的、期次足够多的系统(数据库)以及预测过程各种对应关系的记录一览表。

●熟练和灵活地运用本书所介绍的各种预测方式和预测方法。

●根据自身的经济投注能力调整采用“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点的方式或具体做法。

好处：

节省了部分时间，预测后小范围的精确度和一定的或相当的准确性是有保证的(而这往往跟自身经济投注能力的挂钩有很大的关系)，假以时日，必中大奖。

六、“守株待兔”预测型

经认真统计分析后仅选择这只彩票最热的主题类型和最常见的数型配伍，同时，选定某两个主题的具体号码和副码(当然历史上未曾出现过同样的全部号码)去固定配搭，期期均重复投注这几组号码，风雨不改，直至中大奖为止。

要求：

●建立齐全的、完善的、期次足够多的正常顺序下的总系统。

●花1—2周时间对本只彩票的主题类型、数型配伍以及主题间的配搭进行一次突击性、全面性的统计分析，得出正确的结论：找出最热的主题类型和经常反复出现的数型配伍；找出和选定某两个不冷不热的主题配搭的具体号码及其副码，按照上述的主题类型、数型配伍去排列组合起来。

好处：

一劳永逸。

缺点：

中奖与否全凭运气。

[建议]经统计分析后，认定 1—2 注号码，期期均投注。

[重要说明]

当自己有稳定的收入或者有一定的储蓄或者有赋闲的资金时，在预测推算过程中，可以尽量地用“最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点，以保证相应的预测结论均是靠得住的。这样做，可能令最终的预测范围偏大，但准确性有保证。碰上好机会时，若自己有经济能力去“搏杀”几次，也未尝不可。不求期期投注能中大奖，只求一次“全中”或“几乎全中”即可满足矣。所以在预测技术过硬的情况下，如何集中资金“火力”去攻其重要的“一点”是十分讲究的。所谓“机会”，是指在预测推算过程中，发现和找出了特别多、可靠的明显临界点，而根据这些明显临界点所相应作出的预测结论得到的最终预测范围并不是太大(相应的投注额自身能完全承受起)的话，则此时就应考虑“重锤出击”了。这种“机会”的出现，一是中奖号码出没变化过程中自然而然形成的，它是不以人的意志为转移的，是客观存在的；二是有赖于有头脑、有准备的“有心人”去认识它和把握它；三是“成功”与否取决于果敢的投注。

认识彩票、投资或投机彩票，必然要实践，要行动，实践出真知。在长期实践行动过程中，必然会产生顺或逆，得或失，利或损，成或败，安或危，福或祸，以至喜或忧，庆或悔等等。

总而言之，“一样米养百样人，一方彩票一方特点。”不同的彩民在深入学习和研究本书后，以至掌握相应的各种预测

方式和预测方法后，根据本地方本只彩票的中奖号码出没的各种变化之趋势与特点，具体问题具体分析地找出各种同类变化的“最高记录”和“次最高记录”，从而制定出相应识别同类变化现象的明显临界点之标准，最后充分搜索和确认有预测价值的各种变化明显临界点而达到预测目的。当然，一方面不同的彩民还应根据自身的目前的经济投注能力而采取不同的预测推算应用策略；另一方面，彩民可以暂不去考虑自身的经济投注能力，全力以赴地运用各种预测技术、预测方法去预测推算中奖号码，整个过程只讲究客观、真实、实事求是以及力求保证预测结果是准确的，不抱着勉强、侥幸的心理去识别和确认各种变化的明显临界点，那么，最终的预测结果出来后再决定如何进一步缩减或实施投注也不迟。

广大彩民必须根据自身的综合情况采取切合实际的预测推算方面的应用策略。

第十一章 关于彩德和运气对彩票中奖 的影响作用的分析

本书提出和倡导：99%的《周易与彩票选号技巧》的预测方式和方法 + 0.5%彩德 + 0.5%运气 = 千万富翁。

第一节 彩 德

彩德，指彩民以平常的心态，因长期购买具有公益性的彩票而形成的福报。正如善有善报，不是不报，而是时辰未到。

彩德由两大部分构成：一是正确的购彩心态，二是持之以恒的购彩实践。

彩票是具有强烈公益性的特点，是典型的贡献与幸运的结合体，是爱心和机遇的交织物。培养正确的购彩心态，关键在于理解彩票福利社会的本质，理解个人得失与社会的关系。

从哲学角度而言，影响事物产生变化的有两大因素：内因和外因，内因决定外因，外因通过内因而起作用。彩民在预测推算中奖号码过程中，主观心态有意无意地影响着你的预测判断。比如对各种变化的临界点的识别，或者对某些预测内容的感性或理性的推测。不同的预测结论就自然引致不同的投注结果。如果自己对各种预测方式、预测方法已有深入的研究并掌握相关的技巧的话，辅以平常的心态，淡然的心态去对待和处理各种程序的预测推算，自己的各种预测技能就会淋漓尽致地得到充分发挥，预测的精确度和准确性反而更有保证。反之，以赌博的心态，孤注一掷的心态，非赢不可的心态去处置各项

的预测推算，反而因“心魔”的影响而妨碍正确的预测结论的产生。这不是正确的自信心的表现，而是“利令智昏”的体现。无数的现实例证均可以证明此点。这正是自己的内因决定预测结果的外因的具体反映。

彩票与赌博的一个本质区别在于：资金所有权转换的方向不同。发行彩票筹集的资金使用是一次有利于社会的第三次分配，销售总额的50%用于返奖，其余的35%左右是政府收入，用于社会公益事业，其次是发行费用。彩票对收入再分配的作用主要体现在四个方面：

- 把彩票购买者的货币收入转化为公益基金收入；

- 彩票的返奖；

- 公益资金的使用，低收入者或特殊人群因此而得到了救助，或社会公共福利设施的建设得到资金上的支持，这些设施的建成令大众受益；

- 增加了国家的税收，主要是增加了增值税和个人所得税。换句话说，购彩票，你为社会，社会为你。这是一个良性循环。

作为彩民，明白其中道理，摆正自己的心态，正确和平淡地对待购彩票实践过程的得与失，成与败，这往往反而有助于彩民的福报。正如时下一些投注站所打出的广告语，其一语中的。借用佛家语言：“仁心施善款，慈悲济苦贫，冥感财神到，赐福博爱人。”买彩必须具五心，首先安个平常心，贵有爱心加善心，更须恒心兼耐心。

对彩票有了正确的认识，有了正确的购彩心态，有了可靠的各種预测技术和预测法，还须有持之以恒的购彩实践。任何高明的预测技巧只能通过长期的实践去积累和提高，此外，别无其他途径。纸上谈兵是无实际意义的，应当通过购彩实践

去检验预测结果，去体现预测推算的知识价值。当然，你别指望通过若干次的购彩就能中大奖。中大奖，往往偏爱于那些有头脑、有准备、而又量力而行、持之以恒、真心实意献爱心的人。

所以，具有了一定的彩德，就等于具有中大奖的一个前提条件。0.5%彩德对你能否中大奖，起着微妙的影响作用。

记住：淡薄以明志，宁静以致远。

第二节 运 气

至于运气，虽然“看不见，摸不着”，但它还是有一定的“规律”令彩民去把握它，让幸运之神光临自己身上。

你希望得到幸运之神眷顾，就要与她“沟通”，但“沟通”是需要自身必须具备一定的前提条件的：

1. 购彩心态正确，持之以恒地长期坚持理论与实际相结合地购彩。

2. 深入学习和研究各种预测方式和预测方法，通过长期的实践不断总结和提升预测技巧，尤其是运用同类变化的“最高记录”和“次最高记录”之标准去识别和确认变化的临界点之技巧。

3. 连续不断的预测推算才能发现及挖掘出能中大奖的明显机会：在一个小周期内，中奖号码往往自然地形成一种趋势，这种趋势表现出特别多的变化的明显临界点。

4. 戒断不良嗜好，把兴趣、时间、精力转移在预测推算上，把节省下来的赋闲小钱转为购买彩票。

5. 立足岗位，做好本职；积极乐观地生活，有赋闲的

钱支持长期购彩。

6. 花小钱，买希望。买彩票不一定中，但不买则永远不会中；购彩是讲究一种投注策略及长期实践的行为。

彩民具备了上述六种条件，则与中大奖的幸运之神就处在“同一层次，同一空间”，就能与她“沟通”了。当自己的主观条件与客观的某期次的中奖号码恰好是“同频率”的，吻合的，中大奖的运气就出来了，这时候幸运之神就光顾你了。换句话说，**主体和客体能互相协调配合，才能出运气！缺一不可。**所以，平常许多彩民埋怨自己运气不佳，其实不然。这包括：一是主体条件具备了，只不过“时辰”未到，中大奖是迟早的事；二是主体自身的条件尚未完全具备，则运气迟迟不出来就不足为怪了。当然有那么千万分之一的幸运儿纯粹是碰巧、撞彩而偶然获得大奖者，此类不在此书讨论的范畴。因为世界上什么事情都会发生，极少数者并不能代表社会上绝大多数者，我们研究讨论的对象是针对具有普遍性和绝大多数人认同的变化现象的规律。

我们所讲的“运气”，是创造和追求“主动的”运气，而不是盲目等待式的“被动的”运气！

所以，在茫茫的彩海中，在千变万化的号码组合中，纯粹碰运气几乎是行不通的；要行好运，则还要多点充实和改善自己。机会往往偏爱于有头脑、有准备的人们，正如俗语云：**知识可以改变命运，书中自有黄金屋。**看待运气，不能简单地看表面现象，而是应看其背后所深藏着的不为人知的客观基础。即是说，**0.5% 运气对自己能否中大奖的影响作用就不言而喻了。**当中大奖的机会真正来到你身旁时，就看你是否具备有抓住它的条件了。有时候，所谓的突生“灵感”而中大奖，其实是自身的主体与客观的中奖号码恰好完全协调的结果，这过程

大多数是在有意与无意间产生的。因此，在预测推算过程中，提倡彩民做一个“有心人”以得到幸运之神助自己一臂之力。

[顺注]

目前社会上一部分人由于机选或自选时以自己的生日数字或车牌号码或身份证号码或门牌号码或身边的“生活”数字或梦境中数字去投注而中得大奖，这不能完全以“纯粹碰运气”式得奖去解释，更不能以“迷信”方式解释。事实上，其中奖原理说起来并不复杂。

其一：社会上众多的彩民虽然机选投注购彩，表面上是独立的个体行为，但从另一个角度——社会整体而言，所有的个体行为“合成”了一个数字号码包围圈。这些覆盖范围颇大的包围圈若与该只彩票的“伪随机”开奖号码之总体趋势，个体位置号码互相吻合(概率理论上可以计算出多少注能产生一个头奖)，有人中大奖是理所当然的事情，只不过这个包围圈的“中大奖的那组机选号码”属于谁投注得到而已。

其二：我们知道，任何一只游戏规下的彩票，其每一期的开奖号码无疑属于其中所有可能的数字排列组合之一，世界是一个大社会，彩民自选时以身边的各式各样的数字去编排投注号码，有意或无意中“合成”了一个庞大的整体数字号码包围圈，若这个“数据库”包围圈能与该只彩票的(开奖号码数据库)当期开奖号码相吻合，则中大奖也是很自然的事。其实这与复式投注法进行大包围的原理是一致的。要知道，众多的彩民无论以何种方式编排号码去投注，其投注额远比若干个人用复式投注法花去的所谓“一笔可观资金”高得多，当“社会投注数据库”与“彩票开奖号码数据库”在数字上互为一致时，有人中大奖并不奇怪。从幸运的角度来

说，该期被开出的中奖号码恰好与你的投注完全一致，你就是那个“整体包围圈”中大奖的幸运儿了。以自选的身边的“生活”数字去投注而中大奖者和以一大笔“可观”的钱用复式投注包围法而中大奖者，前者往往因用了“某人的生日数字或某人的身份证号码”等而中得大奖被视为“神奇”、“玄奥”、“不可思议”。后者则通常不视作有什么特别。其实两者间的中奖原理是相通的。

所以，买彩票不一定中大奖，但不买彩票则永远不会中大奖。

另外，在预测推算中奖号码的过程中，任何迷信均是要不得的。所谓迷信，就是对于一项正确的事情或对于一门正确的学科，由于自己不认识或撑握其中的奥秘，被错误地去对待或运用，从而导致一系列负面的结果。

一言以蔽之，“0.5% 彩德 + 0.5% 运气”这两者间合起来的区区 1% 对自己能否中大奖可以产生微妙而又足够的影响，但这 1% 的主动权还是完全可以通过调整和改善自己而得到的！

谋事在人，成事在天。

预测推算彩票的中奖号码，完全是一种数字游戏，是一种机遇智力型的游戏。机会游戏给人的是一种轻松趣味盎然的角逐方式，寻找自己把握输赢的能力。彩票的性质注定彩票是一种精神消费品。

把预测推算中奖号码和投注购彩的过程定位于休闲娱乐、讲究趣味与智力，磨炼意志与毅力，以小博大，享受成就感与满足感这一层次上，即是预测和投注彩票，是趣味性、智力型、娱乐性为主，满足感、成就感并重的游戏。

当你把过去浪费掉的时间花在学习和研究《周易与彩票选

号》的理论与技术上，安排合理的时间去分析、推敲每一期次(指正常顺序下的期次)的彩票中奖号码，在预测过程中，充分享受这种游戏给你带来的趣味性、娱乐性，它考验着你的眼光与智力，挑战你的能力；当预测推算过程最终的结果出来后，你的心情既轻松又不放心，又不断怀疑，直至投注购彩完毕。每当开奖结果出来后，自己拿着彩票去核对开奖号码的一刻，要么激动、欢呼、高兴，要么沮丧、失落、感叹、后悔，要么自言自语……，无论如何，中了大奖当然开心，中了奖当然高兴，满足感、成就感也随之而来，不中奖也不必自责、失落，更不应发泄。**中奖了应总结经验，不中奖者更应总结教训，这是游戏的组成部分，而且是必不可少的组成部分。**正如一则广告语：不怕百战失利，就怕灰心丧气，以往注注落空，也许这次就中。这次失败了，但毕竟是做了善事，为社会作贡献了，同时也是 0.5% 彩德的积累过程。哦，明白了，就让“游戏”继续吧。

记住：

- 平常心是道，一张彩票可以改变你的一生。
- 闲钱买希望，希望把握在于自己。

第十二章 关于在预测实践过程中 若干个技巧问题的建议

第一节 科学地制表和记录以便观察和使用

在预测推算过程中，完全依赖于各种“信息数据库”的资料或各种关系对应符号记录一览表，需要经常、反复地查阅和检索相应的内容。因此，在记录和处理各种“信息”资料过程中也存在一个技巧的问题，科学地制表和记录不仅有利于提高工作效率，而且还减少不必要的人为失误。

一、颜色管理法：

对于不同类型的系统资料，可以使用不同颜色的纸张作记录，以便自己能迅速地辨认和使用。因为预测推算过程是一项长期的、反复的过程，所以记录资料的纸质一定要好、耐磨、以免纸质差而易致“残”资料。

对于众多的不同内容的记录，则最好使用不同颜色的圆珠笔书写，以示分别，这样处理后的资料能令你一目了然。多种颜色选择的圆珠笔，其书写的字迹不易褪色，不易溶于水。（注：啫喱笔水的圆珠笔不太适用，其书写后的颜色易褪色）

二、资料复印或过塑处理

经常使用的资料、公式原则或标准或系统，可以根据实际情况进行复印备份或过塑。复印的目的：一旦时间长资料使用次数多而致“残”，则可更换而不用重新抄写；过塑后的公式

原则或标准能够历久常新，利于查阅对照。因为购彩是一项长期的“游戏”，各项相关的“工作”应互相配合。比如需复印的资料主要有：空白的六十花甲纳音表及其对应的相冲关系表；干支数字信息载体总系统；过塑的资料主要有：数理与易理的变换关系；五行间的相生相克关系；十二地支(生肖)与号码数字的对应挂钩表；各种预测法的识别变化明显临界点之次数总结表(注：各种次数的“最高记录”和“次最高记录”之标准应根据该只游戏规则下的彩票的特点依过往的大量的历史资料检索后确定)。

第二节 预测推算工作“流水作业”化 以提高效率

为了要充分挖掘出中奖号码间变化的明显临界点，不得不建立众多的系统，以便有足够的信息数据进行预测推算，去排除绝大部分不可能出现的位置或总体号码组合。在实际推算过程中，先推算哪一部分，后推算哪一部分也有讲究。其原则为：

[先位置号码，后总体结构]

一、全面地推算完某一个位置号码后，再推算另一个位置号码；

二、所有位置号码预测推算完后，把所剩的极小范围全部交叉排列组合出来；

三、逐项总体结构地去推算，直至所有相关项目内容预测推算完毕；

四、运用总体结构各项的预测推算结论对预测后的位置号码之排列组合进行筛选，过滤。

上述的原则在具体的预测推算过程中表现为：

●先查阅、检索、衡量干支数字信息载体总系统。正常顺

序下的总系统的排列资料是最重要的，应特别重视其所昭示出的各种变化的信息。

●第二：查阅、检索、衡量同名干支系统、同名天干系统、同名地支系统。

●第三：查阅、检索、衡量同名纳音系统。

●第四：查阅、检索、衡量同尾数农历、新历系统、主题系统。

●第五：查阅、检索、衡量 1—12 位的等距离排列系统。

●第七：查阅、检索、衡量 1—12 位的号码环环等距离相比系统。

●最后查阅、检索、衡量主题结构演变系统和五行结构演变系统。

在逐个查阅、检索、衡量各个系统时，为了提高工作效率，为了“物尽其用”地充分发挥每一个系统每一局部应有的预测作用，每一个位置号码可按如下的“流程”进行“流水化”作业：[一边推算一边记录]。

1. 先等距加法、后等值加法。依次序为：先直线、斜线，其次为夹心、三角等值，最后不规则加法等值；先纵向，后横向；先二个号码间(或两者间)相加，后三个号码间相加。

2. 先等距乘法，后等值乘法。先直线、斜线，其次为夹心、三角等值，最后不规则乘法等值；先纵向，后横向；只考虑二个号码(或两者间相乘)，不用考虑三者间相乘。

说明：

a. 标准参照系的农历数字、新历数字、相冲岁数或九宫星数字均可以把它们看作成一个已知的、标准的“号码”！

b. 先用数学方法对逐个系统、逐个位置、逐部分进行推算后，对所有相应的记录作出初步的综合：据明显变化临界点所得出的预测结论给予肯定；据有怀疑性质的变化临界点所得出

的预测结果则区别出来，再结合下面不同方式的预测结果后再作最后的定论。

c. 在运用数学方法时，必须遵循由近到远的原则依次进行，以免遗漏，以免混乱。

3. 先垂直对应，其次平行对应，后斜线对应。

4. 先找相刑关系者，再找相生或相克关系者。

说明：

a. 垂直、平行、斜线三种轨迹对应法，其中以平行轨迹对应特别重要。

b. 相生、相克、相刑三种关系中，其中以发生相刑关系轨迹对应特别“好用”，易于判断。

c. 开奖日的天干、地支、纳音、九宫星与位置号码所发生的相生、相克、相刑关系比位置号码与开奖日干支的相冲关系中的地支、天干、纳音所发生的生克关系轨迹对应“好用”，相对而言，前者与位置号码间的轨迹对应比后者更容易被识别出变化的临界点。

d. 运用五行的相生相克理论进行全面的预测推算后，对所有相应的记录作出初步的综合：据明显变化临界点所得出的预测结论给予肯定；据有怀疑性质的变化临界点所得出的预测结果则区别出来，待最后综合所有的、最终的预测结果才作最后的定论。

e. 在运用五行理论推算过程中，必须遵循由近到远，逐项依次进行的原则开展，以免遗漏。

5. 先标准参照系——位置号码主题轨迹对应，后号码——位置号码主题轨迹对应。

6. 最后同数字母——子轨迹对应。

说明：

a. 运用数字间的主题配搭关系进行轨迹对应，往往能起到重要的预测作用；在具体操作时，还应着重考虑两者的轨迹对应是纯主题还是杂主题对应。

b. 主题配搭关系对应和同数字母——子轨迹对应是有别于数学方法和五行理论的预测推算方法。

c. 对相应的记录作出初步的综合：据明显变化临界点所得出的预测结论给予肯定；据有怀疑性质的变化临界点所得出的预测结果则区别出来。

7. 把上述 1—7 项的所有预测结果全部集中在一起，根据“事应过三”的验证法则和预测结果的可靠性进行综合取舍，得出最后的预测结论。

8. 逐个位置号码全面开展十二地支(生肖)的预测推算，运用最终的可靠的预测结果对上述全面预测后的极小范围交叉排列组合的结果再进行一次筛选、过滤。

说明：

a. 1—7 项的预测推算工作是对每一个位置号码的尾数进行定性定量分析，而第 8 项则是针对每个位置的具体号码进行分析，所以两者的准确的预测结论互相配合在一起，则令预测推算结果的范围缩得更小，有利于预测精确度的提高。

b. 当然，有时候经过 1—7 项的推算工作后，恰好碰上各个位置号码均有大量的、足够的明显临界点去推算，则还未进行第 8 项的预测推算程序，预测结果已经出来了。这时候，可根据实际的情况适当“偷工减料”。

在预测推算的实际过程中，为了提高效率，保证准确性和提高精确度。对于某一个位置号码的推算或某一项总体结构的推算，最好是集中时间，一鼓作气地全部推算完毕。

至于总体结构的预测推算工作，相对于个体位置号码的预

测推算工作量而言，简单多了。加上预测总体结构在识别变化的临界点上只采用同类“最高记录”标准去识别以保证相应的预测结论是准确的，所以在花费时间上会比个体位置号码的推算减少了许多。

· 总体结构的预测推算过程，同样要求按部就班地进行“流水化”作业。

无论是位置号码、生肖码还是总体结构的预测推算，在查阅、检索、衡量各个系统各项内容时，对于识别和确定变化的临界点时要坚决地执行“明显者用之，不明显者弃之”的法则，对于模棱两可的“疑点”不必要花大量的时间去“纠缠”它，以免影响工作效率。宁缺勿滥的观点，不仅会提高预测的准确性，而且也会节省时间而提高了效率。但这相应会扩大了预测结论的范围。

总而言之，预测推算的程序如何更加科学化、合理化、高效化，可以通过长期的实践而提高相应的技巧。

第三节 合理安排时间和调节好精神状态去预测

彩票中奖号码的预测推算是一项十分严谨的逻辑推理工作，在工作时，要无数次反复检索、对比、衡量号码间或两者间的变化轨迹是否处于能被准确地识别出是临界点的状态，因而要花费不少时间和精力去“对付”。

为了保证最佳的精神状态，当一鼓作气地完成一个位置号码或某一项总体结构内容的预测后，最好稍息一会或做其它事情以调节好自己的精神状态，然后再继续“作战”。

处理预测推算工作，不要疲惫地连续“作战”，要以平常的心态，最佳的精神状态去推算，往往可以减少失误和提高准

确性。

赶时间的工作方式或者精神不集中或者急于求成的心态均是彩票中奖号码预测推算的大忌。要知道，一处出错，价值尽失也！

在长期的实践过程中，根据自身的客观情形合理安排时间以及主动地随时调节好精神状态去预测推算是上策，这有助于“行好运”。

在这里特别建议彩民，每一期次开奖后，应即时安排时间作好记录，全面地、全方位地进行整理资料，不要“积压”，以免积重难返。

第四节 彻底认识和掌握预测方法的 思维逻辑及其关键

《周易与彩票选号》作为一门全新的边缘学科，其预测方式和预测方法的思维逻辑及其关键有下面主要几点：

一、预测推算的方向：

- 全力以赴，千方百计，定性定量地预测推算每一个位置号码。
- 以严谨、慎重的态度去预测推算中奖号码的总体结构。

二、预测推算的目标：

- 对于每一个位置号码，不外乎金木水火土五种属性之一，力求准确地排除不可能出现的其中的五分之四(或尾数)。

在实际预测推算过程中，由于各种变化的明显临界点的数量不同，一般每一个位置号码预测后的精确度为1—2行。

- 对于每一个位置号码，不外乎子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥十二个生肖码之一，力求准确地排除不可能出现的其中的十二分之十一。

在实际预测推算过程中，由于各种变化的明显临界点的数量不同，一般每一个位置的生肖码的精确度为：2—4 个生肖。

●对于每一个位置号码，不外乎(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)十个尾数之一，力求准确地排除不可能出现的其中的十分之九。

在实际预测推算过程中，由于各种变化的明显临界点的数量不同，一般每一个位置的号码尾数的精确度为：2—4 个尾数。

●对于总体结构的预测推算，一般没有刻意的要求，见机行事。但也可以具体要求每一项总体结构达到只有 2—3 种选择范围。

三、预测推算的基础：

●开奖期次足够多的、齐全的中奖号码(期次越多越好，一般要求至少要有一年以上的开奖号码)。

●正常顺序下的干支数字信息载体总系统。

●其他各个分系统。

只有足够多的系统，才能够挖掘出更多的、隐蔽的变化的明显临界点，才能为预测推算提供足够的依据，才能尽量地、准确地排除绝大部分不可能出现的五行属性或尾数或生肖(码)。

科学地、灵活地、合理地建立众多的、齐全的系统是预测推算中奖号码的特殊要求。

[比如彩票发行中心开奖期次顺序(即混合顺序，一周开奖 2—3 次)的号码排列所形成的整体，也可以视作一个特别系统]。

四、预测推算的途径：

●平行对应、垂直对应、斜线对应、同母——子轨迹对

应。

- 夹心对应、三角对应、不规则对应。

五、预测推算的手段：

- 尽最大的可能检索、搜查和识别出各种变化的明显临界点或较明显临界点。

——判断的过程所执行的标准是事先找出(大量的)同类变化轨迹对应的“最高记录”和“次最高记录”。

——建立标准参照系，在两者间进行各种对应时，通过标准参照系各数字信息载体的自身固有的变化规律去对比，反映出中奖号码变化万千的趋势和特点。

——只有明显的临界点(或较明显的临界点)才能容易被人们所认识和掌握，据此所作出的预测结果才信得过，靠得住。这是由于变化状态的不变、渐变、突变所形成的。

六、预测推算的方法：

- 通过易理与数理的转换，五行理论的相生、相克(相刑)规律是预测推算的重要方法。

- 巧妙地科学地运用数学上的加法和乘法能大幅度地排除不可能出现的尾数。

- 数字间的主题配搭关系，能排除一部分不可能出现的尾数。

七、预测推算的原则：

- 对于识别和确定各种变化的临界点的原则是：明显者用之，不明显者弃之；具体问题具体分析。

- “事应过三”的验证法则。

八、预测推算的心态：

- 以平常心态、淡然的心态去对待。

- 决不抱任何侥幸的心理去预测推算。

第五节 群策群力：集体智慧化和合买彩票

俗语说：三个臭皮匠，赛过一个诸葛亮。这说明集体智慧的威力。这同样适用于彩票中奖号码的预测推算。

彩民们可以和同事或邻居或朋友组成一个预测推算的“俱乐部”，每一个成员在充分地深入学习研究本书后，则进行“分工”：某一位负责推算这两个位置号码，另一位负责推算另两个位置号码，……或某几个成员专门负责位置号码，某几个成员专门负责总体结构，最后把大家的预测结论进行综合，得出最终的投注结果。这样的“俱乐部”的分工合作，不仅可以大大减少各个成员的“预测推算工作时间”，而且由于专项化工作而更容易“卓有成效”。集体的智慧有时候会远远高于个人的见解。

当然，“群策”后的投注额，还应进行“群力”，即合买彩票。“合彩”的原则可依如下的建议参考：

1. 自愿参与：志同道合才能在一起。

2. 平等协商：不论职务高低、长幼尊卑，男或女，应心平气和地共同商榷投注的号码组合、投注额，明确彩票由谁保管，一旦中奖，奖金如何分配等。

3. 彩务公开：彩务公开主要是指各项“合彩”工作或程序要公开。不要因为是“熟人”、知心朋友而忽视了向“合彩”人展示投注情况、购买后的彩票、获奖彩票的全过程。

4. 风险同担：投机就会有风险，因此“合彩”人要有承担因购彩而“一无所获”的风险意识，而且这个风险必须是“合彩”人共同承担。风险有大小之分，预测范围越扩大，投注额越升高，则中大奖的几率就相应会提高，但风险也就越大。反之风险越小。为防范风险，彩民一定要量力而行，要以平常的

心态去作长期的“游戏”打算。

5. 中奖获利分匀：“合彩”的一个重要愿望就是为了提高中大奖的几率。无论奖金大小，均应平均分摊。或者大家可按事先的约定全部分摊，又或者部分分摊后截留若干奖金作为“合彩”基金。

[说明]

为什么会有“集体智慧化和合买彩票”的建议呢？

主要是针对当前社会上一大批人经常打麻将、打扑克牌，不仅浪费精力，浪费时间，而且还耗费钱财，甚至产生其他更多方面的不良后果，若大家花一定的时间对本书进行认真地学习和研究后，戒掉打麻将、扑克牌的不良赌博嗜好，改为“志同道合”者进行“预测推算和合买彩票”，则不仅做了善事，而且还开辟了一条真正财路，真是利国利民利自己，一举多得，何乐而不为呢？

附录一

广东体彩 7/36，2000 年至 2002 年 2 月
五行结构演变系统

开奖日的干支、 农历、新历、纳音	金	木	土	水	火
辛酉 廿八(4) 木	29	18 23	⊗	6 16	27 32
戊辰 初五(11) 木	29	3 33	⊗	11 21 16	22
乙亥 十二(18) 火	9 19 24	8 18	10	11	⊗
壬午 十九(25) 木	24 29	3 8 18	25	⊗	7
己丑 廿六(1) 火	4 14	23	15	1	2 17
丙申 初四(8) 火	4 34	28	10 25	⊗	17 22
癸卯 十一(15) 金	4 14	3 23	30	36	12
庚戌 十八(22) 金	⊗	23 28 33	20 30	⊗	7 22
丁巳 廿五(29) 土	9 14 29	28	25	⊗	22 27
甲子 初二(7) 金	19	23	5 20 35	1 6	⊗
辛未 初九(14) 土	9	28	5 25	21	2 32
戊寅 十六(21) 土	34	23 28	10	6	22
乙酉 廿三(28) 水	⊗	3 8 18 28	20	11 16	⊗
壬辰 三十(4) 水	⊗	28	15	1 11 21 26	12
己亥 初七(11) 木	19	13	⊗	11 21	2 7 22

丙午十四(18) 水	29	8	15 35	1 11 21	⊗
癸丑廿一(25) 木	⊗	8 33	⊗	16 31	17 27 22
庚申廿八(2) 木	29 34	13 28	10 20	16	⊗
丁卯初六(9) 火	14 34	18	5 35	21 31	⊗
甲戌十三(16) 火	19 24	28	20	6	12 22
辛巳二十(23) 金	29	18	30	6 16	2
戊子廿七(30) 火	14 29	3 23	⊗	21	22 27
乙未初五(6) 金	34	33	30	6	7 17 27
壬寅十二(13) 金	14 29	⊗	20 15	11 31	7
己酉十九(20) 土	4	3 23 33	⊗	6 36	22
丙辰廿六(27) 土	19 24	8 13	20	1	22
癸亥初三(4) 水	9 14 19	⊗	⊗	11 21	7 32
庚午初十(11) 土	19 24	33	10 35	⊗	17 27
丁丑十七(18) 水	9 24	3 23	⊗	36	7 12
甲申廿四(25) 水	14 24	3 28	5	31	12
辛卯初二(1) 木	⊗	18 33	10 25	26 36	32
戊戌初九(8) 木	⊗	8 13	10 25	6 36	32
乙巳十六(15) 火	14 34	⊗	⊗	6 11 21 31	2
壬子廿三(22) 木	⊗	3 18	⊗	1 21	7 17 27

己未初一(29) 火	⊗	⊗	5 20	1 31 36	17 22
丙寅初八(5) 火	34	18	20 25	36	27
癸酉十五(12) 金	9	23	15	6 36 11 31	⊗
庚辰廿二(19) 金	29	18	20	6 26 31	17
丁亥廿九(26) 土	⊗	18	35	1 6 11	7 17
甲午初六(3) 金	24	3 23	⊗	6 36	7 17
辛丑十三(10) 土	⊗	18 33	30	26	12 17
戊申二十(17) 土	⊗	3 18 28	30	1 31	17
乙卯廿七(24) 水	14	33	⊗	11 21 31	17 22
壬戌初五(31) 水	14 34	3 28	25 30	⊗	32
己巳十二(7) 木	4	3 23	5 10	6	7
丙子十九(14) 水	14 24 19	3 28	30	1	⊗
癸未廿六(21) 木	⊗	8 13 33	25 5	16	17
庚寅初三(28) 木	⊗	8 18	30	⊗	12 22 32
丁酉初十(5) 火	19	3 18	10 30	⊗	2 22
甲辰十七(12) 火	19	8 13	10 20	21 36	⊗
辛亥廿四(19) 金	19	18	⊗	1 16	17 22 27
戊午初一(26) 火	24	⊗	10 30 15 35	1 21	⊗
乙丑初八(2) 金	⊗	13 23 18	5 30 35	⊗	27

壬申十五(9) 金	⊗	3 23	35 30	26 36	17
己卯廿二(16) 土	14 24	33	25 30	6	17
丙戌廿九(23) 土	4 34	⊗	5 10 30	26	⊗
癸巳初七(30) 水	4 14	13	⊗	1 11 6	27
庚子十四(6) 土	⊗	⊗	5 10 25	36	7 12 32
丁未廿一(13) 水	34	23 33	⊗	6 16 31	22
甲寅廿八(20) 水	14 24 34 29	⊗	35	⊗	22 27
辛酉初五(27) 水	19	18 23	10	26	22 32
戊辰十二(6) 木	19	23	5	1	2 7 17
乙亥十九(13) 火	14	28 33	15	11 36	22
壬午廿六(20) 木	9	33	5 15 35	1 6	⊗
己丑初三(27) 火	⊗	⊗	5 35 30	6 21 32	12
丙申初十(3) 火	⊗	23	⊗	6 11	2 12 17
癸卯十七(10) 金	14 34	3 28	15	36	32
庚戌廿四(17) 金	19	18	30	6 11	12 27
丁巳初二(24) 土	⊗	3 13 8	20 25	31 36	⊗
甲子初九(1) 金	24	8	15 20	1 11	17
辛未十六(8) 土	4 29	8 23	10	36	12
戊寅廿三(15) 土	⊗	8	20 25	16	12 17 27

乙酉三十(22) 水	19	18	10 15 35	21 26	⊗
壬辰初七(29) 水	9 34	8 18	⊗	16 26	7
己亥十四(5) 木	⊗	23 28	⊗	11 31 26	12
丙午廿一(12) 水	4 24 34	⊗	20	⊗	12 22 17
癸丑廿八(19) 木	⊗	3 8 28	20 35	6	27
庚申初六(26) 木	4 9 29 34	33	10 35	⊗	⊗
丁卯十三(3) 火	⊗	3 28	5 30	31 36	27
甲戌二十(10) 火	19	13 23	5	1 6 21	⊗
辛巳廿七(17) 金	9 29 14	8	20	31	22
戊子初四(24) 火	⊗	3 33	15 35	16	12 17
乙未十一(31) 金	4 24	8 13	15	16 26	⊗
壬寅十八(7) 金	34	⊗	5 25 20	26	22 32
己酉廿五(14) 土	9 29	⊗	15	6 36	2 32
丙辰初三(21) 土	19	13 28	15 25	21	32
癸亥初十(28) 水	⊗	3 18	15 25	26	27 32
庚午十七(4) 土	34	28	25	26 21	7 32
丁丑廿四(11) 水	14	18	10 15	21 31 36	⊗
甲申初二(18) 水	29	⊗	20	26	7 12 22
辛卯初九(25) 木	29	18 28	⊗	21 36	7 12

戊戌 _{十六(2)} 木	29 34	28	10	1 6	22
乙巳 _{廿三(9)} 火	9 19 29 24	8 13	25	⊗	⊗
壬子 _{三十(16)} 木	⊗	3 13	10 15 20	1	32
己未 _{初七(23)} 火	29	3 28 33	10	1 31	⊗
丙寅 _{十四(30)} 火	29	⊗	⊗	11 21 31	7 17 32
癸酉 _{廿一(6)} 金	29	33	5	1 6 21	2
庚辰 _{廿八(13)} 金	29	8 13	35	16 21	17
丁亥 _{初六(20)} 土	⊗	⊗	⊗	11 21 31	2 12 22 32
甲午 _{十三(27)} 金	4	8 18	15 25	1	22
辛丑 _{二十(4)} 土	14	23	25 35 30	1	⊗
戊申 _{廿七(11)} 土	4	⊗	5 35	11	2 22 17
乙卯 _{初四(18)} 水	24 29	23	10	1	17 22
壬戌 _{十一(25)} 水	14	33	25	1 11 21 26	⊗
己巳 _{十八(1)} 木	4 34	⊗	5	1 26 31	12
丙子 _{廿五(8)} 水	9 29 34	⊗	5	1 16	2
癸未 _{初三(15)} 木	9 19	33	5 20 30	⊗	12
庚寅 _{初十(22)} 木	14 24 34	3 28	⊗	1	27
丁酉 _{十七(29)} 火	9 14 24	⊗	25	6	17 27
甲辰 _{廿四(5)} 火	29	8 33	5 20 30	16	⊗

辛亥初一(12) 金	9	14	24	⊗	35	21	26	32
戊午初八(19) 火		?		?	?	?		?
乙丑十五(26) 金								
壬申廿二(5) 金								
.....								

[重要说明:因 2002 年春节期间,彩市(星期二)的辛亥初一(12)和戊午初八(19)停开,于(星期二)乙丑十五(26)才重新开奖。为了不影响预测推算的整体连续性,故可以灵活地、变通地把(星期二)乙丑十五(26)的开奖号码当作辛亥初一(12)的开奖号码,壬申廿二(5)的开奖号码当作戊午初八(19)的开奖号码,……其他如此类推和顺移!]

附录二

广东体彩 7/36，2000 年至 2002 年 2 月
主题结构演变系统

开奖日的干支、 农历、新历、纳音	[5 · 0] 主题	[1 · 9] 主题	[2 · 8] 主题	[3 · 7] 主题	[4 · 6] 主题
辛酉 _{廿八(4)} 木	⊗	29	18+32	23+27	6+16
戊辰 _{初五(11)} 木	⊗	11+29+21	22	3+33	16
乙亥 _{十二(18)} 火	10	9+11+19	8+18	⊗	24
壬午 _{十九(25)} 木	25	29	8+18	3+7	24
己丑 _{廿六(1)} 火	15	1	2	17+23	4+14
丙申 _{初四(8)} 火	10+25	⊗	22+28	17	4+34
癸卯 _{十一(15)} 金	30	⊗	12	3+23	4+14+36
庚戌 _{十八(22)} 金	20+30	⊗	22+28	7+23+33	⊗
丁巳 _{廿五(29)} 土	25	9+29	22+28	27	14
甲子 _{初二(7)} 金	5+20+35	1+19	⊗	23	6
辛未 _{初九(14)} 土	5+25	9+21	2+32+28	⊗	⊗
戊寅 _{十六(21)} 土	10	⊗	22+28	23+33	6+34
乙酉 _{廿三(28)} 水	20	11	8+18+28	3	16
壬辰 _{三十(4)} 水	15	1+11+21	12+28	⊗	26

己亥初七(11)木	⊗	11+19+21	2+22	7+13	⊗
丙午十四(18)水	15+35	1+11+21+29	8	⊗	⊗
癸丑廿一(25)木	⊗	31	8+22	17+27+33	16
庚申廿八(2)木	10+20	29	28	13	16+34
丁卯初六(9)火	5+35	21+31	18	⊗	14+34
甲戌十三(16)火	20	19	12+22+28	⊗	6+24
辛巳二十(23)金	30	29	2+18	17	6+6
戊子廿七(30)火	⊗	21+29	22	3+23+27	14
乙未初五(6)金	30	⊗	⊗	7+17+27+33	6+34
壬寅十二(13)金	15+20	11+29+31	⊗	7	14
己酉十九(20)土	⊗	⊗	22	3+23+33	4+6+36
丙辰廿六(27)土	20	1+19	8+22	13	24
癸亥初三(4)水	⊗	9+11+19+21	32	7	14
庚午初十(11)土	10+35	19	⊗	17+27+33	24
丁丑十七(18)水	⊗	9	12	3+23+7	24+36
甲申廿四(25)水	5	31	12+28	3	14+24
辛卯初二(1)木	10+25	⊗	18+32	33	26+36
戊戌初九(8)木	10+25	⊗	8+32	13	6+36
乙巳十六(15)火	⊗	11+21+31	2	⊗	6+14+34
壬子廿三(22)木	⊗	1+21	18	3+7+17+27	⊗
己未初一(29)火	5+20	1+31	22	17	36

丙寅初八(5) 火	20+25	⊗	18	27	34+36
癸酉十五(12) 金	15	11+9+31	⊗	23	6+36
庚辰廿二(19) 金	20	29+31	18	17	6+26
丁亥廿九(26) 土	35	1+11	18	7+17	6
甲午初六(3) 金	⊗	⊗	⊗	3+23+7+17	6+36+24
辛丑十三(10) 土	30	⊗	12+22+28	17+33	26
戊申二十(17) 土	30	1+31	18+28	3+17	⊗
乙卯廿七(24) 水	⊗	11+21+31	22	17+33	14
壬戌初五(31) 水	25+30	⊗	28+32	3	14+34
己巳十二(7) 木	5+10	⊗	⊗	3+7+23	4+6
丙子十九(14) 水	30	1+19	28	3	14+24
癸未廿六(21) 木	5+25	⊗	8	13+17+33	16
庚寅初三(28) 木	30	⊗	(12+22+32+8+18)	17	⊗
丁酉初十(5) 火	10+30	19	2+22+8	3	⊗
甲辰十七(12) 火	10+20	19+21	8	13	36
辛亥廿四(19) 金	⊗	1+19	18+22	17+27	16
戊午初一(26) 火	10+30+15+35	1+21	⊗	⊗	24
乙丑初八(2) 金	5+30+35	⊗	28	13+23+27	⊗
壬申十五(9) 金	30+35	⊗	⊗	3+17+23	26+36

己卯 _{廿二(16)} 土	25+30	⊗	⊗	17+33	6+14+24
丙戌 _{廿九(23)} 土	5+10+30	1	⊗	⊗	4+26+34
癸巳 _{初七(30)} 水	⊗	1+11	⊗	13+27	4+6+14
庚子 _{十四(6)} 土	5+10+25	⊗	12+32	7	36
丁未 _{廿一(13)} 水	⊗	31	22	23+33	6+16+34
甲寅 _{廿八(20)} 水	35	29	22	27	14+24+34
辛酉 _{初五(27)} 木	10	19	18+22+32	23	26
戊辰 _{十二(6)} 木	5	1+19	2	7+17+23	⊗
乙亥 _{十九(13)} 火	15	11	22+28	33	14+36
壬午 _{廿六(20)} 木	5+15+35	1+9	⊗	33	6
己丑 _{初三(27)} 火	5+35+30	21+31	12	⊗	6
丙申 _{初十(3)} 火	⊗	11	2+12	7+17+23	6
癸卯 _{十七(10)} 金	15	⊗	28+32	3	14+34+36
庚戌 _{廿四(17)} 金	30	11+19	12+18	27	6
丁巳 _{初二(24)} 土	20+25	31	8	3+13	36
甲子 _{初九(1)} 金	15+20	1+11	8	17	24
辛未 _{十六(8)} 土	10	29	8+12	23	4+36
戊寅 _{廿三(15)} 土	20+25	⊗	8+12	17+27	16
乙酉 _{三十(22)} 水	10+15+35	19+21	18	⊗	26

壬辰初七(29) 水	⊗	9	8+18	7	16+26+34
己亥十四(5) 木	⊗	1+11+31	12+28	23	26
丙午廿一(12) 水	20	⊗	12+22	17	4+24+34
癸丑廿八(19) 木	20+35	⊗	8+28	3+27	6
庚申初六(26) 木	10+35	9+29	⊗	33	4+34
丁卯十三(3) 火	5+30	31	28	3+27	36
甲戌二十(10) 火	5	1+21+19	⊗	13+23	6
辛巳廿七(17) 金	20	9+29+31	8+22	⊗	14
戊子初四(24) 火	15+35	⊗	12	3+33+17	16
乙未十一(31) 金	15	⊗	8	13	4+24+16+26
壬寅十八(7) 金	5+25+20	⊗	22+32	⊗	26+34
己酉廿五(14) 土	15	9+29	2+32	⊗	6+36
丙辰初三(21) 土	15+25	19+21	28+32	13	⊗
癸亥初十(28) 水	15+25	⊗	18+32	3+27	26
庚午十七(4) 土	25	21	28+32	7	26+34
丁丑廿四(11) 水	10+15	21+31	18	⊗	14+36
甲申初二(18) 水	5+20	29	12+22	7	26
辛卯初九(25) 木	⊗	21+29	12+18+28	7	36
戊戌十六(2) 木	10	1+29	22+28	⊗	6+24

乙巳 _{廿三(9)} 火	25	9+19+29	8	13	24
壬子 _{三十(16)} 木	10+20+15	1	32	3+13	⊗
己未 _{初七(23)} 火	10	1+31+29	28	3+33	⊗
丙寅 _{十四(30)} 火	⊗	11+21+31+29	32	7+17	⊗
癸酉 _{廿一(6)} 金	5	1+21+29	2	33	6
庚辰 _{廿八(13)} 金	35	21+29	8	13+17	16
丁亥 _{初六(20)} 土	⊗	11+21+31	2+12+22+32	⊗	⊗
甲午 _{十三(27)} 金	15+25	1	8+18+22	⊗	4
辛丑 _{二十(4)} 土	25+35+30	1	⊗	23	14+16
戊申 _{廿七(11)} 土	5+35	11	2+22	17	4
乙卯 _{初四(18)} 水	10	1+29	22	17+23	24
壬戌 _{十一(25)} 水	25	1+11+21	⊗	33	14+26
己巳 _{十八(1)} 木	5	1+31	12	⊗	4+34+26
丙子 _{廿五(8)} 水	5	1+9+29	2	⊗	34+16
癸未 _{初三(15)} 木	15+20+30	9+19	12	33	⊗
庚寅 _{初十(22)} 木	⊗	1	28	3+27	14+24+34
丁酉 _{十七(29)} 火	25	9	⊗	17+27	6+14+24
甲辰 _{廿四(5)} 火	5+20+30	29	8	33	16
辛亥 _{初一(12)} 金	35	9+21	32	⊗	14+34+26

戊午初八(19) 火	?	?	?	?	?
乙丑十五(26) 金					
壬申廿二(5) 金					

附录三

深圳风采 7/35 电脑型福利彩票中奖号码之 主题结构缩写系统和主题类型演变系统

开奖日	开 奖 号 码	主题结构缩写	虚主题	主题类型
壬戌 _{廿九(5)}	1 4 6 12 13 26 27 — 25	[4+6+6][3+7][1,2]	⊗5·0	〈2〉+1
己巳 _{初六(12)}	3 4 5 8 23 24 26 — 29	[4+4+6][3+3][5,8]	⊗1·9	〈2〉+1
丙子 _{十三(19)}	3 8 12 20 23 26 34 — 1	[4+6][3+3][2+8][0]	⊗1·9	〈3〉
癸未 _{二十(26)}	9 18 24 26 31 34 35 — 16	[4+4+6][1+9][8,5]	⊗3·7	〈2〉+1
庚寅 _{廿七(2)}	1 6 8 14 15 18 33 — 4	[4+6][8+8][1,5,3]	[齐]	〈3〉
丁酉 _{初五(9)}	(停 开)			
甲辰 _{十二(16)}	7 17 19 20 25 29 31 — 22	[9+9+1][5+0][7+7]	⊗2·8⊗4·6	〈3〉+1
辛亥 _{十九(23)}	6 7 11 18 23 32 35 — 16	[3+7][2+8][6,1,5]	[齐]	〈2〉
戊午 _{廿六(1)}	9 10 11 25 27 28 33 — 22	[1+9][5+0][3+7][8]	⊗4·6	〈3〉

乙丑	初三(8)	5	11	24	27	28	33	34	— 3	[4+4][3+7][5,1,8]	[齐]	〈2〉
壬申	初十(15)	8	9	15	20	23	30	35	— 4	[5+5+0+0][3,8,9]	⊗4·6	〈1〉+2
己卯	十七(22)	8	15	17	19	20	23	27	— 21	[5+0][7+7+3][8,9]	⊗4·6	〈2〉+1
丙戌	廿四(29)	1	17	18	22	30	31	34	— 2	[1+1][8+2][7,0,4]	[齐]	〈2〉
癸巳	初一(5)	1	4	5	16	31	32	34	— 27	[1+1][4+4+6][2,5]	⊗3·7	〈2〉+1
庚子	初八(12)	6	11	12	13	21	31	34	— 33	[1+1+1][4+6][3,2]	⊗5·0	〈2〉+1
丁未	十五(19)	4	5	9	20	21	31	34	— 33	[9+1+1][4+4][5+0]	⊗2·8⊗3·7	〈3〉+1
甲寅	廿二(26)	1	5	6	17	18	19	20	— 11	[1+9][5+0][6,7,8]	[齐]	〈2〉
辛酉	廿九(3)	5	8	11	14	25	30	33	— 1	[5+5+0][8,1,4,3]	[齐]	〈1〉+1
戊辰	初七(10)	6	12	17	20	27	28	32	— 26	[7+7][2+2+8][6,0]	⊗1·9	〈2〉+1
乙亥	十四(17)	2	7	15	16	24	34	35	— 5	[4+4+6][5+5][2,7]	⊗1·9	〈2〉+1
壬午	廿一(24)	6	8	17	18	19	23	35	— 13	[8+8][3+7][6,9,5]	[齐]	〈2〉
己丑	廿八(31)	5	7	8	13	26	27	31	— 15	[7+7+3][5,8,6,1]	[齐]	〈1〉+1
丙申	初六(7)	2	18	23	24	31	32	34	— 11	[2+2+8][4+4][1,3]	⊗5·0	〈2〉+1

癸卯十三(14)	1	7	12	14	17	21	22	—	28	$[7+7][1+1][2+2][4]$	$\otimes 5 \cdot 0$	$\langle 3 \rangle$
庚戌二十(21)	14	16	18	23	25	31	33	—	15	$[4+6][3+3][8,5,1]$	[齐]	$\langle 2 \rangle$
丁巳廿七(28)	2	4	10	16	18	25	29	—	24	$[4+6][2+8][5+0][9]$	$\otimes 3 \cdot 7$	$\langle 3 \rangle$
甲子初四(5)	10	11	12	18	31	32	35	—	26	$[0+5][2+2+8][1+1]$	$\otimes 4 \cdot 6 \otimes 3 \cdot 7$	$\langle 3 \rangle + 1$
辛未十一(12)	9	15	19	20	29	31	34	—	28	$[9+9+9+1][5+0][4]$	$\otimes 2 \cdot 8 \otimes 3 \cdot 7$	$\langle 2 \rangle + 2$
戊寅十八(19)	8	11	15	17	22	25	31	—	10	$[5+5][2+8][1+1][7]$	$\otimes 4 \cdot 6$	$\langle 3 \rangle$
乙酉廿五(26)	4	21	26	29	31	33	34	—	16	$[4+4+6][1+1+9][3]$	$\otimes 2 \cdot 8 \otimes 5 \cdot 0$	$\langle 2 \rangle + 1 + 1$
壬辰初三(2)	1	6	14	21	24	28	34	—	9	$[1+1][4+4+4+6][8]$	$\otimes 3 \cdot 7 \otimes 5 \cdot 0$	$\langle 2 \rangle + 2$
己亥初十(9)	2	13	16	17	18	19	35	—	7	$[3+7][2+8][6,9,5]$	[齐]	$\langle 2 \rangle$
丙午十七(16)	8	14	15	18	23	29	30	—	17	$[8+8][5+0][4,9,3]$	[齐]	$\langle 2 \rangle$
癸丑廿四(23)	2	11	12	18	20	25	31	—	15	$[5+0][2+2+8][1+1]$	$\otimes 3 \cdot 7 \otimes 4 \cdot 6$	$\langle 3 \rangle + 1$
庚申初二(30)	14	15	17	22	27	28	31	—	16	$[2+8][7+7][4,5,1]$	[齐]	$\langle 2 \rangle$
丁卯初九(6)	14	15	17	18	20	30	31	—	34	$[5+0+0][4,7,8,1]$	[齐]	$\langle 1 \rangle + 1$
甲戌十六(13)	4	18	24	27	33	34	35	—	29	$[4+4+4][3+7][8,5]$	$\otimes 1 \cdot 9$	$\langle 2 \rangle + 1$

辛巳 _{廿三(20)}	5	14	16	30	31	33	35	—	21	[5+5+0][4+6][1,3]	⊗2·8	〈2〉+1
戊子 _{三十(27)}	3	13	15	21	23	26	34	—	1	[3+3+3][4+6][5,1]	⊗2·8	〈2〉+1
乙未 _{初七(4)}	2	3	16	17	21	22	23	—	1	[3+3+7][2+2][6,1]	⊗5·0	〈2〉+1
壬寅 _{十四(11)}	5	9	13	22	28	30	35	—	6	[5+5+0][2+8][9,3]	⊗4·6	〈2〉+1
己酉 _{廿一(18)}	4	5	10	16	20	23	33	—	27	[5+0+0][3+3][4+6]	⊗2·8⊗1·9	〈3〉+1
丙辰 _{廿八(25)}	2	4	7	11	19	20	33	—	17	[1+9][3+7][4,2,0]	[齐]	〈2〉
癸亥 _{初六(1)}	1	18	19	21	28	33	35	—	20	[1+1+9][8+8][3,5]	⊗4·6	〈2〉+1
庚午 _{十三(8)}	2	9	15	20	21	25	34	—	16	[1+9][5+5+0][4,2]	⊗3·7	〈2〉+1
丁丑 _{二十(15)}	9	13	19	23	26	32	35	—	34	[9+9][3+3][6,2,5]	[齐]	〈2〉
甲申 _{廿七(22)}	3	4	6	10	12	34	35	—	17	[4+4+6][5+0][2,3]	⊗1·9	〈2〉+1
辛卯 _{初四(29)}	2	9	13	15	30	31	32	—	18	[9+1][5+0][2+2][3]	⊗4·6	〈3〉
戊戌 _{十一(6)}	2	5	11	12	20	22	23	—	15	[5+0][2+2+2][1,3]	⊗4·6	〈2〉+1

乙巳_{十八(13)} (省略)

附录四：

广东体彩四花选 4 之生肖码演变系统和
总体五行状态演变系统

开奖日	开奖日的生肖码					纳音	总体五行状态	虚五行
庚申初四(26)	13 巳	10 申	11 未	3 卯	木	木土水	⊗金火	
丁卯十一(5)	9 酉	12 午	1 巳	5 丑	火	金火水土	⊗木	
甲戌十八(12)	2 辰	8 戌	7 亥	8 戌	火	火木	⊗金水土	
辛巳廿五(19)	10 申	5 丑	5 丑	2 辰	金	土火	⊗木金水	
戊子初二(26)	12 午	6 子	7 亥	8 戌	火	火水木	⊗土金	
乙未初九(2)	9 酉	9 酉	10 申	5 丑	金	金土	⊗木水火	
壬寅十六(9)	10 申	8 戌	13 巳	12 午	金	土木火	⊗水金	
己酉廿三(16)	1 巳	8 戌	2 辰	1 巳	土	水木火	⊗金土	
丙辰初一(23)	10 申	8 戌	7 亥	2 辰	土	土木火	⊗水金	
癸亥初八(30)	9 酉	11 未	2 辰	7 亥	水	金水火	⊗土木	
庚午十五(7)	10 申	8 戌	12 午	2 辰	土	土木火	⊗金水	
丁丑廿二(14)	1 巳	12 午	7 亥	3 卯	水	水火木	⊗金土	
甲申廿九(21)	5 丑	1 巳	13 巳	4 寅	水	土水木金	⊗火	
辛卯初六(28)	10 申	4 寅	1 巳	5 丑	木	土金水	⊗木火	
戊戌十三(4)	1 巳	7 亥	13 巳	4 寅	木	水火木金	⊗土	
乙巳二十(11)	4 寅	3 卯	12 午	8 戌	火	金木火	⊗水土	
壬子廿七(18)	9 酉	8 戌	7 亥	8 戌	木	金木火	⊗土水	
己未初五(25)	5 丑	3 卯	1 巳	2 辰	火	土木水火	⊗金	

丙寅 _{十二(2)}	2 _辰	7 _亥	7 _亥	1 _巳	火	火水	⊗土金木
癸酉 _{十九(9)}	8 _戌	10 _申	13 _巳	2 _辰	金	木土火	⊗金水
庚辰 _{廿六(16)}	5 _丑	10 _申	2 _辰	1 _巳	金	土火水	⊗金木
丁亥 _{初三(23)}	9 _酉	5 _丑	12 _午	2 _辰	土	金土火	⊗水木
甲午 _{初十(30)}	13 _巳	4 _寅	9 _酉	10 _申	金	木金土	⊗水火
辛丑 _{十七(6)}	11 _未	6 _子	3 _卯	11 _未	土	水木	⊗金火土
戊申 _{廿四(13)}	13 _巳	11 _未	4 _寅	6 _子	土	木水金	⊗土火
乙卯 _{初二(20)}	11 _未	4 _寅	13 _巳	8 _戌	水	木水金	⊗土火
壬戌 _{初九(27)}	4 _寅	10 _申	13 _巳	7 _亥	水	金土木火	⊗水
己巳 _{十六(3)}	9 _酉	7 _亥	2 _辰	10 _申	木	金火土	⊗水木
丙子 _{廿三(10)}	9 _酉	9 _酉	2 _辰	5 _丑	水	金火土	⊗木水
癸未 _{初一(17)}	8 _戌	4 _寅	5 _丑	6 _子	木	木金土水	⊗火
庚寅 _{初八(24)}	6 _子	7 _亥	6 _子	13 _巳	木	水火木	⊗金土
丁酉 _{十五(1)}	4 _寅	10 _申	11 _未	3 _卯	火	金土水木	⊗火
甲辰 _{廿二(8)}	13 _巳	3 _卯	12 _午	6 _子	火	木火水	⊗土金
辛亥 _{廿九(15)}	1 _巳	2 _辰	12 _午	12 _午	金	水火	⊗金木土
戊午 _{初六(22)}	7 _亥	7 _亥	10 _申	1 _巳	火	火土水	⊗金木
乙丑 _{十三(29)}	4 _寅	10 _申	13 _巳	9 _酉	金	金土木	⊗水火
壬申 _{二十(5)}	3 _卯	1 _巳	2 _辰	6 _子	金	木水火	⊗金土
己卯 _{廿七(12)}	12 _午	11 _未	7 _亥	11 _未	土	火水	⊗金木土
丙戌 _{初五(19)}					土		
癸巳 _{十二(26)}					水		

附录五

南粤风采 7/36 福利彩票之数型与配伍演变系统、 主题结构缩写系统

开奖日	开奖号码	主题结构缩写	虚主题	前段配伍	后段配伍	配伍	虚数型
甲子初七(1)	12 16 18 23 26 30 32 金	[2+2+8][6+6][0,3]	⊗1·9	1	2 2 3 ₈ 3	4 4 ₁ [9]	⊗0
辛未十四(8)	5 9 10 13 30 31 36 土	[5+0+0][1+9][6,3]	⊗2·8	0	1 1 1 ³ 4	4 4 ² [5]	⊗2,3
戊寅廿一(15)	5 8 12 14 23 25 35 土	[5+5+5][2+8][4,3]	⊗1·9	0	1 1 1 ³ 3	3 4 ⁰ [3]	⊗2
乙酉廿八(22)	4 7 13 23 25 30 35 水	[5+5+0][3+3+7][4]	⊗2·8⊗1·9	0	0 1 3 ⁴ 3	4 4 ¹ [5]	⊗2
壬辰初六(29)	2 10 13 15 21 27 31 水	[5+0][3+7][1+1][2]	⊗4·6	0	1 1 2 ⁴ 2	3 4 ⁹ [3]	[齐]
己亥十三(5)	10 15 20 26 27 33 34 木	[5+0+0][3+7][4+6]	⊗2·8⊗1·9	1	2 2 3 ₅ 3	3 4 ₈ [9]	⊗0
丙午二十(12)	1 12 16 20 21 24 27 水	[1+1][4+6][2,0,7]	[齐]	0	1 2 2 ₁ 2	3 3 ₈ [3]	⊗4
癸丑廿七(19)	1 2 3 10 11 28 34 木	[1+1][2+8][3,0,4]	[齐]	0	0 0 1 ₄ 1	3 4 ₉ [9]	⊗2
庚申初四(26)	5 8 10 15 21 26 36 木	[5+5+0][6+6][8,1]	⊗3·7	0	1 1 2 2	3 4 [3]	[齐]

丁卯 ^{十一(5)}	3	16	18	25	30	35	36	火	[5+5+0][6+6][3,8]	⊗1·9	0	2	2	3 ₇	4	4	4 ₂	[9]	⊗1
甲戌 ^{十八(12)}	2	7	8	11	13	22	24	火	[2+8][7+3][1,2,4]	[齐]	0	0	1	1 ²	1	3	3 ⁷	[9]	⊗2
辛巳 ^{廿五(19)}	1	6	8	15	17	23	32	金	[2+8][7+3][1,6,5]	[齐]	0	0	1	2 ³	2	3	4 ⁹	[2]	[齐]
戊子 ^{初二(26)}	4	12	18	19	22	33	35	火	[2+2+8][4,9,3,5]	[齐]	0	1	2	2 ⁵	3	4	4 ¹	[6]	[齐]
乙未 ^{初九(2)}	2	5	9	22	26	27	34	金	[2+2][4+6][5,9,7]	[齐]	0	0	1	3 ⁴	3	3	4 ⁰	[4]	⊗2
壬寅 ^{十六(9)}	5	7	13	18	19	25	36	金	[7+3][5+5][8,9,6]	[齐]	0	0	1	2 ₄	2	3	3 ₁	[1]	⊗4
己酉 ^{廿三(16)}	2	9	10	21	27	29	34	土	[9+9+1][2,0,7,4]	[齐]	0	1	1	2 ₅	3	4	4 ₀	[5]	[齐]
丙辰 ^{初一(23)}	5	8	17	21	23	28	32	土	[8+8+2][3+7][5,1]	⊗4·6	0	1	2	2 ₆	3	3	4 ₂	[5]	[齐]
癸亥 ^{初八(30)}	5	10	13	30	32	35	36	水	[5+5+0+0][2,3,6]	⊗1·9	0	1	1	4 ₃	4	4	4 ₂	[8]	⊗2,3
庚午 ^{十五(7)}	25	26	27	30	31	33	36	土	[5+0][6+6][7+3][1]	⊗2·8	3	3	3	4 ¹	4	4	4 ⁸	[5]	⊗0,1,2
丁丑 ^{廿二(14)}	1	3	7	8	19	26	27	水	[3+7+7][1+9][6,8]	⊗5·0	0	0	0	1 ⁶	2	3	3 ²	[9]	⊗4
甲申 ^{廿九(21)}	8	9	11	27	31	34	36	水	[1+1+9][4+6][7,8]	⊗5·0	1	1	1	3 ⁴	4	4	4 ²	[8]	⊗0,2
辛卯 ^{初六(28)}	1	2	13	25	31	32	34	木	[1+1][2+2][3,5,4]	[齐]	0	0	1	3	4	4	4	[6]	⊗2

戊戌 _{十三(4)}	2	11	16	18	19	22	31	火	[1+1+9][2+2+8][6]	⊗5·0⊗3·7	0	1	2	2 ₅	2	3	4 ₉	[4]	[齐]
乙巳 _{二十(11)}	5	7	11	18	20	31	32	火	[1+1][2+8][5+0][7]	⊗4·6	0	0	1	2 ³	2	4	4 ⁰	[3]	⊗3
壬子 _{廿七(18)}	3	12	19	23	26	33	34	木	[3+3+3][4+6][2,9]	⊗5·0	0	1	2	3 ⁶	3	4	4 ¹	[7]	[齐]
己未 _{初五(25)}	2	4	8	20	22	35	36	火	[2+2+8][5+0][4+6]	⊗1·9⊗3·7	0	1	2	3 ³	3	4	4 ¹	[4]	[齐]
丙寅 _{十二(2)}	2	3	9	27	28	32	35	火	[2+2+8][3+7][9,5]	⊗4·6	0	0	1	3 ⁴	4	4	4 ²	[6]	⊗ ⁹
癸酉 _{十九(9)}	11	14	19	20	21	22	29	金	[1+1+9+9][2,0,4]	⊗3·7	1	1	2	2 ₃	2	3	4 ₈	[5]	
庚辰 _{廿六(16)}	1	4	12	19	20	22	24	金	[1+9][4+4][2+2][0]	⊗3·7	0	0	1	2 ₅	2	3	3 ₉	[1]	
丁亥 _{初三(23)}	5	13	17	20	21	24	31	土	[3+7][1+1][5+0][4]	⊗2·8	0	1	2	2 ₃	2	3	4 ₉	[4]	[齐]
甲午 _{初十(30)}	2	4	11	17	24	25	26	水	[4+4+6][2,1,7,5]	[齐]	0	0	1	2 ₂	3	3	3 ₈	[2]	⊗4
辛丑 _{十七(6)}	1	2	8	12	15	19	29	土	[2+2+8][9+9+1][5]	⊗2·8⊗3·7	0	1	1	1 ³	2	2	4 ⁰	[0]	⊗3
戊申 _{廿四(13)}	2	10	12	14	25	27	35	土	[2+2][5+5+0][4,7]	⊗1·9	0	1	1	1 ⁷	3	3	4 ⁰	[3]	⊗2
乙卯 _{初二(20)}	13	15	16	17	18	31	36	水	[3+7][6+6][5,8,1]	[齐]	1	2	2	2 ⁵	2	4	4 ⁹	[7]	⊗3
壬戌 _{初九(27)}	8	9	11	16	17	24	33	水	[9+1][3+7][4+6][8]	⊗5·0	1	1	1	2	2	3	4	[4]	⊗0

癸巳₊₋(26) 水